

## Inhaltsverzeichnis

Weber, H. E.	Eine neue <i>Rubus</i> -Art aus dem Allgäu und Vorarlberg	7–11
Wagner, A. & I. Wagner	<i>Salix caesia</i> Vill. – Erstnachweis für Deutschland . . . .	13–16
Knoph, J. G.	Die Flechte <i>Porpidia albocaulerulescens</i> in Bayern, sowie ein weiterer Nachweis aus Frankreich und der Erstnachweis für Nepal . . . . .	17–19
Reichardt, E.	Zwei in Europa unbekannte <i>Campylodiscus</i> -Arten (Bacillariophyceae im Iffigsee, Schweiz) . . . . .	21–27
Bräutigam, S. & P. Rességuier	<i>Hieracium hirsutum</i> Bernh. ex Froel. – ein für Deutschland neuer Neophyt . . . . .	29–32
von Braune, F. A. A.	Nachrichten von der Flora des Berges Hohenstaufen . .	33–38
Stöhr, O.	Ein Fund von <i>Cornus sanguinea</i> L. ssp. <i>hungarica</i> (KARPATI) SOÓ aus dem Landkreis Berchtesgadener Land . . . . .	39–40
Lederbogen, D., G. Kaule & G. Rosenthal	<i>Apium repens</i> als Leitart großflächiger Rinderweiden im voralpinen Hügel- und Moorland Oberbayerns . . . .	41–42
Erbar, C. und P. Leins	Ameisenausbreitung von <i>Thesium rostratum</i> Mert. & Koch (Santalaceae) in der Pupplinger Au . . . . .	43–52
Dunkel, F. G.	Das Karlstadter Steinbrech-Habichtskraut, <i>Hieracium saxifragum</i> Fr. subsp. <i>carolipolitanum</i> Dunkel, subsp. nova, ein bislang unbekannter Endemit der unterfränkischen Kalk-Trockenrasen . . . . .	53–59
Springer, S.	Moosgesellschaften zwischen Lech und Wertach . . . .	61–95
Garnweidner, H.	<i>Meum athamanticum</i> Jacq., <i>Centunculus minimus</i> L. und <i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC in der Grasleitner Moorlandschaft . . . . .	97–98
Starmühler, W.	Die Gattung <i>Aconitum</i> in Bayern . . . . .	99–118
Chang, T. P.	Eine Erddiatomee <i>Diadesmis gallica</i> (Pennales, Bacillariophyceae) in süddeutschen Höhlen . . . . .	119–122
Frankl, R.	Die Bergkiefer ( <i>Pinus mugo</i> Turra) in den Tannheimer Bergen – Ein Beitrag zur Kenntnis nordalpiner Latschengebüsche . . . . .	123–158
Dunkel, F. G., L. Meierott & D. Theisinger	<i>Cochlearia danica</i> erreicht Bayern . . . . .	159–160
Marabini, J. M. & Th. Franke	<i>Utricularia bremii</i> Heer ex Koelliker, eine verkannte Wasserschlauchart in Nordbayern . . . . .	161–166
 Botanische Kurzberichte		
Tietz, S. & F. X. Winter	<i>Campanula cervicaria</i> L. in Südbayern . . . . .	167
Fürsch, H.	Das Schicksal der <i>Euphorbia villosa</i> bei Passau . . . .	168
Lippert, W. & R. Urban	Eine „Alchemillen-Fundgrube“ im Ammergebirge . . .	168–169
Fürsch, H.	<i>Sarracenia purpurea</i> im Bayerischen Wald . . . . .	169–170
Hein, H. & W. Lippert	Ein Fund von <i>Daphne blagayana</i> Freyer in den Chiemgauer Alpen . . . . .	170–171
 Nachrufe		
W. Schacht . . . . .		173–175
O. Mergenthaler . . . . .		177–180
Buchbesprechungen . . . . .		181–240