

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LIPPERT, W. & H. MERXMÜLLER: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayerischen Alchemillen (II) | 5— 46 |
| DÖRR, E.: Flora des Allgäus, 9 | 47— 85 |
| HIEMEYER, F.: Die Flora der Heidefläche bei Neukissing | 87— 91 |
| SELMEIER, A.: <i>Viscoxylon pini</i> novum genus et nova species, Mistel-Senker in einem verkieselten <i>Pinus</i> -Holz aus jungtertiären Sedimenten von Falkenberg, Oberpfalz (Bayern) | 93—109 |
| WIRTH, V.: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde in Deutschland | 111—123 |
| LOTTO, H. & R.: Ein neuer Fundort von <i>Trientalis europaea</i> L. in den Bayerischen Alpen | 125—126 |
| GROSSMANN, A. & W. MAHR: Über ein Reliktvorkommen des Flaumeichen-Bastardes <i>Quercus petraea</i> × <i>pubescens</i> in Unterfranken | 127—129 |
| KOHLER, A.: Zur Ausbreitung von <i>Callitriche obtusangula</i> Legall in den Fließgewässern der Friedberger Au | 131—132 |
| Buchanzeigen und -besprechungen | 133—138 |

