

Flora des bayerischen Bodenseegebietes.

Übersicht

über die im bayerischen Bodenseegebiet bis jetzt beobachteten

wildwachsenden Phanerogamen und Gefäßkryptogamen.

Von

Alfred Ade, Distriktstierarzt

in Weifsmain (Oberfranken).

Herausgegeben

von der

Bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora (e. V.).

MÜNCHEN

Druck von Val. Höfling, Lämmerstraße Nr. 1.

1901.

In vorliegender Abhandlung ist ein Versuch gemacht worden, die noch ziemlich wenig untersuchte Flora des bayerischen Bodenseegebietes nach Verbreitung der einzelnen Arten festzustellen, soweit dies dem Verfasser innerhalb eines Jahres, welches ihm neben anderen Geschäften zur Verfügung stand, möglich war.

Untersucht wurde das bayerische Bodenseegebiet nur so weit die Grenzen des Kgl. Bezirksamtes Lindau reichen. Die Umgegend von Oberstaufen gedenkt Herr Kgl. Amtsgerichtssekretär Herr in Weiler, welchem ich für seine Beobachtungen der Flora um Weiler zum größten Dank verpflichtet bin, im laufenden Jahre möglichst eingehend zu durchsuchen und im kommenden Jahresbericht die gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen.

Außer dem bayerischen Bodenseegebiet fand auch die Flora des österreichischen und württembergischen Grenzgebietes Berücksichtigung; es wurden kurze Angaben gemacht über Standorte seltener Pflanzen oder solcher, die im bayerischen Anteile nicht gefunden wurden. Dieses Grenzgebiet wird in Österreich durch die Rottach bis zur Mündung in die Bregenzerach, von da ab durch letztere bis zur Mündung in den Bodensee bezeichnet; in Württemberg gilt die Argen bis zur Mündung als Grenze; es kann eben leicht noch die eine oder die andere Art auf bayerischem Boden gefunden werden.

Was die geologische Beschaffenheit der Gegend anbelangt, so sind die höheren Erhebungen (Pfänderrücken etc.) tertiärer Formation, meist Meeresmolasse; die Wände der Schluchten bestehen aus Molassesandstein, tertiärer Nagelfluhe und Mergel. Das Gebiet ist ziemlich kalkarm, die oberste Schicht besteht aus Lehm. Die Hügel sind Moränenschutt des Rheingletschers, welcher ehemals die ganze Gegend bedeckte und als Zeugen zahlreiche Findlinge, kleine Teiche, Moore und Sumpfwiesen zurückließ.

Die meisten Gewässer enthalten weiches Wasser; Quellen mit Kalktuffbildung sind jedoch an manchen Stellen nicht selten, z. B. im Rickenbachertobel, im Heuried, im oberen Teil besonders im Argenthal, bei Harbatzhofen, Weiher etc.

Infolge trefflichster Wiesenkultur sind Haidewiesen fast verschwunden; Reste finden sich als trockene Grasplätze zwischen Rickenbach und Unterhochsteg, an der Wasserburger Bucht, auf dem Johannishügel bei Zeisertsweiler, am Waldsaum bei Altrehlings, am Bahndamm bei Schönau und unterhalb Station Schlachters; im oberen Gebiet kann man zahlreiche Viehweiden hierher rechnen.

Am Bodenseeufer zieht dem Gestade parallel ein schmaler Streifen dünenartigen, sandigen Bodens mit charakteristischer Flora (*Ranunculus reptans* L., *Erucastrum obtusangulum* Rehb., *Triticum glaucum* Desf., *Botrychium Lunaria* L.).

Literatur des behandelten Gebietes.

- Berichte der Bayer. Botan. Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora:
Bd. II München 1892 S. 63.
Bd. IV München 1896 S. 1—76.
Bd. V München 1897 S. 77—198.
Bd. VI München 1899 S. 199—246.

- Bruhin P. Thom. Aq., Durch Algäu und Vorarlberg. Reminiszenzen meiner botan. Exkursion im Spätsommer 1865. Feldkirch 1866.
- Bornmüller J., Zur Flora von Oberbayern. Mitteilungen des Thüringer botan. Vereines. Neue Folge 1895.
- Caflisch J. Fr., Beiträge zur Flora der Regierungsbezirke Schwaben und Neuburg. X. Bericht des naturhistor. Vereins in Augsburg 1857 p. 59—64. Mit Angaben Madlener, Schreinermeisters in Lindau.
- Dalla Torre Prof. Karl v., Tagebuchblätter einer Reise nach Südbayern, in die Südostschweiz und durch Vorarlberg. Alpenfreund 8. Bd. 1895 p. 278—291.
- Degenkolb H., 14 Oktobertage am Bodensee und im Breisgau. Ö. B. Z. 1866 p. 180—187.
- Dobel Fr., Die Vegetationsverhältnisse der Gegend um Lindau. 7. Bericht des naturhistor. Vereins in Augsburg (ein Auszug daraus in Flora 1854 p. 491—496).
- *Garke, Flora von Deutschland. 18. Aufl. 1898.
- Glanz Dr. jur., Zur Flora Tirols, Vorarlbergs und des angrenzenden Bodenseegebiets. Ö. B. Z. 1864 p. 85—88.
- *Herter L., Lehrer in Hummertsried, Mitteilungen zur Flora von Württemberg im Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Württemberg, 44. Jahrg. 1888 p. 177—204.
- *Höfle, Die Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Betrachtung der Nachbarfloren. Erlangen 1850.
- Holler Aug., Beiträge zur Flora des Algäus. IX. Bericht des naturhistor. Vereins in Augsburg, 1858, p. 92—96.
- Kemmler C. A., Flora von Württemberg und Hohenzollern. 1882.
- *Prantl K., Exkursionsflora für Bayern. 2. Ausg. 1894.
- *Dr. Probst in Essendorf, Zur Kenntnis der in Oberschwaben wildwachsenden Rosen. Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Württemberg, 43. Jahrg. 1887.
- *Richen Gottfr., Professor in Feldkirch, Die botanische Durchforschung von Vorarlberg und Lichtenstein. 6. Jahresbericht des öffentl. Progymnasiums der Stella matutina zu Feldkirch. 1896/97.
- Sauter Dr. Anth. Eleuth., Schilderung der Vegetationsverhältnisse um den Bodensee und in einem Teile Vorarlbergs. Flora 1837 Beiblätter I. Bd. p. 1—66.
- Schreckenstein Friedr. Freyherr Rot v., Herr von Immendingen und Bilafingen etc., und Engelberg Joseph Meinrad v., fürstl. Fürstenbergischer Hof- und Sanitätsrat etc., Flora der Gegend um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann vom Einfluß der Schussen in den Bodensee bis zum Einfluß der Kinzig in den Rhein. 4 Bde. 1804—1814. Enthält nach Professor Richen Standorte um Lindau.
- *Sendtner Dr. Otto, Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns 1854 (p. 722—908, Flora von Südbayern enthält die Angaben Dobels über die Lindauer Gegend).
- *Wagner Herm., Ill. Deutsche Flora 2. A. 1882.

Zu bemerken ist, daß nur die mit * bezeichneten Werke durchgesehen wurden; die meisten Literaturangaben sind Professor Richens Werk „Die botanische Durchforschung von Vorarlberg und Lichtenstein“ entnommen.

Gewährsmänner.

- I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig von Bayern.
Ade Alfred, Tierarzt in Weismain (Oberfranken) = A.
Brüller Max, Kgl. Bezirkstierarzt in Lindau i. B. = B.
Dollhopf L., Lehrer in Lauingen a. d. Donau.
Fronmüller W., prot. Stadtpfarrer in Lindau i. B.
Herr Eduard, Kgl. Amtsgerichtssekretär in Weiler i. Algäu = H.
Hepp Ernst, cand. jur. Laufen, a. Salzach.
Hook Gg., Kgl. Rektor an der Realschule in Lindau.

Kellermann Dr. Chr., Kgl. Rektor der Industrieschule in Nürnberg.
Milz Gebh., Schreinermeister in Bregenz.
Ruefs Joh. Lehrer in München.
Schawo Mich., Kgl. Telegraphenoberexpeditor, Lindau = Sch.
Sündermann Fr., Kunstgärtner in Aschach b. Lindau.

Einteilung des Gebietes.

- I. Hbu: Gegend vom Bodensee bis zur Hügelreihe.
a) Litoralflora des Bodensees.
b) Flora der Ebene um den Bodensee (Bodenseebecken) mit den Südabhängen der begrenzenden Weinberge.
- II. Hbo: Flora des Hügelgebietes.
a) Moränengebiet von der Bodenseeebene bis zur Linie Hergaz-Opfenbach incl.
b) Moränengebiet Hergaz-Opfenbach — ca. 750m Höhe aufwärts.
c) Flora der Peissenberger Zone Sendtners (ca. 750—1100m).
I. entspricht der unteren Donauzone Sendtners, welche bei Prantl, „Bayerns Flora“ mit Hu abgekürzt bezeichnet wird; daher = Hbu.
II. entspricht dem oberen Teil der südbayerischen Hochebene und wird daher mit Hbo bezeichnet.

Charakteristisch sind für die bezeichneten Teile:

Ia. Ranunculus reptans L., Erucastrum obtusangulum Rchb., Thlaspi perfoliat. L., Reseda lutea L., Cerastium arvense L., Rosa agrestis Savi, Nasturtium anceps DC., Nasturtium amphibium R. Br., Isatis tinctoria L., (Clematis viticella L.), Coronilla Emerus L., Dipsacus pilosus L., (Asparagus officinalis L.), Myosotis Rehsteineri Wartm., Verbascum Blattaria L., Litorea juncea Berg., Odontites serotina Lam., Aira caespitosa var. rhenana Gremli, Triticum glaucum Desf., Poa alpina L., Botrychium Lunaria Sw.

Für Ib. Batrachium aquaticum var. heterophyllum Weber, Batr. fluitans Wimmer, Ranunculus sceleratus L., Papaver dubium L., Arabis alpina L., Arabis petraea Lmk., Berteroa incana DC., Erodium cicutarium L'Herit., Diplotaxis muralis DC., Camelina sativa L., Neslea paniculata Desv., Cochlearia Armoracia L., Lepidium Draba L., Lepidium ruderae L., Bunias orientalis L., Viola alba Bess., Viola permixta Jord., Viola mirabilis L., Alsine tenuifolia Wahlbg., Aldrovandia vesiculosa L., Silene noctiflora L., Rosa tomentella L., Rosa rubiginosa L., Acer platanoides L., Geranium phaeum L., Geranium pyrenaicum L., Oxalis stricta L., Lathyrus paluster L., Lathyrus vernus Bernh., Rubus platycephalus Focke, Rubus pilocarpus Gremli, Portulaca oleracea L., Sedum reflexum L., Saxifraga tridactylites L., Sium latifolium L., Silaus pratensis Bess., Echinops sphaerocephalus L., Galium (Wirtgeni F) Schultz., Gentiana utriculosa L., Cuscuta europaea L., Valerianella carinata Lois., Aster salicifolius Scholler, Aster parviflorus Nees., Senecio paludosus L., Cynoglossum officinale L., Crepis tectorum L., Gratiola officinalis L., Myosotis sylvatica Hoffm., Stachys annua L., Veronica polita Fr., Scrophularia (Neesii Wirtg.), Lamium amplexicaule L., Physalis Alkekengi L., Teucrium Botrys L., Orobanche coerulescens Steph., Orobanche ramosa L., Anagallis coerulea Schreb., Amarantus Blitum Rth., Kochia scoparia Schreb., Chenopodium vulvaria L., Tithymalus verrucosus Scop., Mercurialis annua L., Elodea canadensis Rich. et Mch., Sagittaria sagittifolia L., Acorus Calamus L., Spiranthes aestivalis Rich., Gladiolus paluster Gaud., Galanthus nivalis L. (in II a sehr selten), Tamus communis L., Allium acutangulum Schrad., Allium vineale L., Allium oleraceum L., Allium Schoenoprasum L., Muscari racemosum Mill., Hemerocallis fulva L., Cyperus fuscus L., Cyperus longus L., Schoenus nigricans L., Panicum lineare Crep., Cladium Mariscus R. Br., Eriophorum gracile Koch., Carex nemorosa Rebentisch., Carex virens Lmk., Carex distans L., Carex tomentosa L., Poa serotina Ehrh., Poa compressa L., Glyceria spectabilis M. et K., Alopecurus agrestis L., Alopecurus fulvus Smith, Melica uniflora L., Poa bulbosa L., Bromus tectorum L., Bromus sterilis L., Lolium temulentum L., Ophioglossum vulgatum L.

Für II a. *Ranunculus arvensis* L., *Nuphar pumilum* Spreng., *Dianthus barbatus* L., *Genista tinctoria* L., *Brassica Rapa* L. var. *campestris* L., *Lathyrus silvester* L., *Lathyrus tuberosus* L., *Staphylaea pinnata* L., *Rubus Vestii* Focke, *Rosa mollis* Sm., *Epilobium Dodonaei* Vill., *Myricaria germanica* L., *Sedum purpureum* Lk., *Chrysosplenium oppositifolium* L., *Adenostyles alpina* Bluff et Fingerh., *Cicuta virosa* L., *Campanula Rapunculus* L., *Datura Stramonium* L., *Veronica longifolia* L., *Calamintha Acinos Clairv.*, *Centunculus minimus* L., *Linaria Elatine* Mill., *Potamogeton alpinus* Balb., *Potamogeton acutifolius* Lk., *Orchis purpurea* Huds., *Spiranthes autumnalis* Rich., *Gagea lutea* Schult., *Carex pilosa* Scop.; im österreichischen Grenzgebiet gehört hierher noch *Digitalis lutea* L.

Für II b. *Aconitum Napellus* L., *Ranunculus montanus* Willd., *Viola biflora* L., *Polygala Chamaebuxus* L., *Geranium silvaticum* L., *Rosa alpina* L., *Rosa tomentosa* Smith, *coriifolia* Fries., *Amelanchier vulgaris* Moench, *Epilobium lanceolatum* Seb. et Maur., *Circaea alpina* L., *Sedum dasyphyllum* L., *Sedum spurium* L., *Lonicera nigra* L., *Lonicera alpigena* L., *Hieracium cymosum* L. (*Galium vernum* Scop.?), *Inula conyza* DC., *Bellidiastrum Michellii* Cass. (in II a nur herabgeschwemmt), *Senecio cordatus* Koch., *Senecio Reisachii* Gremblieh., *Bidens Cernuus* L., *Carduus crispus* L., *Carduus defloratus* L., *Lappa officinalis* All., *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer, *Centaurea montana* L., *Willemetia apargioides* Cass., *Campanula pusilla* Haenke, *Andromeda polifolia* L. und *Vaccinium uliginosum* L. (beide in II a nur an der Grenze von II b im Degermoos), *Melampyrum paludosum* Gaud., *Veronica montana* L., *Alectorolophus angustifolius* Heynhold, *Euphrasia nemorosa* Persoon, *Salvia glutinosa* L. (in II a herabgeschwemmt), *Galeopsis speciosa* Mill., *Polycnemum arvense* L., *Rumex sanguineus* L., *Polygonum Bistorta* L. (in II a von Hergensweiler aufwärts), *Scheuchzeria palustris* L., *Coralliorhiza innata* R. Br., *Crocus banaticus* Heuff., *Polygonatum verticillatum* All., *Juncus filiformis* L., *Scirpus pauciflorus* Lightf., *Scirpus setaceus* L., *Eriophorum vaginatum* L., *Carex dioica* L., *Carex pulicaris* L., *Carex pauciflora* Lightf., *Carex Heleonastes* Ehrh., *Calamagrostis varia* Lk., *Calamagrostis arundinacea* Roth, *Lasiagrostis Calamagrostis* Lk., *Sesleria coerulea* Ard., *Taxus baccata* L., *Pinus Pumilio* Willk., *Lycopodium Selago* L. Im württembergischen Grenzgebiete gehören hierher noch *Saxifraga Hirculus* L., *Alsine stricta* Wahlbg. und *Carex microglochis* Wahlbg. (Diese drei Spezies sollen bei Isny vorkommen und dürften in den Hochmooren bei Mayerhöfen noch gefunden werden.)

Für II c. *Stellaria nemorum* L., *Saxifraga Aizoon* Jacq., *Sagina saxatilis* L. = *St.* (im Grenzgebiet), *Ribes alpinum* L., *Saxifraga rotundifolia* L., *Saxifraga aizoides* L., *Valeriana montana* L., *Adenostyles albifrons* Rehb., *Homogyne alpina* Cass., *Arnica montana* L., *Senecio nemorensis* L., *Mulgedium alpinum* Cass., *Gentiana lutea* L. (im österr. Grenzgebiet), *Rhododendron hirsutum* L., *Euphrasia salisburgensis* Funk., *Rumex alpinus* L., *Alnus viridis* DC., *Listera cordata* L., *Gymnadenia albida* Rich. (im württemb. Grenzgebiet), *Platanthera viridis* L. (im württemb. Grenzgebiet), *Goodyera repens* R. Br. (im österr. Grenzgebiet), *Streptopus amplexifolius* DC., *Luzula flavescens* Gaud., *Luzula silvatica* Gaud., *Festuca silvatica* Vill., *Elymus europaeus* L., *Scolopendrium officinarum* Sw., *Lycopodium complanatum* L. (württemb. Grenzgebiet), *Asplenium alpestre* Mett.

Von Pflanzen, welche in der südbayerischen Hochebene gemein sind, fehlen im Gebiet, oder sind sehr selten:

Hepatica triloba Gil., *Reseda lutea* L. (sehr selten), *Biscutella laevigata* L., *Dianthus Carthusianorum* L., *Cerastium arvense* L. (sehr selten), *Geranium molle* L., *Genista germanica* L., *Trifolium alpestre* L., *Coronilla varia* L., *Hippocrepis comosa* L., *Fragaria moschata* Duch., *Spiraea filipendula* L., *Saxifraga granulata* L., *Peucedanum Oreoselinum* Moench., *Chaerophyllum aureum* L., *Artemisia vulgaris* L., *Anthemis Cotula* L., *Carduus acanthoides* L., *Hypochaeris maculata* L., *Erica carnea* L., *Alectorolophus majus* Rehb. var. *glaber* Koch., *Verbascum Lychnitis* L. (eingeschleppt), *Digitalis ambigua* L., *Specularia speculum* DC., *Stachys recta* L., *Ajuga genevensis* L., *Prunella grandiflora* Jacq., *Pinguicula alpina* L., *Thesium* sp., *Urtica urens* (sehr selten), *Allium carinatum* L., *Koeleria cristata* Pers., *Selaginella helvetica* Spreng.

In der Gegend um Weiler scheinen zu fehlen oder sind sehr selten:

Anemone ranunculoides L. (sehr selten), *Corydalis cava* Schweigg., *Arabis hirsuta* Scop., *Cardamine hirsuta* L., *Sisymbrium Alliaria* Scop., *Sisymbrium officinale* Scop., *Erophila verna* E. Mey., *Thlaspi arvense* L., *Papaver Rhoeas* L. (sehr selten), *Nuphar luteum* Sm., *Dianthus superbus* L., *Geranium pusillum* L. (sehr selten), *Sanguisorba officinalis* L. (sehr selten), *Sedum boloniense* Loisl., *Pastinaca sativa* L., *Aethusa Cynapium* L., *Galium boreale* L., *Valerianella olitoria* Moench., *Bupthalmum salicifolium* L., *Senecio viscosus* L., *Senecio aquaticus* Huds. (sehr selten), *Centaurea cyanus* L. (sehr selten), *Cichorium Intybus* L. (sehr selten), *Picris hieracioides* L., *Scabiosa Columbaria* L. (sehr selten), *Convolvulus arvensis* L. (sehr selten), *Lithospermum officinale* L., *Symphytum officinale* L., *Verbascum nigrum* L., *Veronica arvensis* L., *Veronica hederifolia* L., *Melampyrum arvense* L., *Betonica officinalis* L., *Lamium maculatum* L. (sehr selten), *Primula officinalis* L. (sehr selten), *Anagallis arvensis* L. (sehr selten), *Polygonum lapathifolium* L., *Tithymalus exiguus* Moench., *Potamogeton pectinatus* L., *Potamogeton perfoliatus* L., *Arum maculatum* L., *Ornithogalum umbellatum* L., *Carex muricata* L., *Panicum sanguinale* L., *Bromus erectus* Huds., *Equisetum variegatum* Schleich.

Charakteristische Seltenheiten für das Bodenseegebiet sind:

Ranunculus reptans L., *Nuphar pumilum* Spreng., *Nasturtium riparium* Gremli, *Barbarea intermedia* Boreau, *Erucastrum obtusangulum* Rchb., *Viola alba* Bess., *Dianthus barbatus* L., *Evonymus latifolia* Scop., *Coronilla Emerus* L., *Lathyrus paluster* L., *Potentilla Gremlii* Zimmeter, *Rosa sepium* Thuill., *Epilobium Dodonaei* Vill., *Epilobium lanceolatum* Seb. et Maur., *Saxifraga oppositifolia* L., *Aldrovandia vesiculosa* L., *Galium Wirtgeni* F. Schultz., *Valerianella carinata* Lois., *Dipsacus pilosus* L., *Senecio nemorensis* L., *Myosotis Rehsteineri* Wartmann, *Orobanche minor* Sutt., *O. coerulescens* Steph., *Litorella juncea* Berg., *Polycnemum arvense* L., *Potamogeton acutifolius* Lk., *Liparis Loeselii* Rich., *Orchis purpurea* Huds., *Crocus banaticus* Heuff., *Gladiolus paluster* Gaud., *Muscari racemosum* L., *Tamus communis* L., *Allium vineale* L., *Cyperus longus* L., *Rhynchospora fusca* R. et Sch., *Carex nemorosa* Reberntisch., *Carex divulsa* Good., *Carex Heleonastes* Ehrh., *Car. pilosa* Scop., *Aira rhenana* Gremli, *Triticum glaucum* Desf., *Equisetum litorale* Kuehlewein., *Ophioglossum vulgatum* L.

Zeichenerklärung.

- Hbu = Gegend vom Bodensee bis zur Hügelreihe (Bodenseebecken).
Hbo = Flora des Hüggebietes.
ö. Gr. = österreich. Grenzgebiet.
w. Gr. = württemb. Grenzgebiet.
! = im Gebiete noch aufzusuchen.
† = seit mehr als 30 Jahren nicht mehr beobachtet.
†? = seit 15 Jahren nicht mehr beobachtet.
? = zweifelhafte Angabe.
sp = eingeschleppt, verwildert.
qsp = eingeschleppt mit Aussicht sich zu erhalten.
h = im Garten gebaut.
c = kultiviert.
∞ = jedenfalls weiter verbreitet.
V = Vorkommen.
v¹ = sehr selten.
v² = sehr zerstreut.
v³ = zerstreut.
v⁴ = verbreitet.
v⁵ = gemein.
- Z = Zahl.
z¹ = vereinzelt.
z² = spärlich.
z³ = gesellschaftlich.
z⁴ = massenhaft.
z⁵ = unzählige.

Höhenpunkte im Bezirksamte Lindau und im Grenzgebiet

(nach den amtlichen Positionsblättern).

I. für Hbu:	Schrundholz 605,0 m	Ilex, Ophrys muscifera, Cy-
Lindau 401,5 m	Beuren 547,0 m	pripedium, Convallaria ma-
Bregenz 400,2 m	Wohmbrechts 589,0 m	jalis, Cephalanthera.
Wasserburg 400,0 m	Obermünzenbrugg 552,0 m	[Herr.]
Nonnenhorn 404,0 m	Mariathann 629,0 m	Siebers 620,0 m
Aschach 409,0 m	Edelitz 640,0 m	Siebersbad 584,0 m
Rothensmoos b. Reutin 417,0 m	Lengatz 658,0 m	Ellhofen 735,0 m
Hoyerberg 465,0 m	Möllen 599,0 m	Oberreutte 858,0 m
Schönbühel 458,0 m	Heimenkirch 664,0 m	Irsengund 824,0 m
	Riedhirsch 708,0 m	Zellersbad 915,0 m
II. für Hbo:	Lindenberg 761,0 m	Zellers 773,0 m
Höhe zwischen Mozach und	Lindenbergermoos 760,0 m	Vorder-, „Hinterschweinhöf“
Streitelsfingen 483,0 m	Manzen 726,0 m	912,0 m; höchster Punkt
Bösenreutin 465,0 m	Höhe bei Ried 832,0 m	dicht bei Sulzberg 979,0 m
Taubenberg 480,0 m	Scheidegg 804,0 m, höchster	Oberberg 907,0 m
Oberreitnau 463,0 m	Punkt;	Röthenbach, Ort 664,0 m
Unterreitnau 468,0 m	Ort selbst 761,0 m	Röthenbach, Station 705,0 m
Humbertsweiler 474,0 m	Allmannsried 813,0 m	Steinegaden 684,0 m
Höhenreutin 516,0 m	Ostkienberg 749,0 m	Gestraz 629,0 m
Neuweiher bei Lamperts-	Westkienberg 779,0 m	Schweineburg 837,0 m
weiler 502,0 m	Rickenbach 744,0 m	Grünenbach 718,0 m
Weissensberger Weiher	Buffingsried 809,0 m	Schönau 704,0 m
520,0 m	Oberstein, höchster Punkt	Laubenberg 898,0 m
Schlachters 512,0 m	898,0 m	Harbatzhofen 756,0 m
Waltramsbuch 495,0 m	Oberschwenden, höchste Er-	Ebratzhofen 759,0 m
Militärschießschule 503,0 m	hebung 951,0 m	Hohe Kugel 1069,0 m
Schwätzenmühle 511,0 m	Schaffau 672,0 m	Iberg 964,0 m
Sigmarszell 483,0 m	Neuhaus 589,0 m	Mayerhöfen 744,0 m
Kinbach 485,0 m	Laimtobel 682,0 m	Riedholz 735,0 m
Niederstaufer 523,0 m	Häuslings 720,0 m	Ringenberg 781,0 m
Hergensweiler 527,0 m	Weiler 632,0 m	Oberstaufer 792,0 m
Stockenweiler-Weiher	Simmerberg 751,0 m	
540,0 m	Ruppenmanklitz 723,0 m	Höhen im Grenzgebiet:
Haggen 601,0 m	Krähenberg 834,0 m	Isny 703,0 m
Leutfritz 587,0 m	Trogener Moor ca. 850,0 m	Möggers 944,0 m
Haggenberg 534,0 m	Mönchenstein 867,0 m	Hochberg b. Möggers 1062,0 m
Opfenbach 570,0 m	Oberbuchenbühl 733,0 m	Hörbranz 462,0 m
Heimen 595,0 m	Gerbertobel von Schweinhof	Wangen 545,0 m
Ratzenberg 776,0 m	bis Eyenbach 900,0 m bis	Sieberatsweiler 504,0 m
Ratzenbergermoos 767,0 m	688,0 m (bei ca. 800,0 m:	Esseratsweiler 506,0 m

Fundorts-Verzeichnis.

I. Kl. Dicotyledoneae.

I. Unter-Kl.: **Thalamiflorae.**

1. Fam. **Ranunculaceae** Jussieu.

Clematis L.

Cl. vitalba L. Hecken, Auen, Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

” ” var. **crenata** Jord.: Hbo Wald bei Hummertweiler Gde. Oberreitnau. ∞

” ” var. **integrifolia** L. verbreitet.

? **Cl. recta** L.

Hbo: Weiler (Pflaum), nach Herr sehr fraglich.
Hbu: h. in Gärten in Nonnenhorn und Wasserburg.

† **Cl. integrifolia** L.

Hbu: An der Leiblach bei Unterhochsteg (Dobel). Ist sicher nicht mehr vorhanden.

h u. qsp **Cl. viticella** L.

Hbu: Cornus stolonifera-Gebüsche am Seeufer bei Wasserburg, nur verwildert.

In der Nähe von Lindau (412m) abseits von Häusern (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig). In Hbu häufig in Gärten.

Thalictrum Tourn.

Th. aquilegifolium L. Auen, Gebüsche. v³z³
Hbu verbreitet; Leiblachauen bis zur Mündung.

Hbo z. B. um Weiler häufig, Leiblach bei Wigratzbad, am Schwarzen-see etc.

Th. flavum L. Streuwiesen, zwischen Schilf. v²z⁴
Hbu verbreitet.

Hbo: Argenthal bei Staudach.

Hepatica Dill.

H. triloba Gil.

Hbu: Fehlt um Lindau (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig).

Hbo: Fehlt um Weiler (Herr).

ö. Gr.: Pfänder bei Bregenz (Schawo). v¹z¹

w. Gr. bei Langnau und Achberg im Argenthal (Brüller, Fronmiller).

Anemone Tourn.

A. nemorosa L. Wälder, Wiesen. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.

A. ranunculoides L. Auen, Wiesen. v³z²
Hbu: Streuwiesen bei Holdereggen, Schachen, Ziegelhaus, Rickenbach.

Hbo: bei Oberreitnau, um Weiler nur in den Rothachauen am Fußweg nach Siebersbad (Herr).

Batrachium E. Mey.

- B. aquatile E. Mey.** Bäche, Gräben, Teiche. v³z³
 var. **paucistamineus Tausch.**
 " " Hbu: Um Nonnenhorn, Wasserburg, Reutin, Ziegelhaus in Gräben und Bächen.
 Hbo: Ob. Argen bei Ebratzhofen; Umgebung von Weiler häufig in Eisweihern und Bächen, z. B. Lindenberg, Wangen, Weiher am Waldwege nach Station Rötenbach (Herr), in zwei schnellfließenden Bächen zw. Stockenbühl und Wangen (Herr).
 " " var. **heterophyllum Weber.**
 Hbu: Oberer Klosterteich z¹; Teiche um Lindau (Dobel).
B. divaricatum Wimm. Teiche, Gräben.
 Hbu: Am kleinen See in Lindau (Rektor Kellermann).
 Hbo: Quellsumpf im Dunkelbuch; im Ratzenberger Moos.
B. fluitans Wimm. v¹z³
 Hbu: In einem Bach bei Wasserburg.

Ranunculus Hall.

- R. aconitifolius L.** Feuchte Wiesen, Gebüsche. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo sehr verbreitet.
 " " f. **flor. plenis:** Hbo Oberreitnau (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig).
R. flammula L. Gräben, Teichränder. v⁴z³
 Hbu und Hbo.
R. reptans L. Steiniges Seeufer. v²z³
 Hbu: Längs des Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Nonnenhorn; bildet landeinwärts Übergangsformen zu *R. flammula* L.
R. Lingua L. Gräben, Teichränder. v²z³
 Hbu: Am Wasserburger Bühel, am Bettbauer Weiher.
 Hbo: Zwischen Hegnau und Riggatshofen, zwischen Riggatshofen und Bruggach, am Schwarzensee im Rötenbacher Filz; um Weiler nicht gefunden (H.).
R. montanus Willd. Waldwiesen. v²z²
 Hbu. —
 Hbo: Schüttentobel bei Ebratzhofen, Argenthal bei Au (Gemde. Grünenbach), Hausbachanlagen bei Weiler (H.), Wiese am Fußpfad von der Kapfmühle auf die Sulzberger Straße (H.).
R. acer. Wiesen. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo.
R. lanuginosus L. Wälder. v³z³
 Hbu: Leiblachauen an der Mündung.
 Hbo: Am Schloß Syrgenstein, im Rohrach, Argenthal bei Handwerks, Wälder um Oberstein, um Weiler in Wäldern verbreitet (H.).
R. polyanthemus L. Wälder. v³z²
 Hbo: Leiblachthal bei Stockenweiler, zwischen Hergensweiler und Niederstauen; um Weiler verbreitet, doch weniger als vorige, z. B. zwischen Mangen und Hammermühle.
R. nemorosus DC. Moosige Wälder. v²z²
 Hbo: Im Walde bei Burkartshofen, im Leiblachthal bei Hergatz; um Weiler nicht aufgefunden (H.).
R. repens L. Grasplätze, Wege etc. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
R. bulbosus L. Heidewiesen, Brachen. v³z³
 Hbu: Am Seeufer bei Wasserburg. ∞
 Hbo: Bei Schlachters, bei Hegnau; in der Umgegend von Weiler ziemlich häufig (H.).

- R. arvensis L.** Felder. v³z²
Hbu: Am Rangierbahnhof Lindau. z¹
Hbo: Auf einem Feld in Egghalden. z⁵
R. sceleratus L. Ufer. v²z²
Hbu: Seeufer in Äschach am kleinen See (B., A., Kellermann),
Schilfsumpf bei Villa Amsee.

Ficaria Dill.

- F. ranunculoides Rth.** Laubwälder, Gebüsche, Auen. v⁴z²
Hbu z. B. Zechwald. z⁴
Hbo z. B. um Weiler sehr häufig (H.).

Caltha L.

- C. palustris L.** Sümpfe, Gräben. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.

Trollius L.

- Tr. europaeus L.** Nasse Wiesen. v³z³
Hbu z. B. Heuried bei Hege.
Hbo z. B. Zeisertweiler, Schlachters, Hergensweiler, Degermoos,
Itzlings, Schwarzensee, Wohnbrechts, Engenberg, Ratzenberg,
Schreckenmanklitz, Au und Stockerbühl bei Weiler und auch
sonst nicht selten (H.).

Helleborus Adams.

- H. niger L.**
Hbu: h und sp buschiger Abhang am Schönbühl (Sch.)
H. viridis L. Gebüsche, Wiesen. v²z²
Hbu: Auf einer Wiese an der Leiblach beim „Strodel“ in der Hang-
nach z² (A., Sch.)
Hbo: An der Kirchhofmauer um Weifensberg (Dobel), Burgruine
Altenburg bei Weiler z⁴ (H.).
" " var. **dumetorum Sadler.**
Hbo: In großer Menge unter Buschwerk an einem sonnigen Hange
in der Nähe von Opfenbach bei Hergatz (Britzelmaier).
ö. Gr. um Bregenz an mehreren Stellen.

Aquilegia Tourn.

- Aq. vulgaris L.** Waldränder, Streuwiesen, Abhänge. v²z³
Hbu: Rickenbach, Hangnach, Heuried.
Hbo: Sigmarszell, Rohrach, Ruine Schreckenmanklitz, Eistobel bei
Riedholz, Staufen und Burghardhofen (Dobel).
Aq. atrata Koch. Waldränder, Gebüsche. v³z⁴
Hbu z. B. Leiblachauen, Hege, Bettbauer Weiher, Seeufer bei Alwied.
Hbo z. B. Rohrach, Hufschlag bei Steingaden (B.), Fidelesmühle bei
Manzen, Wigrazbad, Rottachauen bei Weiler, Wald am Fußwege
nach Röthenbach (H.).

Aconitum Tourn.

- Ac. Napellus L.** Waldränder, Streuwiesen. v³z³
Hbo: Ratzenberger Moos, bei Haus, Oberreutte, Moor bei Hag-
spiel, bei Heimenkirch, Eistobel bei Riedholz, Argenthal bei Mal-
aichen, um Weiler nicht selten (H.)
(Aconitum Stoerkianum Rchb. soll nach Höfle in der Fl. Wirtemb.
für das Argenthal von Isny bis zur Mündung angegeben sein, ob
auf bayerischem Boden?)

- Ac. Lycoctonum L.** Laubwälder, Auen. v³z³
Hbu: Leiblachthal bei Hangnach und Oberhochsteg. z²
Hbo: Leiblachthal bei Hergensweiler, Steckenweiler, Sigmarszell, Argenthal bei Handwerks z⁴, Eistobel bei Riedholz, Lindenberg gegen Ratzenberg, um Weiler häufig, z. B. Rothachauen, Hausbachtal (H.).

Actaea L.

- Act. spicata L.** Wälder. v³z²
Hbu: Hangnach, Rickenbacher Tobel, Schönbüchel.
Hbo: Hubers, Rohrach, Natterersäge, um Oberstein, Halteplatz Opfenbach, Ruine Ellhofen, nächst Weiler häufig, z. B. Kapfholz, Kapfmühle, Trogener Wald (H.).

2. Fam. **Berberidaceae Vent.**

Berberis L.

- B. vulgaris L.** Weiden, Triften, Auen.
In Hbu v², in Hbu v³—v⁴.

3. Fam. **Nymphaeaceae DC.**

Nymphaea L.

- N. alba L.** Teiche. v³z⁴
Hbu: Bodensee beim Rangierbahnhof (Kellermann), im Wasserburger Büchel, Bettbauer Weiher.
Hbo: Zeisertweiler, auf der Scheibe, Stockenweiher, Schwarzensee, Neuweiher bei Metzlers.
N. candida Presl. Weiher. v²z³
Hbo: Aschbachweiher bei Oberreitnau, See im Ratzenbergermoos. ∞
" " f. **semiaperta Klinggr.**
Hbu: Gräben am Wasserburger Büchel.
Hbo: Am Schwarzensee.

Nuphar Sm.

- N. luteum Sm.** Teiche. v²z³
Hbu: Wasserburger Büchel, Bottbauer Weiher.
Hbo: Weissensberger Weiher, Neuweiher bei Metzlers, Schwarzensee, Gräben im Röttenbacher Filz.
N. pumilum Spreng.
" " f. **glabratum Harz.**
Hbo: Im Waldteich bei Station Schlachters am südlichen Ufer. z³
(A., Sch.)

4. Fam. **Papaveraceae DC.**

Papaver Tourn.

- P. Rhoëas L.** Saatfelder, Eisenbahndämme. v³z²
Hbu hie und da, z. B. Bahndamm Enzisweiler—Nonnenhorn.
Hbo: Oberreitnau, um Weiler auf Schutt (H.), sehr selten in den Rothachauen (H.), Schutt bei Lindenberg, Sandhügel zwischen Schwarzenberg und Sigmanns, Bahndamm bei Heimenkirch.
P. dubium L.
Hbu: Bodenseedamm beim Rangierbahnhof Lindau. z¹

c u. sp **P. somniferum L.**

Hbu: Bahndamm Enzisweiler—Mitten; c bei Simmerbuch.
Hbo: Bei der Station Röthenbach, um Weiler hie und da, z. B. Eisweiher beim Röthenbacher Waldweg (H.).

Chelidonium Tourn.

C. majus L. Schutt, Mauern.
Hbu und Hbo.

v⁴z³

5. Fam. **Fumariaceae DC.**

Corydalis DC.

C. cava Schweigg. Obstgärten, Gebüsch.

v³z³

Hbu: Verbreitet in Obstgärten, z. B. Schachen, Nonnenhorn, Rickenbach.

Hbo: Um Bodolz, Enzisweiler, Bruggach, Unterreitnau im oberen Teile fehlend. („Gickeler, Henneblatt“.)

Fumaria Tourn.

F. officinalis L. Schutt, Äcker.

Hbu v³z³ z. B. um Enzisweiler, Schachen.

Hbo: Selten. Bahndämme um Station Röthenbach (A., H.) ∞.

F. Vaillantii Loisl.

Hbo: Bahndamm Röthenbach (H.).

6. Fam. **Cruciferae Juss.**

Cheiranthus L.

h **Ch. Cheiri L.**

Hbu: Sp. am Seeufer bei der Badeanstalt Wasserburg im Ufersande. z²

Nasturtium R. Br.

N. officinale R. Br. Quellen, Bäche.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo.

” ” var. **siifolium Rehb.**

Hbu: Gräben in Hundweiler (Sch.), in Äschach und an der Bleiche (Sch.).

N. amphibium R. Br.

Hbu: Seeufer bei Villa Amsee im Schilf.

z²

N. anceps DC. = riparium Gremli.

Hbu: Ufer des kleinen Sees in Äschach z³, sandiges Ufer der Wasserburger Bucht z¹.

N. silvestre R. Br. Bahndämme.

v³z³

Hbu: Am Rangierbahnhof Lindau, Seedamm bei Villa Amsee.

Hbo: Oberreitnau, Station Hergensweiler, Station Schlachters, Station Hergaz; Bahndamm der Lokalbahn Röthenbach—Weiler (H.) — in Hbu noch: Holdereggen, massenhaft unter der Lindenschanze in Lindau.

N. palustre DC. Teiche, Gräben.

v²z⁴

Hbu: Rangierbahnhof, Seeufer bei Villa Leuchtenberg, Karolinen-schanze in Lindau.

Hbo: Weissensberger Weiher, bei Schönau.

Barbarea R. Br.

- B. vulgaris R. Br.** An Gräben, Ufern, auf Kies. v^3z^3
Hbu: Seeufer bei Villa Amsee, Ziegelhaus, Wasserburg.
Hbo: Um Weiler nicht selten, z. B. in Gräben an der Lindenberger
Strasse bei Rothach, am Eisweiher Waldweg nach Röthenbach (H.).
" " var. **arcuata Rchb.**
Hbo: Kiesplatz bei Station Röthenbach z^2 , Blättle bei Ellhofen (H.).
B. intermedia Boreau.
Hbo: Bremenried bei Weiler auf einer Wiese. z^2 (H.).

Turritis Dill.

- T. glabra L.**
Hbu: Bei Lindau (Prantl).
ö. Gr.: Bregenz.

Arabis L.

- A. alpina L.** Mauern.
Hbu: Stadtmauer Lindau gegen den kleinen See z^3 , am Bodenseeufer
bei Lindau (Madlener) qsp.: am Gartenzaun und der Böschung am
Garten des Dr. Epple in Mitten z^4 im ö. Gr. Wirtatobel am Pfänder
ca. 700 m (Herr).
A. hirsuta Scop. Wiesen. v^2z^2
Hbo: Bodenseeufer bei Ziegelhaus.
Hbu: An der Mauer des Pestfriedhofes bei Bechtersweiler, am
Schwarzensee. Fehlt um Weiler (H.).
sp **A. petraea Lmk.**
Hbu: Eisenbahnseedamm Lindau z^1 , zwischen Geleisen am Rangier-
bahnhof z^1 .

Cardamine L.

- C. silvatica Link.** Mauern, Wälder, Gräben. v^3z^3
Hbu: Seedämme in Äschach z^4 , an Hecken in Äschach, Gräben
um Heimesreutin.
Hbo: Bei Stockenweiler, am Westkienberg. — Um Weiler nicht
gefunden (H.).
C. hirsuta L. Weinberge, Gärten.
Hbu: v^4z^5 — Hbo: nur im untern Teile beobachtet bis Schlachters
aufwärts.
C. pratensis L. Feuchte Wiesen. v^5z^4
Hbu und Hbo.
C. amara L. Gräben, Ufer. v^4z^3
Hbu z. B. Äschach, Reutin, am kleinen See, Wasserburg, Heimesreutin.
Hbo: Schlachters, Hergensweiler, Rohrach, um Weiler sehr häufig (H.).

Dentaria Tourn.

- D. digitata Lmk.** im w. Gr. bei Wolfegg (Garke).
D. bulbifera Lmk. ö. Gr. Pfänder (Sch., Milz).

Hesperis L.

- H. matronalis L.** Wege, Zäune, Schutt. v^3z^3
Hbu: In Hoyern, am Bahnhof Nonnenhorn.
Hbo: In Hengnau, an einer Hecke zwischen Oberholz und dem
Neuweiher bei Station Schlachters, Abhang bei der Kirche in Sig-
marszell, am Bahnhof Hergensweiler, zwischen Dentenweiler und
Hummertsweiler, an der Station Harbatzhofen; um Weiler in der
Nähe von Häusern. v^3 (H.).

Sisymbrium L.

S. officinale Scop. Wege, Schutt.
In Hbu v⁴z⁴; in Hbo um Weiler nicht beobachtet (H.).

†? **S. Loeselii L.**
Hbu: Bregenz—Lindau (Dobel).

sp **S. Sinapistrum Crntz.**
Hbu: Eisenbahnseedamm Lindau. z¹

S. Alliaria Scop. Gebüsche, Hecken, Zäune.
Hbu v⁴z³, z. B. Alwind, Aschach, Schachen, Reutin.
Hbo: Oberreitnau. Fehlt um Weiler (H.).

S. Thalianum Gaud. Wegränder, Dämme. v³z³
Hbu: Rangierbahnhof, auf einer Mauer in Schönmoos (Sch.), in
Hoyern, Oberreutin.
Hbo: Stockenweiler, Thumen, Engelitz, am Schwarzensee.

Erysimum L.

sp **Er. Cheiranthoides L.**
Hbo: Station Röttenbach (H.).

Brassica L.

c **Br. oleracea L.**

c **Br. Rapa L.**

” ” var. **campestris L.** Schutt, Eisenbahndämme.
Hbu und Hbo: Bahndämme Lindau—Nonnenhorn und Lindau—
Schlachters. v³

Sinapis Tourn.

S. arvensis L. Felder, Schutt. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.

” ” var. **orientalis Murr.**
Hbu: Um Wasserburg und Enzisweiler am Eisenbahndamm. z²

Erucastrum Presl.

Er. Pollichii Sch. et Spenn. Eisenbahndämme. v²z³
Hbu: Aschach, Rangierbahnhof, in Lindau.
Hbo: Station Röttenbach.

Er. obtusangulum Rehb. Sandige Plätze. v²z³
Nur Hbu: Am ganzen Bodenseeufer sowie an Eisenbahndämmen.

Diplotaxis DC.

D. muralis DC. Bahndämme. v²z³
Hbu: Eisenbahndämme um Lindau, Aschach, Reutin, Rangier-
bahnhof, dort auch am Seeufer.
Hbo: Bahnhof Hergensweiler.

Alyssum Tourn.

Al. calycinum L. Bahndämme.
Hbu: Am Rangierbahnhof, Eisenbahnseedamm Lindau.
Hbo: Oberreitnau.

Berteroa DC.

B. incana DC.
Hbu: Eisenbahndämme in Aschach und Holdereggen.

Lunaria L.

L. rediviva L. ö. Gr. Schluchten am Pfänder (Sauter, Milz), z. B. Wirtatobel (H.).

! sp **L. annua L.**
Hbo: auf Schutt in Metzlers (Gmde. Weifensberg). z¹

Erophila DC.

- Er. verna E. Mey.** Wege, Felder. v³z³
Hbu verbreitet, z. B. am ganzen Bodenseeufer, in Hoyern etc.
Hbo um Oberreitnau; fehlt um Weiler, Simmerberg, Scheidegg,
Lindenberg (H.).
" " **f. majuscula Jord.**
Hbo: auf lehmigen Ackerrainen zw. Oberreitnau und Eggetsweiler.

Cochlearia L.

- h u. sp **C. Armoracia L.** Feuchte Wiesen. v²z²
sp Hbu: Am Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Villa Amssee z²,
Eisenbahndämme bei Hoyern, Kiesgrube in Schachen; am See-
und Leiblachufer (Dobel).
[C. officinalis L. Angeblich „Amerang am Bodensee“ (Besnard);
dieser Ort liegt zwischen Wasserburg a. Inn und dem Chiemsee!]

Camellina Crntz.

- C. sativa Crntz.** Felder. v¹z²
Hbu: Feldraine am Letz bei Enzisweiler. z²

Thlaspi Dill.

- Thl. arvense L.** Äcker, Schutthäufen. v²z³
Hbu: Reutin, Rangierbahnhof, Bahndamm Lindau—Nonnenhorn.
Hbo? Um Weiler nicht gefunden (H.).
Thl. perfoliatum L. Ufer, Dämme.
Hbu: Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Nonnenhorn z³, am
Rangierbahnhof.
Hbo: Bahndamm Schönau—Obereitnau. Fehlt um Weiler (H.).

Iberis L.

- h u. sp **I. amara L.**
Hbo: Am Bahnhof Schlachters; Abhang bei der Kirche in Sigmarzell. z³
sp **I. umbellata L.** An einer Mauer in Niederstaufern. z²

Lepidium L.

- L. Draba L.**
qsp. Hbu: an den Lagerhäusern in Lindau z³ seit mehreren Jahren
(B., Kellermann, A.).
h u. sp **L. sativum L.**
Hbu: An der Kempferstrasse bei der Schiefsstätte am Schönbüchel (Sch.)
L. ruderale L. Dämme. v²z²
Hbu: Eisenbahnseedamm Lindau; im Bahnhofrayon Lindau.

Capsella Vent.

- C. Bursa pastoris L.** v⁵z⁵
Hbu und Hbo.

Isatis L.

- I. tinctoria L.** z²
Hbu: Am Bodenseeufer bei Reutenen.

Neslea Desv.

- N. paniculata Desv.**
Hbu: Bahnhofrayon Lindau, bei Enzisweiler auf Äckern.
Hbo: Schutt zwischen Lindenberg und Ratzenberg.

Bunias L.

B. orientalis L.

Hbu: Bei der Spitalmühle vor der Brücke links in der Wiese. (Sch.).

Raphanistrum Tourn.

R. Lampsana Gärtn. Felder, Schutt.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo.

R. sativus L. —

7. Fam. **Cistaceae Duval.**

Helianthemum Tourn.

H. Chamaecistus Mill. Sandige Plätze.

nur Hbu: Bahngleise am Rangierbahnhof; Seeufer bei der Badeanstalt Wasserburg; Seeufer in Nonnenhorn.

Hbo: Fehlt Weiler und Umgebung (H.); im Rohrach Tobel v¹z² (H.).

8. Fam. **Violaceae DC.**

Viola Tourn.

V. palustris L. Moore.

v³z⁴

Hbu: Wasserburger Bühel.

Hbo: Um Volklings, Degermoos, Ratzenbergermoos, um Wigraz und Mywiler, Röthenbacher Filz, Gschwend bei Scheidegg, bei Ruppenmanklitz; Moos bei Stockenbühl (H.), Trogener Moor (H.), Ellhofer Tobel u. a. O.

V. hirta L. Wiesen, Waldränder v⁴z⁴, jedoch in Hbo um Weiler selten (H.).

" " var. **pinetorum Wiesb.**

Hbu: Hangnach v¹z²

" " var. **alluvialis Sabransky.**

Hbu: Bodenseeufer bei Unterhochsteg auf Sand z².

V. odorata L. Obstgärten, Gebüsche.

v⁴z⁴

Hbu v⁴, ebenso im untern Teile von Hbo; um Weiler: Zaun am Hohlweg bei Rieder, Ruine Altenburg, Strafsenböschung bei Rothach, Rothachauen bei der großen Fabrik (H.).

" " f. **alba**: Hbu: Obstgärten in Nonnenhorn und Enzisweiler.

" " f. **cuprea**: Hbu: In Reutinsteinig, in Bodolz an einer Strafsenböschung.

V. alba Besser. Waldwiesen.

Hbu: Im südlichen Teile des Zechwaldes bei Unterhochsteg unter Kiefern. z². Im ö. Gr. am Pfänder verbreitet.!

V. permixta Jord. (hirta × odorata).

Hbu: Seeufer bei Alwind; in Nonnenhorn.

Hbo: Rothachauen bei Siebers (mit fehlschlagenden Früchten nach H.!) v¹z³

V. silvestris Lmk. Wälder.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo.

V. Riviniana Rchb. Gebüsche, Wälder, Auen.

v⁴z⁴

Hbu: Leiblachauen, Zechwald, Hegnau, Reutinsteinig etc.

Hbo z. B. Schwatzenmühle, Handwerks, Röthenbach, um Weiler häufig (H.).

V. canina L. Wiesen, Moore, Wälder.

v³z³

" " var. **montana aut.**

Hbo: Rohrach, zwischen Ellhofen und Oberhäuser, Ratzenbergermoos. f. gegen V. Rivini: Hbo: Gebüsch an der Schwatzenmühle.

V. canina L. var. lucorum Rchb.

Hbo: Heidewiesen bei Gschwend oberhalb Scheidegg, im Degermoos, Mooswiesen bei Möllen, Waldwiesen zwischen Manzen und Hammermühle und im Rohrachtobel (hier Formen sehr nahe der *Viola Caffischii* Woerlein!).

” ” **fl. alb.** im Rohrachtobel z¹ (steht sehr nahe der *Viola Caffischii* Woerl.).

” ” var. **Einseliana F. Schultz.**

Hbo: Moor zwischen Hummertsweiler und Unterreitnau (Form der folgenden var.!).

” ” var. **ericetorum Schrad.**

Hbo: Moore um Volklings, bei Rotkreuz und Eggenwath, zwischen Hummertsweiler und Unterreitnau, bei Sauters, Heidewiesen in Rohrach, zwischen Manzen und Hammermühle, bei Möllen, bei Mywiler, Wigrazbad, bei Scheidegg, im Ratzenberger Moos.

V. mirabilis L. Auen.

v¹z²

Hbu: Leiblachgebüsch zwischen Unter- und Oberhochsteg. z²

V. tricolor L. Wiesen, Brachen.

v⁴z⁴

” ” var. **arvensis Koch.**

Hbu: Acker am Bodensee verbreitet.

Hbo: seltener.

” ” var. **vulgaris Koch.**

Hbu: Seeufer bei Ziegelhaus und Unterhochsteg.

Hbo: Verbreitet auf Äckern, z. B. Litzis, Ellhofen, Aizenreute, Mittelhofen, Hergensweiler, Gschwend, Biesenberg, Rötenbach, am Daxenberg bei 950 m.

V. biflora L. Hochwälder.

v³z³

Nur Hbo: Ellhofer Tobel, Eistobel, Burkartshofen, Hammermühle, Oberstein, bei Station Rötenbach, im Tobel bei Hochglend (Gmde. Gestraz), Hausbachanlagen (H.), Kapfholz (H.), Rothachauen bei Siebers z⁴ (H.).

9. Fam. **Resedaceae DC.**

Reseda L.

R. lutea L.

Hbu: Am Bodenseeufer zwischen Wasserburg und Nonnenhorn. z²
w. Gr. Argenmündung (Fronmiller).

h u. sp **R. odorata L.**

Hbo: Am Bahnhof Hergaz.

10. Fam. **Droseraceae DC.**

Drosera L.

Dr. rotundifolia L. Moore.

v³z⁴

Hbu: Wasserburger Bühel, Heuried, bei Enzisweiler.

Hbo: Sauters, Neuweiher bei Metzlers, Zeisertsweiler, Thumen, Degermoos, Schwarzensee, Bleichen bei Hergaz, Röthenbacher Filz, Ratzenbergermoos, Moor bei Stockenbühl (H.), Trogenermoor (H.), Moorwiese bei Ruppenmanklitz (H.), Moor bei Oberreutte z⁵ (H.).

Dr. anglica Huds. Sumpfwiesen.

v²z³

Hbu: Quellhaus im Heuried vor Rickenbach; Wasserburger Bühel.
Hbo: Zwischen Hattnau und Hegnau; Streuwiese bei Schlachters, am Schwarzensee; Moor bei Stockenbühl (H.), Trogenermoor (H.), Ratzenbergermoos.

Dr. obovata Koch. Hochmoore.

Hbo: Ratzenbergermoos unter *Dr. longifolia* L.

v¹z²

Dr. intermedia Hayne. Sümpfe.

v²z⁴

Hbo: Moor zwischen Thumen und Schlachters, Degermoos (A., Sch.), Sauters, bei Eggetsweiler, im Ratzenbergermoos.

Aldrovandia Mont.

Al. vesiculosa L. Teiche, Gräben.

Hbu: Im Wasserburger Bühel und in einem Ausflussgraben desselben zwischen *Myriophyllum* v¹z⁴ (von Rektor Kellermann einmal eine Frucht gefunden).

11. Fam. **Polygalaceae Juss.**

Polygala L.

P. vulgaris L. Wiesen, Abhänge.

v⁴z⁸

Hbu und Hbo —

P. comosa Schk. Triften, Abhänge.

v⁸z⁸

Hbu und Hbo — Hbu z. B. Zeehwald.

P. amara L. Wiesen, Triften, Moore.

v⁴z⁸

” ” var. **officinalis Kittel.**

Hbo: Rohrachtobel auf Nagelfluh.

z⁸

” ” var. **austriaca Koch.** Im ö. Gr.: Kies der Bregenzerache.

z⁴

” ” var. **genuina Koch.** Auf Heidewiesen und Mooren sehr verbreitet.

v⁴z⁸

P. depressa Wender.

! Angeblich im ö. Gr. auf Torfwiesen bei Möggers unweit Scheidegg (Sauter).

P. chamaebuxus L. Nagelfluhwände, Heiden.

v²z⁸

Hbo: Rohrachtobel und an der Strafe Emsgritt—Kienberg; Waldböschung bei der Eibelesmühle an der Weissach (H.).

12. Fam. **Silenaceae DC.**

Gypsophila L.

†? **G. repens L.**

Hbu: Bodenseeufer bei Lindau (Wagner, Flora von Deutschland).
ö. Gr.: Kies der Bregenzer Ache.

z⁴

Dianthus L.

D. barbatus L. Waldränder, Abhänge.

v²z²

Wild, h u. sp. Hbu: sp bei der Bahnböschung in Holdereggen.
Hbo: sp an der Böschung vor einem Haus zwischen Stockenweiler und Hergensweiler, an einer Gartenmauer in Schönau, wild am Waldrand neben dem Weg von Dornach nach Sigmarszell.

z²

† **D. armeria L.**

Hbu: Lindau am Weg nach Mozach (Dobel); im w. Gr. am Althanner Berg bei Wolfegg [Pfanner¹].

D. superbus L. Wiesen.

v²z⁸

Hbu: Heuried, Ziegelhaus.

Hbo: Zwischen Tobel und Oberhof, Bahndämme in Rehlings, Heide-
wiese bei Station Schlachters, an der Ruine Dallendorf bei Gestraz.

1) Pfanner Maximilian, Apotheker in Kilslegg, gab botanische Beiträge zu der im Jahre 1834 in Tübingen erschienenen Flora von Württemberg von Prof. Gust. Schübler und Gg. v. Martens in Stuttgart.

- D. deltoides L.** Im w. Gr. Wolfegg, Isny (Martens).
h **D. caryophyllus L.**
h u. sp **D. plumarius L.**
sp Hbu am Bodenseeufer bei der Badeanstalt Wasserburg. z²

Saponaria L.

- S. officinalis L.** Mauern, Auen.
Hbu: Zäune um Lindau und Wasserburg (Dobel), sp an einer Hafeneinfahrt in Mozach mit *Sedum reflexum*.
Hbo: ehemals an einer alten Mauer beim Brög in Schlachters (1900 abgebrochen), bei Malaichen an der Argen, Rothachauen bei Siebersbad nicht selten (H.)
† **S. ocymoides L.**
Hbu: Am Seeufer zwischen Reutenen und Wasserburg (Dobel).

Vaccaria Med.

- V. parviflora Mch.**
sp Hbu: Eisenbahnseedamm Lindau. z¹

Silene L.

- S. italica Pers.** In w. Gr. bei Isny (Garke).
S. vulgaris Grke. Wiesen, Abhänge. v⁵z⁴
Hbu und Hbo.
S. gallica L.
Hbo: Auf einem Kartoffelacker oberhalb Mekatz, Gmde. Heimenkirch z¹; wahrscheinlich auch im Hofe des Amtsgerichtes Weiler z² (H.).
S. nutans L. Trockene Wiesen. v²z³
Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg und bei Wasserburg, zwischen Unter- und Oberhochsteg.
Hbo: Kiesplatz am Schwarzensee, Eistobel bei Riedholz, am Laubenberg bei Harbatzhofen, Waldrand am Wege von Weiler nach Oberreutte (H.), Kiesplatz bei Rötenbach.
S. noctiflora L. Gartenunkraut.
Hbu: In einem Garten bei der Klostermühle in Äschach. z³
S. Armeria L. Gartenunkraut. Dämme. v³z²
Hbo: Gemüsefeld rechts der StraÙe Hoyern—Schönau, Kartoffelfeld bei Bahnhof Oberreitnau, Bahndamm Rehlings—Oberreitnau, Straßendamm zwischen Hergatz und Schwarzensee vor dem ersten Bahnwärterhaus, am Bahndamm bei Mekatz, am Halteplatz Biesenberg, an der Station Harbatzhofen.

Coronaria L.

- C. flos cuculi A. Br.** Wiesen, Moore. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.
h **C. tomentosa A. Br.**

Melandryum Röhl.

- M. album Grke.** Felder, Brachen. v²z³
Hbu: Bahnhof Lindau.
Hbo: Bahndamm bei Schlachters, bei Oberrengersweiler, auf Feldern um Niederstaußen, bei Mywiler, Wigrazbad, am Bahnhof Hergatz, ganz vereinzelt bei Weiler (H.).
M. rubrum Grke. Wiesen, Wälder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.

Agrostemma L.

- A. Githago L.** Felder. v⁴z³
Hbu und Hbo.

13. Fam. **Alsinaceae DC.****Sagina L.**

- S. procumbens L.** Wege, Felder. v⁴z³
Hbu z. B. Pflaster in Lindau.
Hbo: Felder um Obereitnau, Hummertsweiler, bei Mywiler, Lindenberg, Simmerberg, am Daxenberg b. 950 m etc.
- S. Linnaei Presl.**
Hbo: Im ö. Gr. Pfänder (Sauter); w. Gr. Adelegg bei 1000 m [Martens u. Fleischer¹⁾].
- S. nodosa Fenzl.** Im w. Gr. Torfgräben bei Kifslegg, Wolfegg, am Reichertshofer Weiher, Wangen, Isny (Martens).

Spergula L.

- S. arvensis L.** Brachen, Felder. v⁴z⁴
Hbu: Am Rangierbahnhof.
Hbo häufig bis gemein.

Alsine Whlbg.

- A. stricta Whlbg.** Moore.
Hbo: Nur im w. Gr. bei Isny (Garke), bei Kifslegg (Pfanner).
- A. tenuifolia Whlbg.** Eisenbahndämme. v²z⁴
Hbu: An den Eisenbahndämmen um Lindau, Aschach, Hoyern, Rangierbahnhof z⁴.

Moehringia L.

- M. trinervis Clairv.** Ufer, Abhänge, Wälder. v⁴z⁴
Hbu z. B. Bodenseeufer b. Ziegelhaus.
Hbo: Verbreitet.
- M. muscosa L.**
Hbo: Am Eisenbahntunnel in Oberstaufen (Dollhopf).

Arenaria L.

- A. serpyllifolia L.** Bahndämme, Kiesplätze, Ufer. v⁵z⁴
Hbu und Hbo.

Stellaria L.

- St. nemorum L.** Moosige Hochwälder. v²z³
Hbo: Um Oberstein, am Daxenberg bei Oberstein, bei Burkartshofen, Kapfholz bei Weiler (H.), Kellerholz und Trogener Wald bei Weiler (H.), auch sonst nicht selten um Weiler (H.).
- St. media Cyr.** Wege, Äcker etc. v⁵z⁴
Hbu und Hbo.
- St. graminea L.** Wiesen, Felder, Gebüsch. v⁴z³
Hbu und Hbo.
- St. uliginosa Murr.** Gräben, Moore. v³z⁴
Hbu: Am kleinen See in Äschach.
Hbo: Egghalden, Wildberg, Mollenberg, Witzigmänn; Oberreitnau, Oberrengrersweiler, in allen Hochmooren, z. B. im Degermoos,

1) Fleischer Dr. Franz, Prof. der Naturwissenschaften in Aarau, botanisierte 1832 mit Gg. v. Martens im östl. Württemberg.

Ratzenbergermoos, bei Leimtobel und Hagspiel, Torfstiche bei Wigrazbad; um Weiler an Quellen und feuchten Waldplätzen nicht selten (H.).

Malachium Fr.

- M. aquaticum L.** Ufer, Auen. v⁴z⁴
In Hbu gemein, in Hbo aufwärts etwas seltener.

Cerastium L.

- C. semidecandrum L.** Acker.
Hbu: Lindau (Prantl.)
var. β) **glutinosum.** Im w. Gr. an der Adelegg (Fleischer u. Martens).
C. glomeratum Thuill. Abhänge, Acker. v⁸z⁴
Hbu z. B. Weinberge in Nonnenhorn, Wasserburg, am Rangierbahnhof.
Hbo: Hoyern, Schönau, Mölln bei Mariathann; Acker bei Weiler
ziemlich verbreitet (H.).
C. triviale Lk. Wege, Wiesen etc. v⁵z⁴
Hbu und Hbo.
C. arvense L. z²
Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg.
Fehlt Hbo, z. B. nicht um Weiler (H.).

14. Fam. Lineae DC.

Linum L.

- c **L. usitatissimum L.**
Hbo: Um Hörbolzmühle kultiviert.
L. catharticum L. Wiesen, Auen, Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo.

15. Fam. Malvaceae R. Br.

Malva L.

- M. Alcea L.** Abhänge, Gebüsche, Triften. v²z³
Hbo: Abhang bei der Kirche in Sigmarszell, auf einer Viehweide
bei Au unweit Grünenbach, Argenabhänge bei Malaichen, Garten-
zaun beim Spital in Lindenberg.
c u. sp **M. moschata L.**
Hbu: Gartenflüchtling in Heimesreutin an einem Zaun, im w. Gr.
an der unteren Argen bei Isny [Kolb¹⁾].
M. silvestris L. v²z³
Hbu: Am Seeufer vor dem Hôtel Eichele in Wasserburg; auf
Schutt in Lindau; am Rangierbahnhof.
Hbo: Am Laubenberg bei Harbatzhofen.
h **M. crispa L.** In Gärten.
M. neglecta Wallr. Schutt, Wege, Mauern. v⁴z³
Hbu und Hbo, z. B. um Scheffau, um Weiler.

Althaea L.

- h u. sp **A. officinalis L.**
sp Hbu: Am Bodenseeufer bei Nonnenhorn. z¹
h **A. rosea Cav.** In Gärten.

1) Kolb C., Kaplan in Leutkirch, lieferte Beiträge für die 1884 erschienene Flora von Württemberg.

Hibiscus L.

H. Trionum L.

sp

Hbu als Gartenunkraut im Garten hinter der Realschule Lindau (Dollhopf, A.).

16. Fam. **Tiliaceae Juss.**

Tilia L.

T. grandifolia Ehrh.

!

Häufig in Alleen. Ob wild? ö. Gr. Pfänder selten (Milz).

T. ulmifolia Scop.

meist c, wild in Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg, Rickenbacher-tobel hinter der Milchfabrik. ∞

c

T. alba Ait, T. americana L. und T. tomentosa Moench. Häufig in Hbu angepflanzt.

17. Fam. **Hypericaceae DC.**

Hypericum L.

H. perforatum L. Bahndämme, Kiesplätze, Waldränder etc.

v⁴z³

Hbu und Hbo.

H. quadrangulum L. Wiesen, Waldränder.

v³z³

Hbu: Schachen, Schwesternberg, Hangnach.

Hbo: Zwischen Dürren und Hummertsweiler, zwischen Schlachters und Zeisertsweiler, zwischen Wohmbrechts und Hergaz im Wald, bei Scheidegg.

H. perforatum × quadrangulum.

v²z²

Hbu: Bahndamm in Holdereggen, Streuwiese zwischen Rangierbahnhof und Ziegelhaus.

Hbo: Bei Hubers an der Leiblach, am Bahnhof Schlachters, b. Weiler. ∞

H. tetrapterum Fr. Gräben, Dämme.

v³z³

Hbu: Bahndämme bei Hoyern, Gräben in Rautin, im Heuried, am Wasserburger Bühel.

Hbo: Oberreitnau, Witzigmänn. ∞

H. montanum L.

Hbo: ö. Gr. an der Fluh am Pfänder (H., Milz).

H. hirsutum L. Auen, Wälder.

v³z³

Hbu: Leiblachauen von der Hangnach bis Unterhochsteg.

Hbo: Leiblachufer bei Sigmarszell und Hubers, Aschbachweiher bei Oberreitnau, bei Altis im unteren Rohrachtobel, Argenthal bei Untersteig, Argenauen bei Malaichen, Bergwälder um Bramatsreite, Waldlichtung nächst dem Mönchenstein bei Weiler (H.).

H. humifusum L. Äcker, Torfwiesen.

v⁴z³

Hbu: Auf Torf am Wasserburger Bühel.

Hbo z. B. Äcker um Oberreitnau, Egghalden, Abhänge oberhalb Hubers, Moorwiesen bei Sauters, Mywiler, im Degermoos, Zwieseler und Happareute bei Heimenkirch, ebenso bei Itzlings auf Äckern, bei Hagspiel auf Heideboden, Äcker am Mönchenstein bei Weiler (über 800 m) (H.).

18. Fam. **Acerinaceae DC.**

Acer L.

A. Pseudoplatanus L. Laubwälder, Waldschluchten.

v³z³

Hbu: Rickenbacher Tobel, Hangnach.

Hbo: Zwischen Sigmarszell und Dornach, Rohrachetobel, Argenthal bei Staudach und Syrgenstein, bei Malaichen an der Argen, Eistobel bei Riedholz, Burgruine Ellhofen, Neuhaus bei Scheffau.

A. platanoides L.

Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg z² ö. Gr. Pfänder (Milz).

A. campestre L. Gebüsch, Wälder.

Hbu und Hbo allenthalben, doch zerstreut, z. B. zwischen Sigmarszell und Dornach, Hausbachgebüsch bei Weiler (H.). v⁴z²

19. Fam. **Hippocastanaceae DC.**

Aesculus L.

c **A. Hippocastanum L.**

h **A. macrostachys L.** In Lindau.

20. Fam. **Ampelidaceae H. B. K.**

Ampelopsis Mchx.

h u. sp **A. quinquefolia R. u. Sch.**

sp z. B. Hbo zwischen Ratzenberg und Lindenberg an der Strafe.

Vitis L.

c **V. vinifera L.**

Hbu: In Weinbergen kultiviert.

Hbo: sehr vereinzelt an Häusern in Weiler, wird selten reif (H.).

21. Fam. **Geraniaceae DC.**

Geranium L.

†? **G. phaeum L.** Wiesen.

Ehemals auf einer Wiese in Schachen, jetzt „Villa Tannhof“ und eingeparkt (Lehrer Wibel). — Um Reutin und Streitelsfingen häufig (Dobel). — Im ö. Gr. im Parke des Schlosses Wellenstein bei Bregenz (Sauter); im w. Gr. auf der Adelegg [Schübler und Zeller¹⁾].

G. sylvaticum L. Wiesen.

sp Hbu: Viehrampe am Rangierbahnhof, 1 Stück.

Hbo: Bei Isenbretzhofen und Hertnegg um Oberreutte z³, Oberberg bei Simmerberg (H.), gegen Oberstaufen zahlreich (H.). v²z³

G. pratense L.

Hbo: am Bahndamm bei Station Hergatz z¹, an einem Hause in Weiher (H.), am Bahndamm Auers—Rötenbach an 2 Stellen (H.).

G. palustre L. Sumpfwiesen, Gräben, Gebüsch.

Hbu und Hbo, auch um Weiler häufig (H.). v⁴z⁴

” ” **f. flor. pallidis:** Streuwiesen zwischen Oberhochsteg und Rickenbach z³ (hierher vielleicht *Geranium aconitifolium* l'Hérit bei Bregenz; Caflisch nach Sarntheim).

G. pyrenaicum L. Sonnige Plätze.

Hbu: Südseite der Schloßmauer in Alwind, bei Villa Lindenhof; im w. Gr. Abhang der Waldburg (Schübler). v²z³

G. pusillum L. Felder.

Hbu gemein; Hbo im unteren Teile verbreitet, im oberen seltener, z. B. Oberhäuser bei Heinenkirch; um Weiler sehr selten (H.), z. B. bei Oberscheiben. v⁴z³

1) Zeller Gottlieb Heinrich, Apotheker in Nagold, um 1830.

- G. dissectum L.** Ackör, Brachen. v³z³
 Hbu z. B. Karolinenschanze in Lindau, am Rangierbahnhof.
 Hbo: Hubers, Mywiler, Oberhäuser, Oberscheibe, Äcker bei der
 Sulzberggasse (H.), Schutt bei der großen Fabrik (H.).
- G. columbinum L.** Felder, steinige Orte. v⁴z³
 Hbu z. B. Rangierbahnhof.
 Hbo: Hergensweiler, Mywiler, Ratzenberg, Biesenberg, Manzen (H.),
 Grünenbach, Umgebung von Weiler nicht selten (H.).
- G. molle L.** Im ö. Gr. bei Bregenz (Sauter); im w. Gr. bei Isny (Kolb).
- G. robertianum L.** Mauern, Gebüsch, Gräben. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo.
 " " f. **albiflora**: Hbu: Bei der Achbrücke in Reutin, bei den Kloster-
 mühlen an der Mozacher Halde.
 Hbo: Zwischen Hertnegg und Stiefenhofen.

Erodium l'Hérit.

- Er. cicutarium l'Hérit.** Steinige Plätze. v²z³
 Hbu: Bahngeleise am Rangierbahnhof, Bodenseeufer.
 Hbo: Scheint zu fehlen (bei Weiler einmal gefunden. H.).

22. Fam. **Balsaminaceae A. Rich.**

Impatiens L.

- l. noli tangere L.** Gebüsch, Auen. v⁴z⁴
 Hbu gemein, ebenso unterer Teil von Hbo; sonst z. B. Wigratzbad,
 Hausbachanlagen (H.), am Mönchenstein (H.), auch sonst um Weiler
 nicht selten (H.).
- l. parviflora DC.**
 sp Hbu: Im Gebüsch beim Realschulgarten an der Lindenschanze
z² (Sch.).

23. Fam. **Oxalidaceae DC.**

Oxalis L.

- O. acetosella L.** Wälder, Haine. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo.
 " " f. **flor. purpur.** Hbu: Bei Rickenbach (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig).
- O. stricta L.** Schutt, Äcker. v²z²
 Hbu: Äcker bei Nonnenhorn (Sch.); von der Spitalmühle nach
 Moos an Wiesenrändern (Sch.). ö. Gr. Bregenz (Milz).
- O. corniculata L.** Im ö. Gr. Bregenz (Milz).

24. Fam. **Rutaceae Juss.**

Ruta Tourn.

- R. graveolens L.**

II. Unter-Kl.: **Calyciflorae.**

25. Fam. **Celastraceae R. Br.**

Staphylea L.

- St. pinnata L.** Waldschluchten. v³z²
 Hbu: Wälder bei Reutin um Lindau (Dobel); Rickenbacher Tobel
 hinter der Milchfabrik.
 Hbo: Leiblach zwischen Hubers und Sigmarszell; Tobel bei Streitels-

finden, Tobel zwischen Weifensberg und Schönbühl; Tobel zwischen Dornach und Sigmarszell.

Evonymus Tourn.

- E. europaea L.** Wälder, Gebüsche, Auen. v^4z^2
Hbu z. B. Mozacher Tobel, Seemauer in Aschach.
Hbo z. B. Kienberg, Malaichen a. d. Argen, um Weiler häufig. (H).
- E. latifolia Scop.** Waldschluchten, Abhänge. v^3z^2
Hbu: Reutin bei Lindau (Dobel).
Hbo: Dunkelbuch bei Oberreitnau, Abhang an der Strafse zwischen Biesings und Dornach, Rohrach bei Emsgritt, am Nadenberg bei Litzis, Abhang des Iberges gegen Mayerhöfen, Ruine Ellhofen, Gebüsche bei Hasenried oberhalb Weiler (H.)

26. Fam. **Rhamnaceae R. Br.**

Rhamnus Tourn.

- Rh. cathartica L.** Wälder, Auen, Ufer. v^3z^3
Hbu: Seeufer zwischen Alwind und Reutenen z^1 , am Seeufer bei Nonnenhorn z^1 .
Hbo: Achauen bei Oberreitnau z^3 ; bei Mollenberg; am Waldrand zwischen Zeisertsweiler und Egghalden, im Tobel bei Schalkenried, Argenthal bei Gestraz, bei Unterthalhofen, Rothachauen bei Siebersbad, Teich zwischen Lindenberg und Börserscheidegg; Straßsenkreuzung oberhalb Scheffau.

Frangula Tourn.

- Fr. Alnus Mill.** Auen, Moore, Gebüsche. v^4z^4
Hbu und Hbo.

27. Fam. **Papilionaceae L.**

Sarothamnus Wimm.

- S. scoparius Koch.** Waldschläge. v^3z^3
Hbo: w. Gr. bei Dentenweiler, ca. 800 m aufer der Grenze z^5 auf einem abgeholzten Hügel. Im ö. Gr. bei Möggers ca. $1/2$ km auferhalb der Grenze bei Oberstein! (Milz).

Genista L.

- G. tinctoria L.** Waldschläge. v^2z^2
Hbo: Zwischen Riggatshofen und Hegnau am Hohlweg im Walde; am Bahndamm Auers—Röthenbach (H.).

Ononis L.

- O. spinosa L.** Weiden, Triften. v^3z^3
Hbu: Rangierbahnhof, Seeufer bei Unterhochsteg, Bahndamm Nonnenhorn—Mitten.
Hbo: Johannishügel bei Zeisertsweiler, Rohrachobel; bei Weiler selten, nur am Weiderand an der großen Fabrik am Wege nach Siebersbad häufig (H.).
- O. procurrens Wallr.** Wege, Raine, Triften. v^4z^3
Hbu: Zwischen Mitten und Nonnenhorn.
Hbo: Umgebung von Weiler häufig (H.), sonst meist als var. **mitis Gremli**.
" " Hbu z. B. Bodenseeufer bei Unterhochsteg, Klosterteiche.

Hbo: Oberrengrersweiler, Kiesplatz am Schwarzensee, zwischen Wigrazbad und Mywiler, zwischen Weiler und Oberreutte.

O. rotundifolia L. Im ö. Gr. am Pfänder (v^1z^1); das einzige Exemplar im Herbar Milz scheint eher zu *O. mitis* Gremlı zu gehören.

Anthyllis L.

A. vulneraria L. Auen, Triften. v^4z^3
Hbu häufig, Hbo ebenso, z. B. zwischen Bodolz und Schönau; um Weiler nicht häufig, z. B. Hausbachanlagen (H.).

Medicago L.

c u. sp **M. sativa L.** Acker. v^3z^4
sp in Hbu und Hbo an Bahndämmen; bei Weiler hie und da, z. B. Auers—Rötenbach, Wiese bei Ellhofen (H.).

M. falcata L. Trockene Plätze. v^3z^3
Hbu verbreitet, z. B. Bodenseeufer, Seedämme in Aschach.
Hbo: Im oberen Theile seltener: Station Rötenbach zwischen Manzen und Weiler (A., H.), Ried bei Lindenberg (H.).

M. falcata × **sativa Rchb.** Bahndämme, Wiesen. v^2z^2
Hbu: Rangierbahnhof, Unterhochsteg.

Hbo: Am Bahnhof Oberreitnau, zw. Lampertsweiler und Schwatzen.
M. lupulina L. Wiesen, Wege, Acker. v^6z^3
Hbu und Hbo.

Melilotus Thuill.

M. altissimus Thuill. Auen, Streuwiesen. v^3z^4
Hbu gemein, im obersten Teil von Hbo seltener; kommt um Weiler vor (H.).

M. officinalis Desr. Wege, Triften. v^2z^2
Scheint selten zu sein:
Hbu: Abhänge an der Bahn zwischen Hochsträfs und Mitten. z^2
Hbo: Abhänge bei der Gmümdmühle (im Vorarlberg sehr selten).

M. albus Desr. Wegränder, Dämme. v^3z^2
Hbu: Bodenseeufer bei Ziegelhaus.
Hbo: Bahndämme von Oberreitnau, Schönau und Heimesreutin, bei Station Schlachters; kommt bei Weiler vor (H.).

Trifolium Tourn.

Tr. pratense L. Wiesen, Triften. v^5z^5
Hbu und Hbo.

Tr. medium L. Wälder, Auen etc. v^5z^4
Hbu und Hbo.

Tr. arvense L., ochroleucum L. und fragiferum L. kommen seltener vor im ö. Gr. um Bregenz.

Tr. montanum L. Trockene Wiesen. v^4z^3
Hbu z. B. Unterhochsteg, Wasserburg, Heuried, Zechwald, Hangnach.
Hbo z. B. zwischen Hegnau und Riggatshofen, bei Station Schlachters u. s. w., auch um Weiler: Wiese bei Au, bei Stockenbühl und an anderen Orten (H.).

Tr. repens L. Wege, Acker. v^5z^4
Hbu und Hbo.

Eine monströse f. **vivipara** (Gallbildung) Hbu: Beim Bahnhof Enzisweiler, in Hoyern neben der Strafse.

Tr. hybridum L. Gräben, Wegränder. v^4z^3
Hbu: Unterhochsteg.
Hbo: Schlachters, Schönau, Mollenberg, Litzis, Bahnhof Hergatz,

zwischen Schönau und Harbatzhofen, Laubenberg, um Weiler häufig (H.) etc.

- Tr. agrarium L.** Triften, trockene Wiesen. v^3z^3
Hbo: Biesings, Bahnhof Oberreitnau, bei Weiler an einigen Stellen (H.), Laubenberg, Rohrach bei Kienberg, am Nadenberg, Iberg bei Riedholz, Bramatsreite, Hochglend bei Gestraz.
- Tr. procumbens L.** Brachen, Auen, trockene Wiesen. v^4z^3
Meist var. **maius Koch**: Hbu: Seeufer bei Unterhochsteg, Senftenau, Holdereggen. Hbo: Bahnhof Oberreitnau, bei Station Schlachters, am Laubenberg, bei Manzen, um Weiler und Ellhofen (H.).
var. **minus Koch**. Hbu: Abhang an der Bahn in Holdereggen. ∞
- Tr. minus Sm. = filiforme auct.** Feuchte Wiesen. v^3z^3
Hbu z. B. am Bodenseeufer b. Wasserburg, Streuwiesen b. Enzisweiler.
Hbo z. B. um Weiler, am Laubenberg.

Lotus Tourn.

- L. corniculatus L.** Trockene Wiesen, Wege. v^4z^3
Hbu und Hbo.
- L. uliginosus Schk.** Wiesen, Auen, Sümpfe, Gebüsche. v^4z^4
Hbu gemein, z. B. Heuried, Klosterteiche, Enzisweiler, Wasserburger Bühel, Eisteiche am Hoyerberg, Reutinstieg, Hecken in Hoyern.
Hbo z. B. Lattenweiler, Unterreitnau, Bösenreutin, um Weiler, bis zum Laubenberg bei Harbatzhofen b. 860 m.

Tetragonolobus Scop.

- T. siliquosus Rth.** Heiden. v^2z^2
Hbu am Bodenseeufer bei Wasserburg (Dobel), im Heuried, am Seeufer beim Nonnenhorn.

Astragalobus Tourn.

- A. glycyphyllos L.** Auen, Gebüsche. v^3z^3
Hbu: Seeufer bei Villa Leuchtenberg, Waldrand bei Hege, Zechwald, Hangnach.
Hbo: Eggetsweiler, Weifsensberg, Johannishügel bei Zeisertsweiler, bei Tobel am Waldrand, im Dunkelbuch, Leiblachabhänge bei Stockenweiler, in Rohrach, im Eistobel bei Ebratzhofen, Hochglend bei Gestraz.

Coronilla L.

- C. Emerus L.** Bodenseeufer. v^2z^1
Bei Wasserburg (Dobel) scheint verschwunden; ein kümmerliches Exemplar am Ufer bei Villa Leuchtenberg; sp in Holdereggen, Gebüsch neben der Bahn. (Manzell bei Friedrichshafen z^3 am Bodensee!)

Hippocrepis L.

- H. comosa L.** z^2
Nur im ö. Gr.: Auen der Bregenzer Ache.

Onobrychis Tourn.

- O. viciaefolia Scop.** Grasplätze. v^3z^3
Hbu: Bahndämme um Lindau, Aschach, am Rangierbahnhof.
Hbo: Bahndämme bei Oberreitnau, Hergensweiler, Heidewiese bei Station Schlachters, bei Humertsweiler; bei Ellhofen und Weiler vereinzelt (H.).

Vicia L.

- V. dumetorum L.** Gebüsch. v³z³
Hbu: Hangnach, Waldrand zwischen Hege und Hattnau am
Schönbühel.
Hbo: Streitelsfinger Tobel, Dunkelbuch, Hegnau gegen Hochsträfs.
- V. Cracca L.** Felder, Triften. v⁵z⁴
Hbu und Hbo.
- V. villosa Roth.**
Hbu: sp am Rangierbahnhof z¹; im ö. Gr. bei Bregenz einmal ge-
funden (Milz).
- V. grandiflora Scop.** Im ö. Gr. bei Bregenz (Milz), Achkies (Kellermann).
- V. sepium L.** Gebüsch, Waldränder. v⁴z³
Hbu und Hbo häufig.
- V. sativa L.** Felder etc. v⁴z³
z. B. Hbo: Stockenweiler, beim Schloß Syrgenstein, Schutt oberhalb
Lindenberg, Waldrand bei Ellhofermoos (H.).
- V. angustifolia All.** Dämme, Felder. v²z³
Hbu: Bahndamm in Hoyern z⁴, auf einem Brachfeld zwischen
Sigmarszell und Thumen, bei Tobel (Gmde. Bösenreutin), Felder
um Itzlings.
- V. Faba.** Auf Ackern in Hbo.
sp Hbo: Waldrand bei Böserscheidegg. z¹
- V. silvatica L.** Im ö. Gr. am Pfänder.

Ervum Tourn.

- E. hirsutum L.** Felder, Brachen. v³z³
Hbu z. B. Bahnabhang bei Hochsträfs.
Hbo: Bahnhof Hergaz, auf Schutt oberhalb Lindenberg, Wolferts-
hofen bei Heimenkirchen, Litzis, Halteplatz Binsenberg; nächst
Weiler hie und da auf Roggenfeldern (H.).
- E. tetraspermum L.** Felder. v²z²
Hbo: Zwischen Schönbühel und Gitzenweiler, Felder bei Adelgunz,
Waldblöße bei Halteplatz Opfenbach. ∞
- E. Ervilia L.**
Hbu: Im Korn bei Rickenbach unweit Lindau (Dobel).

Lens Tourn.

- L. esculenta Mch.**
Hbo: sp auf einem Brachfelde zwischen Thumen und Sigmarszell.

Pisum Tourn.

- Pisum sativum L.** und **P. arvense L.**

Lathyrus Tourn.

- L. tuberosus L.**
Hbo: Bahndamm zwischen Bodolz und Schönau. z²
- L. pratensis L.** Auen, Wiesen, Gebüsch. v⁴z³
Hbu und Hbo.
- L. silvester L.** Waldränder, Abhänge. v²z³
Hbo: Heidewiese bei Station Schlachters, Abhänge beim Schiefs-
platz Lampertsweiler, Waldrand zwischen Tobel und Zeisertsweiler,
Steig bei Bösenreutin, Rohrachtobel.
- L. paluster L.** Nasse Wiesen. v¹z³
Hbu: Schilfsümpfe am Klosterteich (Sch., A.).
- L. vernus Bernh.** Buchenwälder. v¹z²

Hbu: Buchenwäldchen am Wasserburger Bühel (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig von Bayern, Br., Sch., Kellermann).

Phaseolus Tourn.

- c **Ph. vulgaris L. u. Ph. multiflorus Willd.**

28. Fam. **Amygdalaceae Juss.**

Amygdalus L.

A. Persica L.

Prunus L.

P. Armeniaca L.

- P. spinosa L.** Hecken, Auen, Waldsäume. v⁴z³
Hbu z. B. Seeufer bei Nonnenhorn.
Hbo verbreitet, z. B. Niederstaufen, Kapfholz bei Weiler (H.),
Neuhaus bei Scheffau, Haus bei Scheidegg, im Rohrach z⁴ etc.

c **P. insititia L. u. P. domestica L.**

c **P. cerasifera L.**

- P. avium L.** Wälder. v³z³
Hbu: Zechwald, Mozacher Tobel.
Hbo: Zwischen Umgangs und Ruhlands, Tobel bei Schalkenried,
am Kienberg bei Adelberg.

c **P. cerasus Jacq.**

- P. Padus L.** Auen, Wälder. v³z³
Hbu: Zechwald, Rickenbacher Tobel.
Hbo: Leiblachauen, Degermoos, bei Stockenweiler, zwischen Biesings
und Lerchenmühle im Wald, Itzlings, Schwarzensee, Nadenberg,
Argenthal bei Handwerks, zwischen Weiher und Hammermühle,
Bachgebüsch um Weiler nicht selten (H.).

29. Fam. **Rosaceae Juss.**

Spiraea L.

- c u. sp **Sp. salicifolia L.** Gebüsch.

Hbu: Am Bodensee (nach Caffisch!), sp Gebüsch an der Bahn in
Holdereggen.

- c u. sp **Sp. opulifolia L.**

sp Hbo: Gebüsch an der Station Harbatzhofen.

Aruncus L.

- A. silvester L.** Wälder, Abhänge. v⁴z³

Hbu z. B. Mozach, Hangnach, Reutinsteig.
Hbo z. B. Bösenreutiner Tobel, Dunkelbuch, Tobel am Schönbühel,
bei Heimenkirch, Argenthal bei Gestraz, Ellhofer Tobel, Rohrach,
Eistobel bei Riedholz etc.

Filipendula L.

- F. Ulmaria Maxim.** Feuchte Wiesen, Gräben etc. v⁴z³

Hbu und Hbo.

- " " **α) denudata Koch.** Hbu: Um Lindau im Ried mit Phragmites (Dobel).
" " **β) discolor Koch.** Verbreitet.

Geum L.

- G. urbanum L.** Auen, Triften, Gebüsch. v⁴z³

Hbu und Hbo: Um Weiler nicht selten (H.).

- G. rivale L.** Ufer, Moore, Wiesen. v⁴z³
 Hbu und Hbo.
 (G. rivale × urbanum G. Meyer = intermedium Ehrh. Hbo: Bei Weiler (H.); wird noch näher untersucht.)

Rubus L.

- Rubus** wurde nach Karsten H., Deutsche Flora, 2. Aufl., Gera-Untermhaus 1895 Bd. II, bestimmt, z. T. auch nach Dr. Aug. Progel, Flora des Amtsbezirkes Waldmünchen, sowie nach Weifs, Exkursionsflora von Bayern; auch wurden die Exemplare im Herbar Holler verglichen; was nicht vollständig definiert werden konnte, wurde mit der nächstverwandten Spezies identifiziert, um nicht zu viel Arten zu erhalten. Weitere Untersuchungen werden wohl noch Klarheit in die Verteilung der im Gebiete sehr zahlreichen Rubusarten bringen.
- R. saxatilis L.** Steinige Gebüsche. v²z²
 Hbu: Bodenseeufer bei Alwind.
 Hbo: Ruine Ellhofen im obersten Rohrachtobel, vereinzelt im Gerbertobel (H.), Weifsachtobel bei Oberstausen (750 m) ziemlich häufig (H.); im w. Gr. einzeln bei Isny.
- R. Idaeus L.** Gebüsche, Waldschläge. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo.
- R. caesius** × **Idaeus**.
 Hbo: Waldrand bei Oberschoiben oberhalb Weiler (steril).
- R. suberectus Anders.** Moore, Hohlwege. v³z³
 Hbo: Hohlwege in Altrehlings, Hohlweg in Metzlers, im Degermoos, im Ratzenbergermoos.
- R. fissus Lindl.**
 Eine nahestehende Form Hbo: In einem Waldgebüsch bei Wigratzbad. z²
- R. plicatus W. et N.** v¹z²
 Hbu: Zaun in der Senftenau (mit R. Kaltenbachii, R. pilocarpus Gremli und oreogeton F.).
- R. sulcatus Vest.** Waldschläge, Abhänge. v²z²
 Hbo: Hügel am Ratzenbergermoos, Holzschläge oberhalb Hubers.
- R. thyrsoides Focke.**
 " " var. **candicans Weihe.** Hbo: Dunkelbuch im Gebüsch. z²
 " " var. **thyrsanthus Focke.** Hbo: Waldrand bei Mywiler.
- R. Vestii Focke.**
 Hbu: Waldrand zwischen Heimesreutin und Schönbühel.
- R. bifrons Vest.** Gebüsche. v²z³
 Hbu: Zwischen Klostermühle und Lorenzmühle, zwischen Schönbühel und Heimesreutin, Waldländer in der Hangnach. z³
 Hbo: bei Gitzenweiler, am Radenberg mit roten Blüten (flor. ros.).
- R. hedycarpus F.**
 " " δ) **pubescens Whe.** Hbo: Waldrand am Neuweiher bei Metzlers.
- R. villicaulis Koehler.**
 " " var. **discolor Whe.** Waldländer, Gebüsche. v³z³
 Hbu: Hecken in Mozach, Bodenseeufer bei Nonnenhorn, zwischen Schönbühel und Heimesreutin, am Schönbühel.
 Hbo: Zwischen Gitzenweiler und Altrehlings, im Dunkelbuch, Waldschläge bei Hubers, im Rohrach bei Emsgritt, Leiblach zwischen Niederstausen und Hergensweiler, Wald zwischen Weiher und Ellgassen.
- " " **f. flor. roseis:** Waldrand am Wasserburger Bühel.

- R. macrophyllus W. et N.** Gebüsch etc. v³z²
 Hbu: am Seeufer in Nonnenhorn.
 Hbo: An der Nordseite eines Hauses in Taubenberg, am Waldrand bei Wigrazbad, Wald zwischen Mollenberg und Heimholz, beim Schiefsplatz Lampertsweiler.
- „ „ var. **hypoleucus F.**: Hbo: Am Laubenberg bei Harbatzhofen.
- R. sylvaticus W. et N.**
 Hbu: Waldrand bei Hegnau gegen Hochsträfs. z²
- R. tomentosus Borkh.** Im ö. Gr. bei Bregenz (Sauter).
- R. vestitus W. et N.**
 Hbu: Seeufer bei Nonnenhorn.
 Hbo: Wald beim Halteplatz Opfenbach, Laubenberg bei Harbatzhofen; ö. Gr. Buchenberg.
- R. teretiusculus Kalténb.** ö. Gr. Bregenz (Focke).
- R. chlorothyrsos F.**
 Hbo: Feuchte Wälder auf Mergel am Nadenberg zwischen Linden-berg und Ratzenberg.
- R. melanoxyton P. J. Müll.**
 Hbo: Hochwald bei Bramatsreite gegen Oberstein.
- R. Caflischii Focke.** Wälder, Gebüsch. v²z³
 Hbu: Gebüsch in Reutinsteig.
 Hbo: Bösenreutiner Tobel, Waldrand bei Lattenweiler, Eistobel bei Riedholz; ö. Gr. Pfänder nahe dem Gipfel.
- R. epipsilos F.**
 Hbo: Fichtenwald zwischen Stiefenhofen und Hartenegg.
- R. Gremlii F.**
 Hbu: am Lindenhof bei Schachen an einem Zaun.
 Hbo: In einer Waldschlucht bei Schreckenmanklitz.
- R. denticulatus A. Kerner.**
 Hbo: Hochwald bei Bramatsreite, Gmde. Scheidegg.
- R. Radula W. N.** Eine nahestehende Form Hbo: Waldrand bei Wigrazbad.
- R. Menkei Wh. et N.** ö. Gr. am Schlofsberg bei Bregenz (Sauter.)
- R. pallidus Wh. et N.**
 Hbo: am Laubenberg bei Harbatzhofen.
- R. bregutiensis A. Kerner.**
 Hbo: Gebüsch zwischen Reutinsteig und Bösenreutiner Tobel.
- R. thyrsiflorus Wh. et N.**
 Hbo: am Nadenberg.
- R. platycephalus Focke.** Gebüsch.
 Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg, Gebüsch bei Schlofs Alwind.
- R. Koehleri W. et N.** Gebüsch. v²z³
 Hbo: Auf der Scheibe bei Thumen, am Nadenberg, Bergwälder um Bramatsreite.
- R. pilocarpus Gremli.**
 Hbu: an einem Zaun in der Senftenau. z³
- R. Bayeri Focke.** Hochwälder. v³z³
 „ „ f. **typica.** Hbo: Wald bei Hertnegg und am Nadenberg.
 „ „ subsp. **dichromus Progel:** Hbo: Rohrach bei Emsgritt.
 „ „ subsp. **leptocalyx Progel:** Hbo: am Nadenberg.
- R. incultus Wrtg.**
 Hbu: Waldrand zwischen Heimesreutin und Schönbühel. z²
- R. lamprophyllus Gremli.** Wälder. v²z³
 Hbu: Zechwald, Waldrand zwischen Schönbühel und Heimesreutin.
 Hbo: Im Dunkelbuch, Wald zwischen Oberreutnau und Höhenreutin, am Radenberg bei Ratzenberg.

- R. rivularis P. J. M.**
Hbo: Wald bei Station Schlachters.
- R. gracilicaulis Gremli.**
Hbo: Waldschlag beim Halteplatz Opfenbach. z²
- R. serpens Whe.**
Hbo: Feuchtes Gebüsch am Teich bei der Lerchenmühle, Wald zwischen Lindenberg und Ratzenberg.
- R. macranthelus Marss.**
Eine hierher gehörige Form mit roten Blüten: Hbo: Lerchenmühle am Rande des Gebüsches auf Heideboden. z²
- R. hirtus W. et N.** Wälder. v²z³
Hbu: Wald an der Landstrafse am Schönbühel.
Hbo: Im Rohrach bei Kienberg, Hochwälder um Oberstein; im w. Gr. Eisenharzer Wald (Martens).
- R. Güntheri W. et N.** Hochwälder.
Hbo: Am Nadenberg gegen Ratzenberg. z³
- R. Kaltenbachii Metsch.**
Hierher gehörige Formen mit rotem Griffel: Hbu: am Zaun in der Senftenau mit *R. pilocarpus* Gremli. z¹
- R. corylifolius Sm.**
Hbu: Hecken an der Bleiche.
Hbo: am Nadenberg in der var. γ . *glabratus* Whe.
" " var. ζ *oreogeton* F. (nahe dem *R. Villarsianus* F.).
Hbu: Zaun in der Senftenau.
Hbo: Wald bei Station Schlachters.
- R. caesius L.** Acker, Gebüsch, Auen. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- R. odoratus L.**
sp Hbo: Abhänge beim Schlofs Syrgenstein.

Fragaria L.

- Fr. vesca L.** Wälder, Gebüsch. v⁵z⁵
Hbu und Hbo.
- Fr. moschata Duch. = elatior Ehrh.**
Nur im ö. Gr.: Mehrerau und Pfänder ∞ (Bruhin).
- Fr. viridis Duch.**
Im w. Gr. an sonnigen Rainen bei der Briegelmühle bei Eisenharz z² (Herter).

Comarum L.

- C. palustre L.** Moore, Gräben. v³z³
Hbu: Wasserburger Bühel.
Hbo: Sauters, Wigrazbad, Degermoos, am Schwarzensee, Leintobel, Rötenbacher Filz, Ratzenbergermoos, Gräben der Ruine Schreckenmanklitz, Trogener Moos (H.), Moos bei Stockerbühl (H.).

Potentilla L.

- P. anserina L.** Wege, Felder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.
- P. reptans L.** Wege, Moore, Triften. v⁴z⁴
Hbu und Hbo.
- P. Tormentilla \times superreptans.** v²z²
Hbo: Hubers an der Leiblach, an der Böschung des Weges zwischen Hergensweiler und Stockenweiler.

- P. Gremlii Zimmeter.** Moore, Waldwiesen. v^2z^3
Hbo: Moorwiesen bei Wigratz und Mywiler, in den Leiblachauen bei Wigratzbad, auf Heidewiesen bei Laimtobel. ö. Gr. Hbu: Bäume (Glanz).
- P. silvestris Neck. = Tormentilla Schrk.** Gebüsch, Heiden, Moore. v^5z^4
Hbu und Hbo.
- P. fallax Moor.**
Hbo: am sonnigen Abhang oberhalb Weiher. $z^1 \infty$
- P. opaca L. = verna aut.** Heiden, Grasplätze. v^3z^3
Hbu: Am Zechwald, bei Mozach.
Hbo: Am Schwarzensee auf Kies, bei Handwerks an der Argen, bei Nägelschub, Holzleute, Mariathann, Ellhofer Tobel, Iberg bei Riedholz, Waldwiesen bei Schreckenmanklitz (H.), Heide bei Manzen (H.), bei Lindenberg (H.), um Weiler nicht selten (H.).
- P. glandulifera Krasan.** Im ö. Gr. Pfänder (Schönach).
- P. sterilis Grcke.** Abhänge, Grabenränder. v^5z^4
Hbu gemein, Hbo im oberen Teil etwas seltener, z. B. zwischen Weiher und Hammermühle; um Weiler gar nicht selten (H.).
- P. norvegica L.** Im w. Gr. bei Reipertshofen in einem trockengelegten Weiher (Pfanner, um 1830).

Alchemilla Tourn.

- A. vulgaris L.** Wiesen, Wälder, Heiden. v^5z^4
Hbu und Hbo.
- A. alpina L.** ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache. z^2
- A. arvensis Scop.** Äcker, Brachen. v^4z^4
Hbu und Hbo, hier z. B. Riggatshofen, Heimesreutin, Oberreitnau, Oberscheiben bei Weiler, Mywiler, Schwarzsee etc.

Sanguisorba L.

- S. officinalis L.** Feuchte Wiesen. v^4z^4
Hbu und Hbo im unteren Teil verbreitet; um Weiler nur bei Lindenberg, im Ratzenberger Moos gefunden (H.); fehlt sicher um Weiler (H.).
- S. minor Scop.** Triften, Auen. v^4z^3
Hbu und Hbo, auch um Weiler verbreitet (H.).

Agrimonia Tourn.

- A. Eupatoria L.** Triften, Wälder, Hecken. v^4z^2
Hbu z. B. Exerzierplatz bei Wesen, Hangnach.
Hbo verbreitet, bis Laubenberg bei Harbatzhofen und Neuhaus bei Scheffau; soll um Weiler fehlen (H.).
- A. odorata Mill.** Waldränder. v^3z^2
Hbo: Leiblachsberg, Kudermühle bei Hergensweiler (B.), Argenthal bei Untersteig, Rothachauen bei Siebers, Waldwiesen beim Mönchenstein (H.), an der Strafe nach Oberreutte (H.), auch sonst um Weiler ziemlich verbreitet (H.).

Rosa Tourn.

- R. centifolia L.**
sp in Hbu an einer Hecke in der Bleiche.
- R. arvensis L.** Gebüsch. v^4z^3
Hbu: Schönbühel, Waldrand bei Mozach.
Hbo: Niederstaußen, Leiblach bei Hergensweiler, im Rohrach,

Wigratzbad, Laubenberg, Eistobel bei Riedholz, Hoheneck bei Ebratzhofen, Iberg bei Mayerhöfen etc., bei Weiler (H.).
f. *umbellata* Chr. Im w. Gr. Hecken bei Eglofs (Herter).

- R. villosa** L. var. *mollis* Sm. Waldränder.
Hbo: Am Waldrand zwischen Bodolz und Taubenberg. $v^{1z^2} \infty$
Beschreibung: Stacheln ungleich, fein und spärlich, die unteren Stacheln mehr pfriemlich, gerade, die oberen Stacheln an den Blattspindeln gekrümmt, Blättchen bis $5\frac{1}{2}$ cm lang und 3 cm breit, oval, 5—7, feindrüsig gezeichnet, zwischen 2 Hauptzähnen 2—3 kleine Zähnen, Blattunterseite filzig mit feinen Stieldrüsen; Fruchtbecher einzelstehend, mit 2 cm langem, drüsigem Fruchtstiel, kugelig, an der Basis fein drüsenstachlig; Kelchblätter drüsig, mit 0—5 Fiederteilen, nach dem Verblühen aufgerichtet bleibend; Blütezeit Juni; Höhe des Strauches 80—120 cm. — Unterscheidet sich von *R. tomentosa* Sm. durch die spärliche feine Bestachelung, durch die grossen, unterseits stieldrüsiges Blätter mit feiner, drüsigiger Bezählung, durch die geringe Höhe des Strauches. Im angrenzenden Oberschwaben nicht selten, cf. Dr. Probst in Essendorf, „Zur Kenntnis der in Oberschwaben wildwachsenden Rosen“ im 43. Jahrgang der Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Württemberg 1887 p. 146. Im w. Gr. am Westabhang des schwarzen Grates (Dr. Probst).
- R. alpestris** Rapin: Im w. Gr. ein Stock oberhalb Bolsternang in 850—900 m auf einer umzäunten Viehweide (Herter u. Dr. Probst 1886).
- R. cinnamomea** L. Auen, Hecken, Waldränder. v^{3z^2}
Hbu: Gebüsch in Holdereggen am Zechwald, am Seeufer zwischen Wasserburg und Schachen, Finegg.
Hbo: Gebüsch bei Wigratzbad, bei Ellhofen.
" " f. *foecundissima* Münchhausen.
Hbu: Waldrand am Zechwald, Hecken zwischen Reutin und Mozach.
Hbo: bei Hergensweiler (Sch.).
- R. alpina** L. Waldschluchten. v^{3z^3}
Hbu: In der Hangnach.
Hbo z. B. Rohrach, am Nadenberg, Eistobel bei Riedholz, Laimtobel, Tobel um Lindenberg, Argenthal bei Gestraz, zwischen Heimenkirch und Gofsholz, bei Ablers.
" " var. *pyrenaica* Gouan. Hbo: Rohrach bei Westkienberg, ö. Gr. am Pfänder verbreitet.
" " var. *laevis* Ser. Z. B. Hbo: Schreckenmanklitz.
- R. glauca** Vill. Gebüsche. v^{3z^2}
Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg.
Hbo: Um Scheidegg, zwischen Weiler und Schreckenmanklitz, im Rohrach und an anderen Orten, bei Weiler (H.).
- R. canina** Christ. Waldränder, Hecken. v^{4z^3}
" " var. *lutetiana* Léman. Z. B. Hbo am Laubenberg, Eistobel.
" " var. *dumalis* Bechst. Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg.
- R. dumetorum** Thuill.
" " var. *platyphylla* Chr. Hbo: Am Laubenberg bei Harbatzhofen. $z^2 \infty$
- R. coriifolia** Fries.
Hbo: In Manzen ein über 2 m hoher Strauch. ∞ Im w. Gr. Siggen, an der Halde gegen Albris, schwarzer Grat gegen Dürrenbach (Herter).
- R. tomentella** L.
" " var. *obtusifolia* Desv. Hbu: An den Klosterteichen. z^2

R. brigantina Borb.

Im ö. Gr. Bregenz (Borb. Monogr. p. 506).

„ „ var. **affinis**. Im w. Gr. am schwarzen Grat 1100 m (Herter).

R. sepium Thuill. = agrestis Savi var. pubescens Rapin.

Hbu: Steiniges Seeufer bei Nonnenhorn. z²

Im w. Gr. oberhalb Wehrlang und am Weg von Holzleute gegen den schwarzen Grat (Herter).

R. cuspidatoides Crép.

Im ö. Gr. Gebhardsberg (Kerner bei Déségl.).

R. rubiginosa L.

Hbu: Rand des Zechwaldes bei Unterhochsteg.

„ „ f. **comosa Chr.** Im w. Gr. am Saum des Eisenharzer Waldes (Herter).

R. graveolens Gren.

Im w. Gr. auf dem Gipfel am südlichen und westlichen Abhang des schwarzen Grates, Bolsternang etc. (Herter).

R. tomentosa Sm.

Hbo: Ein Strauch an der Landstrafse nach Weiler auf der Höhe von Scheidegg. Im w. Gr. Isnyberg bei Eglöfs, Eisenbacher Tobel etc. (Herter).

Crataegus L.

Cr. oxyacantha L. Hecken, Waldränder. v⁴z³

Hbu und Hbo.

Cr. monogyna L. v²z²

Hbu: Hecken in Holdereggen mit voriger.

Hbo: Waldrand zwischen Möllen und Mariathann; fehlt Weiler (H.). ∞

Amelanchier Medik.

A. vulgaris Mnch. Nagelfluhwände. v¹z²

Hbo: Abhänge im Rohrachtobel; ö. Gr. bei der Ruggburg (B., A.).

Pirus Tourn.

P. communis L. Wälder, Hecken. v³z² sonst c

Hbo: Rohrachtobel, Egg bei Rötenbach, Rothachauen bei Weiler.

P. malus L. Wälder. v²z² sonst c

Hbo: Rohrachtobel, Hausbachanlagen bei Weiler (H.).

P. aucuparia Gärtn. Wälder. v⁴z²

Hbu z. B. Rickenbachertobel, Hangnach.

Hbo z. B. Leiblachabhänge bei Stockenweiler, Rohrach, Degermoos etc., sonst meist c.

P. domestica Sm.

Im ö. Gr. am Pfänder (Sauter).

P. Aria × Aucuparia Irmisch.

Im ö. Gr. Wald nahe der Grenze am Schlosse Wellenstein (Dobel).

P. Aria Ehrh. Waldschluchten. v³z³

Hbu: Rickenbacher Tobel. v²

Hbo z. B. Rohrachtobel, Ellhofer Tobel, Gerbertobel, Eistobel, Tobel bei Buchenbühl etc.

30. Fam. **Onagrariaceae Juss.**

Epilobium L.

E. angustifolium L. Auen, Wälder. v⁵z⁴

Hbu und Hbo.

E. Dodonaei Vill. Kiesplätze.

Hbo: Mit *Myricaria germ.* auf Kies neben der Bahn beim Schwarzen-see z³; im w. Gr. Argenauen nahe der Mündung (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig, Martens).

E. Fleischeri Hochst.

Im ö. Gr.: Bregenzer Achekies (Sauter).

E. hirsutum L. Ufer, feuchte Orte.

v³z³

Hbu: Seeufer Nonnenhorn, Wasserburger Bühel, bei Ziegelhaus, Bettbauer Weiher, an der Bleiche.

Hbo: Streitelsfingen, am Bahnhof Schlachters, am Feuerloch in Wohmbrechts, bei Hagspiel, feuchte Waldlichtungen am Mönchenstein (H.).

E. parviflorum Retz. Gräben.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo.

E. parviflorum × **roseum** = **Knafii Celak.**

Hbo: Graben am Abhänge von Scheffau nach Neuhaus.

z²

E. parviflorum × **montanum** = **crassicaule Gremli.**

Hbo: Strafsengraben in Neuhaus.

z¹

E. montanum L. Feuchte Wälder, Gebüsch.

v⁴z³

Z. B. Hbo: Streitelsfinger Tobel, Schüttentobel bei Ebratzhofen, Ruine Ellgassen, Börserscheidegg, um Weiler (H.);

meist als f. ð) **E. collinum Koch**, z. B. Hbu: Enzisweiler am Bahndamm, zwischen Hege und Hegnau; Hbo: Emsgritt, Natterersäge, zwischen Oberreitnau und Oberrengersweiler, Wald zwischen Weiher und Ellgassen, Egg bei Röthenbach etc.

E. lanceolatum Seb. et Maur.

Hbo: Am Strafsengraben bei Neuhaus Gemeinde Scheffau z³, Waldlichtung nächst dem Mönchenstein bei Weiler (leg. Herr, determ. Prof. Weifs!).

E. roseum Retz. Gräben, feuchte Stellen.

v⁴z³

Hbu und Hbo.

E. palustre L. Sümpfe, Moore.

v³z³

Hbo: Degermoos, feuchte Wiese zwischen Zeisertweiler und Oberhof, Bleichen bei Wohmbrechts, Schwarzensee, Röthenbacherfilz, Ratzenbergermoos, Moos bei Ruppenmanklitz, Moos bei Stockenbühl (H.).

†?

E. adnatum Gris.

In Hbu: Auf Sumpfwiesen (Dobel). Im ö. Gr. gemein bei Bregenz (Sauter).?

Oenothera L.

Oen. biennis L. Ufer.

v²z³

Hbu: Längs des ganzen Bodenseeufer, Leiblachauen, von der Hangnach bis zur Mündung.

Hbo: Weidenabhang am Fußpfad Auers—Röthenbach (H.).

Circaea Tourn.

C. lutetiana L. Gebüsch, Wälder, Hecken.

v⁴z³

Hbu: Hecken beim Bahnhof Lindau, in der Hangnach, in Äschach, Schachen, Zechwald.

Hbo: im Rohrachtobel zwischen Waltersberg und Oberreitnau, Waldlichtung beim Mönchenstein (H.).

C. intermedia Ehrh. Waldschluchten.

v³z³

Hbu: Rickenbachertobel hinter der Milchfabrik.

Hbo: Tobel bei Streitelsfingen, Wald zwischen Schlachters und

Eggenwath, Rohrachtobel, Gerbertobel, Nagelfluhabhänge bei Mal-
 aichen a. d. Argen; um Weiler häufiger als *C. lutet.* (H.), z. B.
 Hausbachanlagen.

- C. alpina** L. Hochwälder. v³z²
 Hbo: Nadelwälder bei Lindenberg, Wald zwischen Biehl und
 Scheffau, Tobel oberhalb Heimenkirch, Wald bei Eberschwand,
 Leiblachabhänge bei Wigrazbad.

31. Fam. Halorhagidaceae R. Br.

Myriophyllum Vaill.

- M. verticillatum** L. Gräben, Teiche. v³z³
 Hbu: Wasserburger Bühel, Gräben bei Villa Amsee, Gräben bei
 Ziegelhaus.
 Hbo: Teich zwischen Lindenberg und Börserscheidegg.
M. spicatum L. Teiche. v²z³
 Hbu: Kleiner See zwischen Aschach und Lindau, Wasserburger
 Bühel.
 Hbo: Am Schwarzensee.

32. Fam. Hippuridaceae Lk.

Hippuris L.

- H. vulgaris** L. Ufer. v²z³
 Hbu: Schilfsümpfe im Überschwemmungsgebiet des Bodensees,
 z. B. bei Villa Amsee, beim Rangierbahnhof, bei Villa Leuchten-
 berg zwischen Wasserburg und Nonnenhorn.

33. Fam. Callitrichaceae Lk.

Callitriche L.

- C. stagnalis** Scop. Gräben, Feuerteiche. v³z³
 Hbu: Gräben im Ziegelhaus, bei Villa Amsee, am Rangierbahnhof.
 Hbo: Feuerteich in Wohmbrechts, in Adelgunz.
C. vernalis Kützing. Sümpfe, Teiche. v²z³
 Hbo: Feuerteich in Heimholz, Sümpfe zwischen Scheidegg
 und Weyenried, Sümpfe oberhalb Oberstein gegen St. Ulrich. ∞

34. Fam. Ceratophyllaceae Gray.

Ceratophyllum L.

- † **C. submersum** L.
 Hbu nach Dobel um Lindau (Sendtner); im ö. Gr. Bregenz (Milz);
 ist nach Durchsicht des Herbars zu streichen, weil eine Chara!
C. demersum L. Gräben, Teiche. v³z⁴
 Hbu: Kleiner See zwischen Lindau und Äschach z⁵, Gräben bei
 Villa Amsee z⁴, Wasserburger Bühel z⁴.
 Hbo: Feuerteich in Streitelsingen, Teich in Wohmbrechts (c. fr.),
 Teich in Mollenberg (c. fr.).

35. Fam. **Lythraceae** Juss.

Lythrum L.

L. Salicaria L. Gräben, Tümpel.
Hbu und Hbo.

v⁴z⁸

36. Fam. **Tamariscaceae** Desv.

Myricaria Desv.

M. germanica Desv. Kiesplätze.

In Hbu ehemals: Seeufer bei der Leiblachmündung (Dobel).

Hbo: Kiesplatz bei Schwarzensee z²; ö. Gr. Kies der Bregenzer
Ache. z³ Im w. Gr. Argen bis zum Bodensee (Schüble).

37. Fam. **Philadelphaceae** Don.

Philadelphus L.

Ph. coronarius L.

38. Fam. **Cucurbitaceae** L.

Cucurbita L.

C. Pepo L., **Melopepo** L. und **maxima** Duch.

Cucumis L.

C. sativus L.

Sicyos L.

S. angulata L.

In Hbu häufig in Gärten.

39. Fam. **Portulacaceae** Tourn.

Portulaca Tourn.

P. oleracea L. Bahndämme.

v²z²

Hbu: Viehrampe am Rangierbahnhof z¹ (1899), z³ (1900), am
Bahndamm zwischen Holdereggen und Hoyern, Weinberge in Al-
wind.

40. Fam. **Paronychiaceae** St. Hill.

Herniaria Tourn.

H. glabra L. Sandige Plätze.

v²z²

Hbu: Am Schiffsländeplatz Lindau.

z¹

Hbo: Bahndamm zwischen Oberreitnau und Höhenreutin z³ (Sch., A.),
zwischen Pflaster mit *Sedum dasyphyllum* vor dem Pfarrhaus in
Mariathann.

41. Fam. **Scleranthaceae** Lk.

Scleranthus L.

Sci. annuus L. Felder.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo, z. B. Litzis, Schwarzensee, bei Syrgenstein, am
Daxenberg bei 950 m etc., bei Weiler zweifelhaft (H.).

42. Fam. **Crassulaceae DC.****Sedum L.**

- S. maximum L.**
Hbo: sp an einer Mauer in Stiefenhofen.
- S. purpureum Lk.** Äcker. v^1z^3
Hbo: Zwischen Oberholz und Roggenzell in einem Kornfeld, Oberstauen am Wege nach Steibis (H.).
Hbu: Bei Lindau (Madlener).
- S. villosum L.**
Im ö. Gr. am Schlofsberg bei Bregenz (Sauter). w. Gr. Kislegg (Schüble).
- S. album L.** Mauern. v^2z^3
Hbo: Hausdach in der Burggasse Lindau, Stadtmauern Lindau, beim Männerbad Lindau, Eisenbahndamm bei Enzisweiler.
Hbo: Grünenbach, Bahnhof Oberstauen (H.).
- S. dasyphyllum L.**
Hbo: Zwischen Pflaster vor dem Pfarrhause in Mariathann. z^3
- S. acre L.** Äcker, trockene Plätze. v^3z^3
Hbu: Rangierbahnhof, Bahndämme in Holdereggen. ∞
Hbo: Am Bahnhof Röthenbach (H.), Kirchhofmauer in Ellhofen (H.).
- S. boloniense Loisel.** Trockene Plätze, Mauern. v^4z^3
Hbu und unterer Teil von Hbo verbreitet, fehlt jedoch um Weiler (H.).
- S. reflexum L.** Mauern, Grasplätze. v^2z^3
Hbu: An der Strafsenböschung bei der „Lerche“ in Aschach mit *Hemerocallis fulva*; an einer Thoreinfahrt zwischen Mozach und Reutin, am Seeufer bei Villa Leuchtenberg; ö. Gr. bei Bregenz gemein (Custer, Sauter).
- qsp **S. spurium L.** Grasplätze, Raine. v^3z^4
Hbo: In Witzigmänn, an einem Waldweg bei Harbatzhofen gegen den Ellhofer Tobel, am Waldrand beim Kapfholz oberhalb Weiler (H.), an Mauern in Mölln, in Oberleute, Ellhofen, Geigersthal, Abhang am Bahnwärterhäuschen unterhalb Harbatzhofen z^5 , in Grünenbach auf einer steinigen Wiese, an einem Rain an der Strasse von Eglofstein nach Happareutte z^4 ; ö. Gr. Nagelfluhfelsen beim Pfänderhôtel.
- Sempervivum L.**
- S. tectorum L.**
c auf Mauern; qsp im w. Gr. auf einer alten Mauer in Rudenweiler. z^3

43. Fam. **Grossulariaceae DC.****Ribes L.**

- R. grossularia L.** Waldschluchten.
Hbo: im Bösenreutiner Tobel z^2 , im Wald zwischen Hegnau und Riggatshofen.
sp in Hbu: Eisenbahndamm Lindau; sonst c.
- R. alpinum L.** Hbo: Bergabhänge am Kapfwald zwischen Weiler und Oberreutte (H.) $z^2 \infty$; ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- R. nigrum L.** Wälder. v^2z^2
Hbo: Wald zwischen Hergensweiler und Natterersäge; Wald zwischen Burkartshofen und Kremten.
- c **R. rubrum L.**

44. Fam. **Saxifragaceae Vent.**

Saxifraga L.

S. Aizoon Jacq.

Hbo: An einem tertiären Nagelfluhfelsen im Eistobel bei Riedholz z², im Weissachtobel (H.).

S. mutata L.

Hbo: Säge beim Lanzenbach bei Steibis unweit Oberstaufen (H.), im Weissachtobel bei Oberstaufen z³ (H.).

S. oppositifolia L.

Hbu: Am Seeufer zwischen Reutenen und Wasserburg an mehreren Stellen (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig, Dobel, Kellermann, Sch., A.). Blüht bereits Mitte Februar.

S. aizoides L. Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ach. z³

Hbo: im Gerbertobel, an einer Stelle am Eyenbach eine ganze Wand bedeckend bei knapp 750 m (der Bach entspringt am Sulzberg bei 950 m, also nicht mit dem Wasser herabgekommen!) (H.). Im Weissachtobel bei Oberstaufen z³ bei 750 m (H.).

S. decipiens, Ehrh.

sp: Hbu Seeufer bei Wasserburg z² (Sch.).

S. Hirculus L.

Im w. Gr.: Isny (Gareke), am Stadtweiher bei Leutkirch (Kolb).

S. tridactylites L.

Hbu: Zwischen den Eisenbahnschienen in Holdereggen. v¹z⁵

S. rotundifolia L. Hochwälder. v²z³

Hbo: Eistobel bei Riedholz; Argenabhänge bei Au (Gmde. Grünenbach), Wald zwischen Burkartshofen und Kremlin, am Daxenberg oberhalb Oberstein (ca. 1000 m).

Chrysosplenium Tourn.

Chr. alternifolium L. Feuchte Wälder. v⁴z⁴

Hbu und Hbo; auch bei Weiler verbreitet (H.).

Chr. oppositifolium L.

Hbo: In einer Waldquelle bei Streitelsfingen bei Lindau (Madlener im Herbar des Landesmuseum in Bregenz).

Parnassia Tourn.

P. palustris L. Feuchte Wiesen. v⁵z⁴

Hbu und Hbo.

45. Fam. **Umbelliferae Juss.**

Hydrocotyle Tourn.

H. vulgaris L. Moorwiesen, Teichränder. v²z³

Hbu: Sumpfwiesen am Wasserburger Bühel z⁴, Sumpfwiesen nördlich von Enzisweiler (Kellermann).

Hbo: Rand des Aschbachweiher bei Oberreitnau, am Rand des Waldteiches bei Station Schlachters.

Sanicula Tourn.

S. europaea L. Wälder. v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Astrantia Tourn.

- A. major L.** Wälder, Auen. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. im ganzen Ach-, Argen-, Leiblach-,
Durrach- und Rothachthal und in den Nebenschluchten.

Cicuta L.

- C. virosa L.**
Hbu: Sumpfwiesen bei Lindau (Dobel).
Hbo: Gräben und Ufer am Schwarzensee. z³

Helosciadium Koch.

- †? **H. repens Koch.** Gräben.
Hbu: Auf Sumpfwiesen bei Lindau (Dobel).

Aegopodium L.

- Aeg. Podagraria L.** Hecken, Gebüsch. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.

Carum L.

- C. Carvi L.** Wiesen, Wegränder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.

Pimpinella L.

- P. magna L.** Wiesen. v⁵z⁵
" " var. **rosea L.** Hbo: Scheidegg.
P. saxifraga L. Triften. v³z³
Hbu: Bodenseufer bei Unterhochsteg, bei den Klosterteichen,
Hangnach.
Hbo: Bahndamm bei Schönau, Streuwiesen bei Hergensweiler,
Rohrachtobel, Abhänge bei Ruppenmanklitz, Neuhaus, Laimtobel,
im Argenthal am Nadenberg, am Schwarzensee, bei Mellatz, Edel-
litz, Lengaz, Ellhofen (H.), Kiesplatz bei Station Rötenbach (H.) etc.

Berula Koch.

- B. angustifolia Koch.** Gräben. v³z⁴
Hbu: in Reutin, beim Ziegelhaus, bei Unterhochsteg in einem
Quellbache, bei Betttau und Mitten, Wasserburg.
Hbo: bei Oberreittau, Unterrengersweiler.

Sium L.

- †? **S. latifolium L.**
Hbu: An Teichen bei Lindau (Dobel). (Fehlt auch Vorarlberg!)

Oenanthe L.

- Oen. aquatica Lam.** Teiche, Sümpfe. v²z²
Hbu: Schilfsumpf bei Villa Amsee.
Hbo: Aschbachweiher bei Oberreittau, Oberreittau bei Lindau
(Dobel), Waldteich bei Station Schlachters, Neuweiher bei Metzlers,
am Schwarzensee.

Aethusa L.

- Aeth. Cynapium L.** Gärten, Schutt. v²z²
Hbu: Auf Schutt am kl. See in Lindau, am Realschulgarten unter
der Lindenschanze, beim Schloß Wasserburg (B.), Garten in Äschach.
Hbo: Wohmbrechts; um Weiler in Gärten verbreitet (H.).

Foeniculum Adans.

c **F. capillaceum Gil.**

Silaus Bess.

S. pratensis Bess. Feuchte Wiesen.

v²z³

Hbu: An Wegen im Heuried, zwischen Rickenbach und Unterhochsteg, am Bodenseeufer bei Zech, am Bahnhof Wasserburg, Streuwiesen zwischen Hegnau und Hege, Seeufer bei Nonnenhorn.
Hbo: Ruppenmanklitz bei Weiler (H.), bedarf noch der Untersuchung!

Levisticum Koch.

c **L. officinale Koch.**

sp in Hbo: Geisgau bei Niederstaufen.

Selinum L.

S. carvifolia L. Feuchte Wiesen.

v³z³

Hbu: Heuried, Klosterteiche, Wasserburger Bühel.
Hbo: Thumen, Schwarzensee, Ratzenbergermoos.

Angelica L.

A. silvestris L. Gebüsche, Ufer.

v⁵z³

Hbu und Hbo.

" " var. **montana Schleich.**

v³z³

Hbo: In Waldschluchten, Rohrach, Ellhofer Tobel, bei Hochglend (Gmde. Gestraz). ∞

Peucedanum L.

P. palustre Mnch. Moore, Sumpfwiesen.

v⁴z³

Hbu: Heuried, Wasserburger Bühel, Reutin, Klosterteiche, Hege, Betttau etc.

Hbo: Oberreitnau, Unterreitnau, Zeisertweiler, Schlachters, Degermoos; in allen Hochmooren, z. B. Rötenbacher Filz, Laimtobel, bei Isenbretzhofen, bei Hagspiel, am Schwarzensee, Ratzenbergermoos.

P. Cervaria Cuss. Heidewiesen.

In Hbu: Am Bodenseeufer (Dobel).

Imperatoria L.

h u. sp **I. Ostruthium L.**

sp: Hbo an einem Obstbaum zwischen Ellhofen und Simmerberg, an einem Stadel neben der Strafe bei Schröcklenberg, in einem Grasgarten in Hergensweiler, in Grasgärten bei Weiler v³ (H.).

Anethum Tourn.

c u. sp **A. graveolens L.**

sp Hbu: Auf Schutt bei Lindenhof, am Eisenbahnseedamm Lindau.

Pastinaca Tourn.

P. sativa L. Wege, Wiesen.

v³z³

Hbu und unterer Teil von Hbo bis gegen Hergaz verbreitet. Hbo um Weiler fehlend (H.).

Heracleum L.

H. Spondylium L. Wiesen.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo verbreitet („Übrigboschen“).

" " f. **elegans Jacq.** In Hbo: Obstwiese in Schönau.

z¹

Caucalis L.

C. daucoides L.

sp Hbo: An der Reuttemühle bei Wohmbrechts.

z¹

Daucus Tourn.

D. Carotta L. Wiesen, Brachen.

Hbu und Hbo gemein.

v⁵z⁴

Torilis Adans.

T. Anthriscus Gmel. Wege, an Mauern.

Hbu: Schönbühel.

Hbo: Hummertweiler, zwischen Hergensweiler und Stockenweiler, Umgangs bei Opfenbach, Argenthal bei Untersteig, Malaichen bei Gestraz, Zwieseler bei Heimenkirch, Hochglend bei Gestraz, Mölln bei Mariathann; an Hecken bei Weiler zerstreut, z. B. am Kapfholz (H.).

v³z²

†?

T. arvensis Huds. = infesta Koch.

Im ö. Gr. Bregenz, Bodenseeufer gemein (Custer).

Anthriscus Hoffm.

A. silvestris Hoffm. Wiesen.

Hbu und Hbo gemein („Morre, Übrigstengel“).

v⁵z⁴

A. Cerefolium Hoffm. Zäune.

sp Hbu: Am Schönbühel, in Schachen, in Wasserburg.

v²z³

Chaerophyllum L.

†?

Ch. temulum L.

In Hbu: An Hecken bei Lindau (Dobel).

Ch. aureum L.

In Hbu: Hecken bei Lindau (Dobel).

Hbo: An Gräben zwischen Weiler und Hasenried, Gebüsch am Hausbach beim Doktorshaus (H.).

Ch. hirsutum Koch. Wiesen.

Hbu und Hbo gemein.

v⁵z⁴

Ch. Villarsii Koch.

Hbo: Hausbachanlagen und Hasenried zwischen Weiler und Oberreutte nicht selten (H.).

Pleurospermum Hoffm.

Pl. austriacum L.

Im ö. Gr. auf Kies der Bregenzer Ache bei Hard v¹z¹; fehlt in Vorarlberg (Richen); stammt jedenfalls vom Hochgrat (H.) oder Rindalphorn (Sendtner, H.).

46. Fam. **Araliaceae Juss.**

Hedera L.

H. Helix L. Wälder, Baumstämme, Mauern.

v⁵z⁴

Hbu: „Um den Bodensee in den Obstgärten an den Obstbäumen besonders verbreitet und blühend“ (Sendtner), gilt heute noch im vollsten Maße.

Hbo z. B. um Weiler (H.) verbreitet.

47. Fam. **Cornaceae DC.**

Cornus Tourn.

- C. sanguinea L.** Gebüsch, Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
- C. stolonifera Mchx.**
sp Hbu: Leiblachmündung z³, Hecken an der Bahn in Holder-
eggen z³, Gebüsch am See zwischen Reutenen und Wasserburg.
- C. mas.**
sp Hbu: Am Seedamm in Äschach, am Seeufer bei Nonnenhorn.

48. Fam. **Loranthaceae Don.**

Viscum L.

- V. album L.** Auf Bäumen. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

49. Fam. **Caprifoliaceae Juss.**

Adoxa L.

- A. moschatellina L.** Gebüsch. v²z³
Hbu: Am Klosterteich in Gebüsch, Strafsenböschung in Schön-
garten (B., A.).
Hbo: Bei Weiler nur im Gebüsch bei Hasenried gefunden (H.).

Ebulum Ponted.

- E. humile Grcke.** Waldschläge. v⁴z³
Hbu: Schönbühel.
Hbo: Oberholz, Sigmarszell, Leiblachabhänge bei Stockenweiler,
Nadenberg, Ratzenberg, Oberberg bei Weiler etc. („Hirschtsee“).

Sambucus Tourn.

- S. nigra L.** Waldschläge. v³z³
Hbu: Rickenbacher Tobel.
Hbo: Ach bei Höhenreutin, bei Thumen, Weifensberger Tobel,
Argenthal, Ellhofer Tobel u. s. w.
- S. racemosa L.** Waldschläge. v⁴z³
Hbu: Am Schönbühel, Mozacher Tobel.
Hbo verbreitet, z. B. bei Oberreitnau an der Achberggrenze,
Leiblachabhänge bei Stockenweiler, Mywiler, Röttenbach, Ried-
hirsch, Weiher, Ellhofer Tobel u. s. w.

Viburnum L.

- V. Lantana L.** Auen, Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
- V. opulus L.** Auen, Bachufer. v⁴z³
Hbu z. B. Seeufer, Nonnenhorn.
Hbo z. B. Taubenberg, Mollenberg, Niederstauen, Malaichen
a. Argen u. s. w.

Lonicera L.

- L. Periclymenum L.**
Im ö. Gr. Bregenz gegen den Gebhardsberg (Dalla Torre).

- L. Xylosteum L.** Gebüsch, Auen. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- L. nigra L.** Waldschluchten. v³z⁸
 Hbo: Rohrach, Litzis, Oberstein, Isenbretzhofen, Eistobel, Iberg, Ablers, Gerbertobel (H.), zwischen Kremmlerbad und Hinterreutte im Gebüsch (H.).
- L. coerulea L.** Gebüsch.
 Hbo: Schweinebach bei Isny nahe der w. Gr. (Herter); ö. Gr. Pfänder ? (Dobel).
- L. alpigena L.** Waldschluchten. v³z²
 Hbo: Wald bei Stat. Röthenbach, Rohrachtobel am Nadenberg, zwischen Litzis und Opfenbach, Eistobel, Argenthal bei Untersteig, Iberg bei Riedholz, Tobel bei Ablers, Ruine Ellhofen, Hausbachtobel (H.), Tobel beim Mönchenstein (H.).

Symphoricarpus Dill.

- c **S. racemosus Mchx.**

50. Fam. **Rubiaceae DC.**

Sherardia Dill.

- Sh. arvensis L.** Saatfelder, Brachen. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.

Asperula L.

- A. tinctoria L.**
 sp in Hbu: Auf einem Mauervorsprung des Quadt'schen Schlosses im „Engel“ in Aschach neben der Straße z^t, steril (fehlt im Vorarlberg!)
- † **A. glauca Bess.**
 Hbu: Auf trockenen Wiesen um Lindau (Dobel).
- A. odorata L.** Wälder. v³z⁴
 Hbu und Hbo z. B. Leiblachauen, Sigmarszell, bei Villa Lotzbeck in Aschach an der Straßenseite, Dunkelbuch, zwischen Oberreitnau und Doberatsweiler, im Rohrach, bei Stockenweiler, Kapfholz (H.), Oberberg (H.), Trogenerwald (H.) u. s. w.
- † // **A. cynanchica L.**
 In Hbu: Am Seeufer (Dobel).

Galium L.

- G. Cruciatum Scop.** Auen, Wiesen. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- G. vernum Scop.**
 Wahrscheinlich Hbo: Rothachauen bei Weiler (H.); wird noch untersucht! (Konnte 1901 nicht untersucht werden, weil Standort durch Überschwemmung fast zerstört. H.)
- G. tricornum With.**
 sp in Hbo: Auf einem Schuttplatze oberhalb Lindenberg. z²
- G. Aparine L.** Gebüsch, Hecken. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- ! **G. spurium L.**
 Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- G. uliginosum L.** Gräben, Sümpfe. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet (auch Weiler häufig, H.).

- G. palustre L.** Gräben, Moore. v⁴z³
 Hbu und Hbo (auch um Weiler, H.) verbreitet.
- „ „ var. **elongatum Presl.** Hbu: Im Weidengebüsch an den Seemauern zwischen Rangierbahnhof und Eichenplantage. z³
- G. boreale L.** Sumpfwiesen. v³z⁴
 Hbu: Heuried am Wasserburger Bühel, um Enzisweiler, Kloster-
 teiche.
 Hbo: Thumen, Humertsweiler, Schlachters, Zeisertsweiler, Riggats-
 hofen.
- G. rotundifolia L.** Schattige Wälder. v⁴z³
 Hbu: Schönbühel.
 Hbo: Verbreitet; um Weiler häufig (H.).
- G. verum L.** Wiesen, Auen. v⁴z³
 Hbu: Verbreitet, ebenso im unteren Hbo; um Weiler einzeln:
 Weg bei Manzen, Bahndamm Auers—Rötenbach u. s. w. (H.).
- G. Wirtgeni F. Schultz.**
 Hbu: Am Rangierbahnhof auf einem Grasplatz mit *Primula officin.*
 ca. 60 Exempl.! Blüht anfangs Juni!
- G. ochroleucum Wulf.**
- G. mollugo L.** Wiesen, Gebüsch. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- G. silvaticum L.** Waldabhänge. v⁴z³
 Hbu z. B. Rickenbacher Tobel, Hangnach.
 Hbo: Verbreitet bis zum obersten Rohrachtobel, um Weiler jedoch
 nicht beobachtet (H.).
- G. silvestre Poll.** Wiesen. v²z²
 Hbu: Seeufer bei Alwind.
 Hbo: Waldränder oberhalb Biesenberg, im Rohrachtobel bei Böser-
 scheidegg, bei Mapprechts; um Weiler nicht (H.).
- „ „ var. **alpestre aut.** Im ö. Gr. Kiesbett der Bregenzer Ache.

51. Fam. Valerianaceae DC.

Valeriana Tourn.

- V. officinalis L.** Feuchte Plätze. v⁴z²
 Hbu und Hbo verbreitet.
- „ „ var. **exaltata Mik.** In Hbu am Seeufer bei Villa Amsee.
- V. dioica L.** Feuchte Wiesen. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- V. saxatilis L.**
 In Hbo auf Nagelfluh im Eistobel bei Riedholz an unzugänglicher
 Stelle. z¹
- V. montana L.**
 Hbo: Buchenwald am Iberg bei 900 m. z² ∞ ö. Gr. am Pfän-
 der (Milz). w. Gr. Adelegg auf Nagelfluh bei ca. 1000 m (Schüble).

Valerianella Tourn.

- V. olitoria Moench.** Äcker, Brachen. v⁴z³
 Hbu verbreitet, z. B. Hochsträfs, Hoyern, Enzisweiler, Rangierbahnhof.
 Hbo: Im unteren Teil, z. B. Hegnau; fehlt um Weiler (H.).
 („Sonnenwirbele“.)
- V. carinata Lois.** Weinberge, Wegränder. v²z²
 Hbu: Enzisweiler, Hoyerberg, Nonnenhorn, Hoyern, Rangierbahn-
 hof Lindau.

- V. dentata** Poll. Äcker. v³z²
 Hbu: Streuwiesen bei Enzisweiler, Felder um Hege.
 Hbo: Riggatshofen, Egghalten, Stockenweiler, Unterainzenbruck,
 Mariathann.
- V. rimosa** Bart. Äcker. v²z²
 Hbo: Riggatshofen, Wildberg, Mapprechts bei Heimenkirch.

52. Fam. **Dipsaceae** Tourn.

Dipsacus Tourn.

- D. silvester** Huds. Wege, Schutt. v²z²
 Hbu: Am ganzen Bodenseeufer.
 Hbo: Argenthal bei Handwerks, Rothachauen z¹; um Weiler nicht
 gefunden (H.).
- D. pilosus** L.
 Hbu: Am Bodenseeufer beim Seewirt in Nonnenhorn z² (Ruefs,
 Sch., B., A., Dollhopf).

Knautia L.

- Kn. arvensis** Coult. Wiesen, Äcker. v⁴z³
 In der var. *pinnatifida* Hbu und Hbo verbreitet.
- Kn. silvatica** Dub. Wälder. v⁴z⁴
 In der var. *latifolia* Woerlein in Hbu und Hbo verbreitet.

Succisa M. et K.

- S. pratensis** Mch. Wiesen, Moore. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- " " f. *flor. alb.* Hbo: Dornach bei Niederstaußen, Mollenberg, Unter-
 reitnau, am Nadenberg bei Lez.

Scabiosa L.

- Sc. columbaria** L. Eisenbahndämme, Abhänge. v³z³
 Hbu: Abhang an der Lerche in Äschach; Bahndämme in Äschach,
 Reutin, Hoyern, Bodenseeufer.
 Hbo: Bahndämme Schönau—Oberreitnau—Schlacters; scheint um
 Weiler zu fehlen (H.), jedoch bei Schalkenried (Gmde. Böser-
 scheidegg). z²
- † **Sc. suaveolens** Desf. Trockene Wiesen.
 Hbu: Nach Dobel bei Lindau (Sendtner).

53. Fam. **Compositae** Adans.

Eupatorium Tourn.

- E. cannabinum** L. Auen, Waldschläge. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.

Adenostyles Cass.

- A. albifrons** Rehb. Hochwälder. v¹z²
 Hbo: Hochwald bei Eberschwand (Gmde. Scheidegg); im w. Gr.:
 am bewaldeten nordwestl. Abhang des schwarzen Grates in einer
 feuchten Schlucht (Herter), auf der Adelegg (Schüble).
- A. alpina** Bl. et Ping. Wälder. v²z²
 Hbo: auf Moränenhügeln bei Waltersberg, zwischen Diepolzberg
 und Oberrengersweiler, zwischen Wildberg und Bahnhof Schlacters,

im Rohrachtobel bei Emsgritt; im w. Gr. Adelegg bei 1000 m [Dr. Nick ¹⁾].

Homogyne Cass.

- H. alpina Cass.** Hochwälder. v²z³
Hbo: Am Daxenberg oberhalb Oberstein bei ca. 1000 m, Krähenberg bei Lachershof z² (H.), Wald zwischen Burkartshofen und Kremmlerbad z³ (A., H.), bei Mittelhofen; im w. Gr. auf der Adelegg bei 1100 m (Dr. Nick).

Tussilago Tourm.

- T. Farfara L.** Auen, Wege, Ufer. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.

Petasites Tourm.

- P. officinalis Mnch.** Ufer, feuchte Plätze. v³z⁴

Hbu: Auf Kies der Leiblachmündung.
Hbo: Abhang gegen die Ach bei Station Oberreitnau (B.), an der Leiblach zwischen Hergaz und Stockenweiler, im Tobel zwischen Opfenbach und Litzis, im Rohrachtobel, Haus bei Scheidegg, bei Auers (H.), Rothachauen bei der großen Fabrik.

- " " var. **hybrida L.** Hbo: Rohrachtobel.

- P. albus Gaertn.** Wälder, Schluchten. v³z³

Hbu: Wälder oberhalb Mozach und am Schönbühel mehrfach (Sch.).
Hbo: Am Kirchweg von Höhenreutin nach Oberreitnau (Dobel), Wälder zwischen Waltersberg und Altrehlings, Leiblachabhänge oberhalb Hubers, im Dunkelbuch, Wald zwischen Biesings und Altis, bei Schlachters, Schloß Syrgenstein, Rohrach und Nebenschluchten z⁴, zwischen Litzis und Opfenbach, zwischen Schreckenmanklitz und Weiler, Eistobel bei Riedholz, am Kienberg, Durrachauen bei Mapprechts, bei Hasenried (H.), Wald oberhalb Rothach (H.), Wald bei Stockenbühl (H.), Trogenerwald (H.) etc.

- P. niveus Baumg.**
Im ö. Gr. Kies der Bregenzerach z⁴ ! jedenfalls auch Weifsachkies.

Aster L.

- A. salicifolius Scholler.** Sumpfwiesen. v¹z⁵

Hbu: Sumpfwiese zwischen Äschach und Schachen (typisch), am Rangierbahnhof.

- A. leucanthemus Desf.**
sp. in Hbu an einem Gartenzaun in Äschach beim Colosseum.

- A. parviflorus Nees.** Ufer, Zäune. v²z³

Hbu: Bodenseeufer von der Leiblachmündung bis Villa Leuchtenberg z⁴ (in 2 Formen: α) mit doldigrispigem Blütenstand z³, β) ährenförmig gedrängter Blütenstand z²), im Hochbuch, bei Lindenhof und Reutin an Gartenzäunen.

- A. novi Belgii L.**
Hbo: Argengebüsche bei Gestraz. z³

- A. abbreviatus Nees.** Gebüsch, Ufer. v³z³

Hbu: Seeufer bei Unterhochsteg, Leiblachauen bei Unterhochsteg (auf österr. Seite), im Tobel hinter dem Schützenhaus am Schönbühel.
Hbo: Bahndamm bei Station Schlachters, Rottachauen bei Siebersbad und Landstraße in Siebers (hier abweichende, höhere Form).

1) Dr. Nick, prakt. Arzt in Isny, um 1830.

A. brumalis Nees. Feuchte Wiesen.

Hbu: Streuwiesen am Rangierbahnhof z⁴; ebenda Übergänge zu A. salicifolius Scholler. (A. brumalis Nees × salicifol. Sch. ?)
(Zu A. brumalis scheinen meist zu gehören nicht untersuchte Asterarten: Hbu am Klosterteich, Hbo zwischen Schönau und Hoyern, Streuwiesen bei Bruggach, bei Eggenwath, bei Mywiler.)

A. spectabilis Ait.

Hbo: Am Bahndamm bei Station Schlachters. v¹z³

Bellidiastrum Cass.

B. Michellii Cass. Uferabhänge.

Hbu: Hangnach bei der Wirtschaft von Leithe. z¹
Hbo: Schlucht an der StraÙe zwischen Ruhlands und Umgangs, Rohrach, Eistobel, Ellhofer Tobel, zwischen Litzis und Opfenbach, Hochglend, Iberg, Ruine Ellhofen, zwischen Weiher und Hammermühle, Hausbachanlagen (H.), Weg nach Oberreutte (H.) etc., um Weiler häufig (H.) v⁴z³

Stenactis Cass.

St. annua L. Bahndämme, Auen.

Hbu: Rangierbahnhof, Bahndamm Äschach—Holdereggen—Hoyern. v²z³
Hbo: Bahndamm Schönau—Oberreitnau—Schlachters, Bahndamm Auers—Rötenbach (H.), Rothachauen (H.).

Bellis Tourn.

B. perennis Nees. Wiesen.

Hbu und Hbo gemein. v⁵z⁴

Solidago L.

S. Virga aurea L. Wälder, Abhänge.

Hbu und Hbo verbreitet. v⁴z³

S. canadensis L. Gebüsch, Sumpfwiesen.

Hbu: Bodenseeufer bei Ziegelhaus, Leiblachauen von der Mündung bis Hbo Sigmarszell. v³z³

Hbo: zwischen Bruggach und Unterreitnau, Bahndamm zwischen Schönau und Oberreitnau, Stat. Schlachters, in Ratzenberg zwischen Scheidegg und Böersscheidegg, zwischen Wohmbrechts und Hergaz, Kiesplätze bei Station Rötenbach, Bahndamm Auers—Rötenbach (H.), bei Scheffau (H.).

S. lanceolata Ait.

Hbu im Heuried. v¹z²

Erigeron L.

Er. canadensis L. Waldränder, Bahndämme.

Hbu und Hbo verbreitet. v⁵z⁴

Er. acer L. Auen, Mauern, Bahndämme.

Hbu häufig, z. B. Mauern um Lindau und Äschach. v⁴z³
Hbo: im oberen Theil seltener: Schwarzensee, im Röthenbacher Filz, Kiesplätze bei Stat. Röthenbach, Burg Hoheneck, um Weiler nur stellenweise, gegen Oberstauen häufiger (H.).

Buphthalmum L.

B. salicifolium L. Trockene Wiesen.

Hbu: Waldrand bei Unterhochsteg. z²
Hbo: Am Bahnabhang zwischen Schönau und Oberreitnau bei Stat. Schlachters, Bahndamm zwischen Hergaz und Unterninzenbruck. v²z²

Inula L.

f. salicina L. Sumpfwiesen. v⁴z⁸
Hbu: Heuried, Klosterteiche, Wasserburger Bühel, Rotmoos u. s. w.
Hbo: Rohrachtobel, Sumpfwiese bei Auers, bei Scheidegg und am
Wege Weiler—Manzen (H.), im unteren Teile verbreitet.

l. Conyza DC. Abhänge. v²z²
Hbu: Mauern bei Lindau (Dobel).
Hbo: Rohrachabhänge bei Emsgritt, am Laubenberg oberhalb Har-
batzhofen auf Molassesandstein, Argenthal bei Untersteig.

Pulicaria Gärtn.

P. dysenterica Gärtn. Feuchte Wiesen. v⁴z⁸
Hbu verbreitet auf allen Streuwiesen.
Hbo: im unteren Teil häufig; im oberen Teil: Rohrachtobel, Neu-
haus, Manzen (H.), um Weiler nicht selten (H.).

Xanthium Tourn.

X. strumarium L.
Im ö. Gr. Mehrerau (Mz.).

Galinsogaea R. et Pav.

G. parviflora Cav.
Im ö. Gr. Bregenz in einem Garten (Milz).

Bidens Tourn.

B. tripartitus L. Pfützen, Gräben. v⁴z⁸
Hbu und Hbo verbreitet, jedoch um Weiler selten: Acker am
Wege nach Oberreutte (H.).

B. cernuus L. Moore, Pfützen. v⁸z⁸
Hbu nicht beobachtet; nach Dobel am Seegelände.
Hbo, als form. radiata Koch: Lindenberger Teich, Wolfertshofen bei
Heimenkirch, Mekatz, Happareutte, Rupolz, Feuerteich in Möllen,
Moor bei Biehl (Gmde. Scheffau), häufig im Moor bei Stockerbühl
und Moor bei Oberreutte (H.), Trogener Moor (H.).

Helianthus L.

H. annuus L.
H. tuberosus L.
In Hbo: Oberreitnau.

H. multiflorus L.
In Hbo: Wiesen bei Dornach (Sch.). 1899.

Rudbeckia L.

R. laciniata L. Wiesen, Wege, Zäune. v²z⁸
Hbu: Streuwiesen bei Ziegelhaus (Kellermann, B., A.).
Hbo: An einem Zaun neben dem Wirtshaus in Biesings, an der
Strafe in Stockenweiler und in Unterninzenbruck.

R. hirta L.
Hbo: Weidengebüsch an der Weifsach bei Oberstauen 700 m
(Holler).

Filago Tourn.

F. arvensis Fr.
Im ö. Gr. „bei Bregenz gemein“ (Sauter).

h
c
sp

†?

Gnaphalium Tourn.

- Gn. silvaticum L.** Waldschläge. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- Gn. uliginosum L.** Äcker, Moore. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- Gn. dioicum L.** Heidewiesen. v³z³
 Hbo: Degermoos, Abhang bei der Reuttemühle (Gmde. Wohmbrechts), im Rohrach, bei Gschwend (Gmde. Scheidegg), Bramatsreitte, Biesen-
 berg, Iberg bei Riedholz, Gerbertobel (H.), hohe Kugel (H.), Wald-
 rand bei Schreckenmanklitz (H.), auch sonst um Weiler (H.).
- Gn. luteo-album L.**
 Im ö. Gr. bei Bregenz (Sauter nach Dobel).

Artemisia L.

- A. Absinthium L.** Mauern, Schutt. v²z²
 Nur sp Hbo: Station Harbatzhofen, an einem Haus in Scheffau,
 an einem Haus in Oberried (Gmde. Ebratzhofen), am Bahndamm
 in Hergaz.
- A. vulgaris L.** Schutt, Bahndämme. v²z²
 Nur sp Hbu: Am Rangierbahnhof (Kellermann, A.), am Bahnhof-
 rayon Lindau, an einem Gartenzaun am Schönbüchel.
 Hbo: Bei der Station Harbatzhofen.

Achillea L.

- A. Ptarmica L.** Wiesen. v³z³
 Hbu: Lindau (Dobel), Streuwiesen am Ziegelhaus, bei Villa Ehrlich.
 Hbo: Streuwiesen bei Schönau, Waldrand zwischen Riegoldsberg
 und Oberreitnau, Station Schlachters, Mothen und Zwieseler bei
 Heimenkirch, Litzis bei Opfenbach.
- A. millefolium L.** Wiesen, Wege. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.

Anthemis L.

- A. tinctoria L.**
 Nur sp Hbo: Eisenbahndamm bei Station Röthenbach (H.).
 Im w. Gr. Moorgründe an der Bahn bei Kislegg (Herter).
- A. arvensis L.** Äcker, Wege etc. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- †? **A. Cotula L.**
 Hbu: Äcker bei Lindau (Dobel); konnte nicht gefunden werden.
 Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Matricaria L.

- h u. sp **M. Chamomilla L.** Schutt, Dörfer. v²z³
 Hbu: Bahndamm Aschach, an Häusern im Wasserburger Büchel.
 Hbo: An Häusern in Bodolz, an Häusern in Oberstein und in
 Weiher, am Bahnhof Harbatzhofen, auf einem Feld bei Geislehn z¹,
 am Bahndamm bei Heimenkirch, in Ratzenberg, am Halteplatz
 Biesenberg.
- M. discoidea DC.** Bahndämme. v²z³
 Hbu: Bahnhofrayon Lindau, Rangierbahnhof, Bahndämme in Aschach.
 Hbo: am Bahnhof Hergensweiler, Schlachters und Röthenbach.
- M. inodora L.** Wegränder, Bahndämme. v²z²
 Hbu: Lindau (Dobel), am Bahnhof Lindau bei den Lagerhäusern.
 Hbo: Bahndamm Auers—Rötenbach (H.).

Tanacetum Tourn.

- T. vulgare L.** Wegränder. v²z²
Hbu: Im Bahnhofsgraben Lindau.
Hbo: Zwischen Ellhofen und Simmerberg (A., H.), bei Oberreutte (H.).
- T. Balsamita L.**
- T. corymbosum Schultz. bipont.**
Im ö. Gr. Bregenz (Döll bei Höfle) †?
- T. Parthenium Schultz bipont.** v²z²
Hbu: Heidenmauer in Lindau.
Hbo: Ehemals alte Mauer bei Brög in Schlachters (1900 abgebrochen), an der Station Röttenbach, an der Station Harbatzhofen.
- T. atratum Schultz. bipont.**
Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache. z²

Leucanthemum Tourn.

- L. vulgare Lam.** Wiesen. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.

Arnica Rupp.

- A. montana L.** Trockene Waldwiesen. v²z²
Hbo: Gschwend bei Scheidegg, Ostkienberg und Bramatsrette bei Scheidegg, am Nadenberg, zwischen Buchenbühl und Forst, zwischen Weiher und Ellgassen, beim Gerbertobel (H.), Waldrand bei Dressen (H.), Waldrand bei Schreckenmanklitz (H.).

Senecio Tourn.

- S. vulgaris L.** Schutt, Gärten, Wege. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.
- S. viscosus L.** Bahndämme, Wegränder. v²z²
Hbu: Bei Lindau (Dobel), am Bahnhof Nonnenhorn, am Rangierbahnhof.
Hbo: Halteplatz Wohmbrechts, an der Landstrasse zwischen Schüttenobel und Ebratzhofen; fehlt Weiler (H.).
- S. silvaticus L.** Waldschläge. v³z³
Hbo: Zwischen Taubenberg und Hegnau, Leiblachabhänge bei Wigrazbad, Waldblöße bei Halteplatz Opfenbach, Sandhügel zwischen Sigmanns und Schwarzenberg, Mekatz, Wald oberhalb Ellgassen, Hausbachanlagen bei Weiler (H.), Waldschlag bei Mönchenstein (H.), um Weiler selten (H.).
- S. rupestris W. et K.** v³z³
Im ö. Gr. Bäuerle bei Bregenz (Glanz).
- S. erucifolius L.** Abhänge, Flusssauen.
Hbu: Heuried bei Rickenbach, zwischen Unter- und Oberhochsteg.
Hbo: Rohrach bei Kienberg, Laubenberg, Bahndamm bei Mariathann, Argenthal bei Untersteig, Kiesplätze bei Station Röttenbach, um Weiler und Scheffau verbreitet.
- ” ” var. **tenuifolius Jacq.** Hbo: Argenthal bei Untersteig.
- S. Jacobaea L.** Rainen, Triften, Heiden. v⁴z³
Fehlt Hbu; im unteren Teil von Hbo bei Zeisertsweiler und Bösenreutin, im oberen Teil auf Viehweiden gemein bis zum Gipfel der hohen Kugel (1069 m).
- S. aquaticus Huds.** Feuchte Wiesen. v⁴z³
Hbu gemein, z. B. bei Wasserburg (Dobel), im Heuried, Klostersteiche etc.; ebenso unterer Teil von Hbo, z. B. bei Oberreitnau

(Dobel), Waldteich bei Station Schlachters; sonst seltener: an der Strafe bei Börserscheidegg, bei Simmerberg (H.), um Weiler selten (H.), häufiger bei Niederstaufer (H.).

- S. cordatus** \times **Jacobaea** = **Reisachii Gremblich** = **lyratifolius** aut. Weiden, Triften. v^3z^2
 Hbo: Verbreitet unter den Stammeltern, z. B. am Iberg, Hohe Kugel, am Laubenberg, bei Harbatzhofen, bei Scheidegg, bei Bramatsrette, Westkienberg, Baalshofen etc.; um Weiler verbreitet (H.).
- S. cordatus Koch.** Triften, Bachufer. v^3z^3
 Hbu: Leiblachufer in der Hangnack bei Strodel. z^1
 Hbo: Opfenbach, Argenthal bei Handwerks, von hier aufwärts überall verbreitet.
- S. nemorensis L.** Waldschläge. v^1z^2
 Hbo: Waldschlag bei Mönchenstein z^2 (H., determin. Prof. Weifs!).
- S. Fuchsii Gmel.** Wälder. v^3z^3
 Hbo: Wald zwischen Höhenreutin und Oberreitnau, Holzschläge bei Oberholz, beim Gerbertobel (H.), Wald zwischen Auers und Station Röttenbach (H.), zwischen Röttenbach und Dreiheligen, bei Manzen, Eistobel bei Riedholz, Halteplatz Opfenbach, Hochglend bei Gestraz, Iberg bei Riedholz.
- S. paludosus L.** Schilfsümpfe. v^2z^4
 Hbu: Am ganzen Bodenseeufer, z. B. zwischen Lindau und Brengenz (Sauter), Ziegelhaus bei Lindau (Dobel), Untiefe des Bodensees bei Wasserburg (Britzelmayer), beim Rangierbahnhof, Sumpfwiesen an den Klosterteichen (A., Sch.), in Heuried mehrfach, am Bettbauer Weiher und am Wasserburger Bühel.

Calendula L.

h u. sp. **C. officinalis L.** Hie und da aus Friedhöfen verwildert.

Echinops L.

- E. sphaerocephalus L.** v^1z^2
 Hbu: An einem Weinberg bei Dr. Epple in Witten (Hook).

Cirsium Tourn.

- C. lanceolatum Scop.** Wege, Triften. v^4z^3
 Hbu: Bahndamm Enzisweiler, Bahndämme in Aschach.
 Hbo: Bei Station Schlachters, Hergaz, Bahndämme bis Hergaz, bei Lindenberg, Opfenbach u. s. w., um Weiler häufig (H.).
- C. palustre Scop.** Nasse Wiesen. v^5z^4
f. flor. alb. Hbo: Abhang in Sigmarzell, bei Oberningenbruck, Haus bei Scheidegg.
- C. rivulare Lk.** Feuchte Wiesen. v^4z^4
 Im Juni und Juli meist Exemplare mit beblättertem Schafte; August und September blühen Formen mit blattlosem Stengel.
 Hbu und Hbo verbreitet.
- C. oleraceum Scop.** Feuchte Wiesen. v^5z^4
 Hbu und Hbo gemein.
- C. arvense Scop.** Auen, Felder, Wiesen. v^4z^4
 Hbu und Hbo verbreitet.
- ” ” var. **setosum M. B.** Hbo: am sumpfigen Rande eines Gebüsches zwischen Wigras und Station Hergaz. z^1
- C. palustre** \times **oleraceum (C. lacteum Koch).** v^2z^2
 Hbo: Auf einer Wiese zwischen Adelholz und Niederstaufer, Häuslings (Gmde. Scheidegg).

C. oleraceum × **rivulare** (**C. praemorsum** Koch).

Hbo: Am Schwarzensee.

C. oleraceum × **palustre** (**C. hybridum** Koch).

v³z²

Hbo: An der StraÙe im Rohrach bei Kienberg, am Schwarzensee, zwischen Hergaz und Wohlbrechts, Geigersthal bei Heimenkirch, Riedholz bei Mayerhöfen; um Weiler nicht selten, z. B. Hagelstein, Laimtobel, Oberscheiben u. s. w.

C. rivulare × **palustre**.

Hbo: Moorwiesen bei Hergensweiler, Abhänge oberhalb Hubers, Moor bei Isenbretzhofen.

C. rivulare × **oleraceum** (= **erucagineum** DC.)

Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).

C. palustre × **rivulare** (= **subalpinum** Gaud.).

Hbo: Streuwiesen bei Lattenweiler und Hummertsweiler. Im ö. Gr.: Bregenz (Naegeli bei Koch).

Silybum Gärtn.

S. Marianum Gärtn.

Carduus Tourn.

[**C. acanthoides** L. fehlt um Lindau (Sendtner).]

C. crispus L. Wiesen.

v²z²

Hbo: Auf einer Wiese in Grünenbach v¹z²; Ellhofer Tobel z²; Wiese nächst dem Bahnhof Weiler (H.).

C. Personata Jacq. Wiesen.

Hbu: Im w. Gr. Argenauen nahe der Mündung (Fronmiller).

Hbo: Leiblachabhänge bei Hubers, zwischen Scheidegg und Kienberg, oberhalb Scheidegg.

C. defloratus L. Felsige Abhänge.

v²z²

Hbu: Bodenseeufer (Dobel).

Hbo auf Nagelfluhe: Rohrachtobel, Gerbertobel (H.), Schüttentobel bei Ebratzhofen.

C. nutans L. Wege, Triften.

v²z²

Hbo: An der Bahn bei Untereinzenbruck, Kiesplatz am Schwarzensee, Bahn zwischen Röthenbach und Harbatzhofen.

Lappa Tourn.

L. officinalis All. Wege, Mauern.

v²z²

Nur c und sp an Häusern in Hbo: Weiler, Siebers, Malaichen a. d. Argen; im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter).

L. minor DC. Schutt.

v³z³

Hbu: Bahnhofrayon Lindau; an Wegen in Schachen (B.), hinter der Milchfabrik Rickenbach.

Hbo: Am Bahnhof Oberreitnau, bei Greuth, bei Wolfgangsberg, bei Itzlings, Ellhofen, Halteplatz Opfenbach, am Laubenberg.

L. tomentosa Lmk.

Hbo: Im Rohrachtobel z²; ö. Gr. Reuthe oberhalb Bregenz (Milz).

L. nemorosa Koern.

Im w. Gr. Rohrdorf bei Wangen z¹ (Herter).

Carlina Tourn.

C. acaulis L. Triften.

v⁴z³

Hbu sehr selten: Heuried zwischen Unter- und Oberhochsteg; im oberen Teile von Hbo verbreitet, jedoch meist f. **caulescens** Lmk. Die Stammform einzeln bei Ruppenmanklitz, zwischen Siebers und Scheffau.

- C. acaulis f. duobus capitib.:** Scheidegg.
C. vulgaris L. Triften, Abhänge.
 Hbu und Hbo verbreitet.

v⁴z³

Serratula L.

- S. tinctoria L.** Wiesen, Waldschläge.
 Hbu: Um Lindau (Dobel), Heuried, Kloserteiche, am Wasserburger
 Bühel, Nonnenhorn, zwischen Hege und Hegnau, beim Bettner
 Weiher, Rotmoos (Sch.).
 Hbo: bei Lattenweiler, Oberreitnau, Riggatshofen.
 (alles f. *pinnatifida*.)

v³z³

Centaurea L.

- C. Jacea L.** Wiesen, Moore.
 Hbu und Hbo gemein.
 " " var. **pratensis Thuill.:** Hbu im Heuried.
C. Pseudophrygia C. A. Meyer. Wiesen.
 Hbo: Um Weiler (H.), Ellhofen, Harbatzhofen, Stiefenhofen, Mayer-
 höfen und Oberreutte verbreitet.
C. montana L. Nagelfuhfelsen.
 Waldschluchten in Hbo: Rohrachtobel, Gerbertobel (H.), Haus-
 bachtobel (H.), Tobel am Mönchenstein (H.), Argenabhänge bei
 Gestraz, Eistobel, Laimtobel bei Buchenbühl, Tobel bei Ablers.
C. Scabiosa L. Bahndämme, Wiesen.
 Hbu: Rangierbahnhof, Bahndämme bis Hbo: Oberreitnau—Hergaz;
 sonst Hbo: Kiesplatz am Schwarzensee, Burg Ellhofen (H.), Bahn-
 damm Röthenbach—Harbatzhofen, zwischen Hergaz und Wohm-
 brechts.
C. Cyanus L. Felder.
 Hbu: Am Rangierbahnhof, auf einer Mauer in Schachen, Bahnhof
 Enzisweiler.
 Hbo: Eggalden, Stockenweiler, Hummertsweiler, bei Wolferts-
 hofen (Gmde. Heimenkirch); um Weiler sehr selten, so Schutt am
 Waldweg Auers—Rötenbach (H.).

v⁵z⁵

z²

v³z³

v³z³

v³z³

v³z³

Lampsana Tourn.

- L. communis L.** Gebüsch etc.
 Hbu und Hbo gemein.

v⁵z⁴

Cichorium Tourn.

- C. Intybus L.** Triften, Wege.
 Hbu und unterer Teil von Hbo gemein; um Weiler selten, nur
 bei Manklitz und Siebers (H.).

v⁴z⁴

Leontodon L.

- L. autumnalis L.** Wiesen, Wege.
 Hbu und Hbo gemein.
 " " var. **pratensis Rchb.** Hbo: Ellgassen. z¹ ∞
L. hastilis L. Überall.
 " " var. **hispidus L.** v⁵z⁵. Hbu und Hbo.
 " " var. **glabratus Koch = danubialis Jacq.** v³z³. Hbu: Exerzierplatz
 bei Unterhochsteg; Hbo: Mollenberg, Ellgassen, Ratzenbergermoos,
 zwischen Harbatzhofen und Holzleute.

v⁵z⁴

v⁴z⁵

Picris L.

- P. hieracioides L.** Wiesen. v^4z^4
Hbu gemein, Hbo verbreitet bis Halteplatz Opfenbach; um Weiler, Röthenbach, Ellhofen, Simmerberg, Oberreutte nicht gefunden (H.); jedoch bei Scheidegg am Wege zum Elektrizitätswerk z^4 (H.), im Ratzenbergermoos z^3 (H.), auf einer Wiese bei Hergaz z^5 (Weinhart).

Tragopogon Tourn.

- Tr. pratensis L.**
" " var. **orientalis L.** Wiesen. v^6z^4 . Hbu und Hbo verbreitet.

Scorzonera Tourn.

- Sc. humilis L.** Sumpfwiesen. v^3z^3
Hbu: Heuried bei Rickenbach.
Hbo: Sumpfwiesen zwischen Oberreitnau und Doberatsweiler (B., A.), Sumpfwiesen bei Lattenweiler, Sumpfwiese bei Stockerbühl (H.).
- h u. sp **Sc. hispanica L.**
In Hbu sp auf Schutt beim Bahnhof Lindau (B.).

Hypochoeris L.

- H. radicata L.** Wiesen, Triften. v^5z^4
Hbu und Hbo verbreitet.

Taraxacum Juss.

- T. officinale Web.** Überall. v^5z^5
Hbu und Hbo gemein.
" " var. **palustre DC.** Sumpfwiesen. v^3z^4 . Hbu: Bodenseeufer bei Ziegelhaus an der Leiblachmündung; Hbo: bei Station Schlachters, bei Wigrazbad im Rohrach.

Willemetia Necker.

- W. apargioides Cass.** Nasse Wiesen. v^2z^3
Hbo: In Weihers, im Ratzenberger Moos, Wiesen zwischen Weiler und Auers (H.), um Hergensweiler (Dobel); im ö. Gr. Hacken bei Bregenz (Sauter); im w. Gr. Waldwiese bei Eglofs (Herter).

Chondrilla Tourn.

- †? **Ch. prenanthoides Vill.**
Im ö. Gr. Achgries bei Bregenz (Sauter).

Prenanthes L.

- Pr. purpurea L.** Wälder, Abhänge. v^4z^3
Hbu und Hbo verbreitet.

Lactuca Tourn.

- L. Scariola L.**
sp in Hbu auf Schutt im Bahnhofrayon Lindau.
- L. muralis Less.** Schutt, Mauern. v^5z^3
Hbu und Hbo verbreitet.

Mulgedium Cass.

- M. alpinum Cass.**
Hbo: Oberberg bei Weiler ca. 900 m, 8 Exemplare (H., 1901).

Sonchus Tourn.

- S. oleraceus L.** Überall. v^5z^4
Hbu und Hbo verbreitet.

- S. asper Vill.** Überall. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- S. arvensis L.** Acker. v³z³
Hbu: Kartoffelfelder bei Unterhochsteg.
Hbo: Station Schlachters, Litzis, Weiher, Ratzenberg, Engenberg, Scheffau, Auers (H.), Weiler (H.).

Crepis L.

- Cr. taraxacifolia Thuill.** Wiesen. v³z³
Hbu verbreitet, z. B. Nonnenhorn, Rangierbahnhof, Ziegelhaus.
Hbo selten: Rohrachobel, zwischen Schinau und Harbatzhofen; scheint um Weiler zu fehlen (H.); im w. Gr. Ackerränder bei Eisenharz (Herter).
- Cr. biennis L.** Überall. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- Cr. tectorum L.** Bahndämme, Wege. v²z³
Nur Hbu: Bahndämme Lindau—Nonnenhorn, um Enzisweiler, Reutin.
- Cr. virens Vill.** Überall. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- Cr. paludosa Mnch.** Feuchte Wiesen, Wälder. v⁴z⁴
Hbu z. B. Heuried, Wasserburger Bühel.
Hbo z. B. Eggenwath, Zeisertsweiler, Hattnau, Weiher, Stockenbühl (H.), Hausbachanlagen (H.), Eistobel und Iberg bei Riedholz (H.).
- Cr. succisifolia Tausch.**
Wiesen im w. Gr.: zwischen Siggen und Eisenharz, Weg von Eisenbach zum schwarzen Grat (Herter).

Hieracium Tourn.

- H. pilosella L.** Wiesen, Abhänge. v⁵z⁵
Hbu und Hbo verbreitet.
- „ „ var. **furcata**: Hbo Moor bei Mywiler. z¹
- H. auricula L.** Wiesen, Wälder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- H. pilosella** × **auricula** = **auriculiforme Fries.** v²z¹
Hbo: Zwischen Mellatz und Halteplatz Opfenbach, Heide bei Mothenmühle unweit Mekatz.
- H. praealtum Vill.** Heiden, Bahndämme, Moore. v³z³
Hbu und Hbo: Bahndämme bis Hergaz; Hbu: Hege, am Rangierbahnhof; Hbo: Degermoos, Moore um Volkings, Ratzenbergermoos, Kiesplätze bei Oberhäuser; im Rohrach.
- „ „ var. **Bauhini Bess.** = **magyaricum P. et N.** z¹
Hbo: Damm neben der Strasse Hergaz—Schwarzensee.
- H. piloselloides Villars.**
Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache (Sauter nach Dobel).
- H. praealtum** × **auricula** = **sulphureum Doell.**
Hbo: Am Bahndamm zwischen Hergensweiler und Stockenweiler.
- H. pratense Tausch.** Wiesen. v³z³
Hbu: Wasserburger Bühel, Geleise beim Rangierbahnhof.
Hbo: Bahndamm bei Station Schlachters, zwischen Hergensweiler und Stockenweiler, zwischen Wildberg und Rotkreuz, im Ratzenberger Moos, um Scheidegg, um Weiler an einigen Stellen (H.), Bahndamm bei Station Röthenbach etc.

- H. pratense** Tausch \times **praealtum** Vill = **arvicola** N. et P.
Hbo: Strafe zwischen Oberhäuser und Ellhofen.
- H. cymosum** L. Abhänge.
Hbo: Im Rohrach bei Emsgritt. z^2
- H. murorum** L. Auen, Wälder, Abhänge. v^5z^4
Hbu und Hbo verbreitet.
- H. vulgatum** Fries = **silvaticum** Smith. Mauern, Wälder. v^3z^5
Hbu: Mauern in Lindau, Seedämme in Äschach, Bahndamm in Holdereggen.
Hbo: In Wäldern, z. B. zwischen Weiher und Ellgassen.
- ” ” β **alpestre** Uechtritz: Hbu am Bahndamm in Holdereggen. z^2
- ” ” var. **ramosum** W. et K. Kommt wahrscheinlich bei Weiler vor (H.);
wird noch untersucht! Im Ratzenberger Moos (A.).
- H. tridentatum** Fries. Wälder. v^3z^3
Hbo: Am Diepolzberg, bei Oberrengrersweiler, bei Station Schlachters; Iberg bei Riedholz; um Weiler verbreitet (H.), z. B. Wald beim Mönchenstein, Waldrand Auers—Röthenbach.
- H. silvestre** Tausch = **boreale** Fr. Waldschläge. v^2z^3
Hbo: Waldschlag zwischen Taubenberg und Hegnau im Ratzenbergermoos; häufig im Rohrach (H.), einzeln um Weiler und im Gerbertobel (H.).
- H. umbellatum** L. Wälder, Sumpfwiesen. v^5z^4
Hbu und Hbo gemein.
- ” ” var. **linariifolium** G. Meyer. Unter der Stammform in Streuwiesen,
z. B. Hbo: Oberreitnau.
- H. staticifolium** Vill. Kiesboden. v^1z^2
Hbu: Am Rangierbahnhof Lindau.
- H. Jacquini** Vill.
Im ö. Gr. Gebhardsberg (Richen).
- H. amplexicaule** L.
Im ö. Gr. bei Bregenz (Sauter nach Dobel).

54. Fam. **Campanulaceae** Juss.

Jasione L.

- J. montana** L. Abhänge, Triften. v^2z^3
Hbo: Bahndamm bei Rehlings, an Rainen bei Hagspiel (A., H.), am Krähenberg bei Weiler (H.), am Laubenberg bei Harbatzhofen.
ö. Gr. Eichenberg (Höfle), Langen, (Zimmerl), Pfänder (Sauter).

Phyteuma L.

- Ph. orbiculare** L. Waldwiesen. v^2z^2
Hbu: im Zechwald bei Unterhochsteg (B.).
Hbo: Bei Schwarzensee am Bahndamm.
- Ph. spicatum** L. Wälder. v^4z^3
Hbu und Hbo verbreitet.
- Ph. nigrum** Schmidt.
Im w. Gr. am weißen Brunnen bei Wolfegg (Vollmer).¹⁾

Campanula Tourn.

- C. rotundifolia** L. Wiesen, Mauern. v^4z^3
Hbu und Hbo verbreitet.

1) Vollmer, Oberamtstierarzt in Steinach bei Waldsee, um 1880.

- C. pusilla Haenke.** Nagelfluhabhänge. v²z²
 Hbo: Rohrach bei Kienberg, am Schüttentobel bei Hoheneck
 (Gmde. Ebratzhofen), Argenabhänge gegenüber von Gestraz, Iberg
 bei Riedholz, Gerbertobel (H.).
- C. rapunculoides L.** Hecken etc. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- C. Trachelium L.** Auen, Hecken, Wälder. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- C. patula L.** Wiesen etc. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo gemein.
- C. Rapunculus L.** Wiesen. v²z²
 Hbu: Um Lindau (Dobel), Wiesen in Reutin gegen Mozach.
 Hbo: Bei Riggatshofen am Abhänge gegen Bruggach. ∞ Im ö. Gr.
 Hacken bei Bregenz (Sauter).
- C. glomerata L.** Waldwiesen. v¹z²
 Hbu: Im Zechwald (B., Kellermann).
- C. barbata L.**
 Im ö. Gr. Pfänder (Sauter); im w. Gr. Adelegg bei Isny (Martens).

Specularia Heister.

- Sp. Speculum Alph. DC.**
 Im ö. Gr. bei Bregenz (Döll).

55. Fam. **Siphonandraceae Klotzsch.**

Vaccinium L.

- V. Myrtillus L.** Wälder, Moore. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo verbreitet.
- V. uliginosum L.** Hochmoore. v³z⁴
 Fehlt Hbu.
 Hbo: Degermoos, Moore bei Sigmanns, Röthenbach, Ratzenberg,
 Oberreute, Isenbretzhofen, Hagspiel, Unterstein etc.
- V. vitis Idaea L.** Wälder, Moore. v⁴z⁴
 Hbu? In Hbo überall verbreitet.
- V. Oxycoccus L.** Moore zwischen Sphagnum. v²z³
 Hbu: am Wasserburger Bühel, bei Enzisweiler.
 Hbo: Zeisertsweiler, Sauters, im Degermoos (Sch., A.), Ratzen-
 bergermoos, bei Isenbretzhofen, Trogener Moos (H.), Moos bei
 Stockenbühl (H.), bei Hagspiel, bei Röthenbach, am Schwarzensee,
 zwischen Sigmanns und Engelitz.

56. Fam. **Ericaceae Lindl.**

Andromeda L.

- A. polifolia L.** Hochmoore. v³z³
 Hbo: Degermoos, am Schwarzensee, zwischen Hagspiel und Biel,
 im Ratzenberger Moos, bei Isenbretzhofen, Egg bei Röthenbach,
 zwischen Engelitz und Sigmanns, bei Laimtobel, Trogener Moor
 (H.), Moor bei Oberreute (H.), Stockenbühler Moor (H.).

Calluna Salisb.

- C. vulgaris Salisb.** Heiden, Wälder, Triften. v⁵z⁵
 " " **f. flor. alb.** Hbo zwischen Grünenbach und Riedholz. („Wilde
 Seben“.)

Erica Tourn.

E. vulgaris Salisb.

Nur im ö. Gr. Hbu: Maihof bei Unterhochsteg am Seeufer, ca. 200 m aufer der Grenze (Milz), Schluchten bei der Ruggburg auf Nagelfluh. z²

57. Fam. **Rhodoraceae Klotzsch.**

Rhododendron L.

Rh. ferrugineum L.

† (??) bei Heimenkirch und Laubenberg um Grünenbach, um Weiler (Dobel). Im w. Gr. Schwendimoos bei Lautersee unweit Kislegg (Pfanner).

Rh. hirsutum L.

Bei Weiler im Gerbertobel auf tertiärer Nagelfluh 850 m (H.). z²

58. Fam. **Hypopityaceae Klotzsch.**

Pirola Tourn.

P. chlorantha Sw. Nadelwälder. v²z²

Hbo: Im Bösenreutiner Tobel (Dobel, A.), zwischen Hegnau und Hege. ö. Gr. Bregenz (Döll); w. Gr. Bolsternang und Eisenharzer Wald (Herter).

P. rotundifolia L. Wälder, Auen. v³z³

Hbo: Gebüsch an der Feldkapelle zwischen Wildberg und Heimholz, Leiblachabhänge, zwischen Hummertsweiler und Dürren, Degermoos, am Staufenberg bei Niederstauen, bei Schlachters, Adelberg bei Niederstauen, Nadenberg bei Litzis, Argenthal bei Gestraz, Kapelle oberhalb Scheidegg; um Weiler verbreitet (H.), besonders Rothachauen bei Siebers, Wälder beim Gerbertobel (H.) etc.

P. media Sw. Waldwiesen. v²z²

Hbo: An der Leiblach unterhalb Sigmarszell mit Sturmia, Herminium, Gymnad. odorat., moosiger Hochwald zwischen Scheidegg und Weyenried, oberhalb Litzis gegen Ratzenberg.

P. minor L. Wälder, Gebüsch. v³z³

Hbu: Rickenbacher Tobel, zwischen Hege und Hegnau.

Hbo: Ratzenberger Moos, Oberberg bei Weiler, buschige Hänge zwischen Thumen und Sigmarszell.

P. secunda L. Nadelwälder. v⁵z⁴

Hbu und Hbo gemein.

P. uniflora L. Wälder. v²z³

Hbu: In der Hangnach leiblachaufwärts (B.).

Hbo: Um Weyenried, bei Oberstein; um Weiler nicht selten, so Kapfholz, Trogener Wald etc. (H.). w. Gr. um Wangen, Eglofs, Eisenharz, (Martens).

Monotropa L.

M. Hypopitys L. Wälder. v³z³

Hbu: Hangnach.

Hbo: Zwischen Hummertsweiler und Dürren, im Mozacherwald (Sch.); Wälder um Weiler und Lindenberg nicht selten (H.), bei Oberreitnau (Dobel).

III. Unt.-Kl.: **Corolliflorae.**

59. Fam. **Aquifoliaceae DC.**

Ilex L.

- I. aquifolium L.** Wälder. v²z³
 Hbo: In einer Waldschlucht zwischen Bramatsrette und Oberstein, Gerbertobel (H.). Im ö. Gr. zahlreich am Pfänder. („Stechholder“.)

60. Fam. **Oleaceae Lindl.**

Ligustrum Tourn.

- L. vulgare L.** Auen, Hecken. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.

Fraxinus Tourn.

- F. excelsior L.** Wälder, Auen. v³z²
 Hbu und Hbo zerstreut.

61. Fam. **Asclepiadaceae R. Br.**

Vincetoxium Mnch.

- V. officinale Mnch.** Hecken, Gebüsch. v³z²
 Hbu: Am Bodenseeufer bei Nonnenhorn; am Seeufer zwischen Reuteneu und Wasserburg.
 Hbo: Bei Malaichen an der Argen; auch bei Weiler einmal gefunden (H.).

62. Fam. **Apocynaceae R. Br.**

Vinca L.

- V. minor L.** Wälder, Gebüsch. v³z⁴
 Hbu z. B. Zechwald, Schöngarten, Hangnach, Mozacherwald, Hecken in Reutin, selten am Waldrand Bösenreutin-Egghalden (Sch.).
 Hbo verbreitet, z. B. Oberrengrersweiler, Sigmarszell, Immenmühle, Argenthal z⁴, Ellhofer Tobel, Heimenkirch, Schreckenmanklitz, Kirchhofmauer in Grünenbach u. s. w.

63. Fam. **Gentianaceae Juss.**

Menyanthes Tourn.

- M. trifoliata L.** Sumpfwiesen, Moorgräben. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.

Chlora Koch.

- Ch. serotina Koch.**
 Im ö. Gr. auf Heidewiesen am Pfänder oberhalb Bregenz. v²z²!

Sweertia L.

- S. perennis L.**
 Im w. Gr. Breitmoos bei Wolfsegg (Herter).

Gentiana Tourn.

- G. lutea L.**
 Im ö. Gr. am Hechberg ca. 1 km über der Grenze. z³

- G. asclepiadea L.** Mooswiesen, Gebüsche, Auen. v⁴z⁸
 In Hbu nicht beobachtet.
 In Hbo überall, im unteren Teil auf Streuwiesen, von Schönau an
 aufwärts.
- G. cruciata L.** Triften. v³z³
 Hbo: Johannishügel bei Zeisertsweiler, Scheffau—Neuhaus, Rohrach,
 zwischen Zwirkenberg und Gestraz, Ellhofen, Dallendorf und Mal-
 aichen bei Gestraz, auf Kies bei Mariathann, bei Stiefenhofen, um
 Weiler an einigen Stellen: bei der grossen Fabrik (H.); zwischen
 Simmerberg und Oberstaufer häufig (H.).
- G. Pneumonanthe L.** Streuwiesen. v⁴z⁴
 In Hbu und unteren Teil von Hbo verbreitet; im oberen Teil:
 Neuhaus bei Scheffau; fehlt um Weiler (H.).
- G. verna L.** Heiden, Triften. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- G. aestiva Roem. et Schult.** Trockene Wiesen. v³z³
 Hbo: Bahndamm bei Oberhäuser, Ellhofen, Rothachabhänge bei
 Weissen, Waldränder am Schwarzensee, Lengaz bei Mariathann.
- G. utriculosa L.**
 Hbu: Zwischen Wasserburg und Nonnenhorn (B.).
 Hbo: Nächst der Hammermühle am Wege nach Ellhofen (H.). z³
- G. campestris L.**
 Im w. Gr. bei Isny (Kolb).
- G. germanica Willd. (Wettsteinii Murh.).** Triften. v⁴z⁴
 Hbu: Im Heuried auf Heideboden an der Strafse von Rickenbach
 nach Wesen.
 Hbo: Zwischen Dornach und Niederstaufer, weiter aufwärts ver-
 breitet.
- G. ciliata L.** Triften, Heidewiesen. v⁴z⁸
 Hbo: Von Niederstaufer aufwärts verbreitet, um Weiler sehr häufig
 (H.); im unteren Teil am Bahndamm Gitzenweiler bis Rehling.
- Erythraea Rich.**
- E. Centaurium Pers.** Wiesen. v⁴z⁸
 Hbu und Hbo verbreitet; in Hbu z⁵ am Seeufer zwischen Unter-
 hochsteg und Villa Leuchtenberg.
- E. pulchella Fr.** Wege, Brachfelder. v⁴z⁸
 Hbu und Hbo ebenso häufig als vorige.
- " " **f. simplex A. Schwarz.** Hbu in einer alten Lehmgrube in Heu-
 ried bei Ziegelhaus. z⁴

64. Fam. **Polemoniaceae Lindl.**

Polemonium Tourn.

- P. coeruleum L.**
 Im w. Gr. Argengebüsch in der Gegend von Eglöfs (Herter).

65. Fam. **Convolvulaceae Juss.**

Convolvulus Tourn.

- C. sepium L.** Hecken, Gebüsch. v⁴z³
 Hbu gemein; um Lindau auch in schilffreiechen Sumpfwiesen (Sendtner).
 Hbo verbreitet; auch um Weiler (H.)
- " " **f. Blüte mit 5 roten Streifen:** Hbo: Grünenbach.

- C. arvensis L.** Bahndämme, Äcker, Raine. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet, jedoch um Weiler sehr selten (H.).
" " **Varietät mit schneeweißer Krone.** Hbu: An der Bahn in Holder-
eggen.

Cuscuta Tourn.

- C. europaea L.**
Hbu: Auf Schilf und auf *Aster salicifolius* Scholler bei Villa Ehr-
lich am Schwesternberg. v¹z³ ∞
- C. Epithymum L.** Heidewiesen. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Hbu: Heuried, Seegelände (Dobel);
Hbo: Hubers, Höhenreutin u. s. w.
- " " var. **Trifolii Babington.** Hbu: Auf Klee in Degelstein bei Schachen;
Hbo: Auf *Medicago sativa* am Bahnhof Hergaz.
- C. Epilinum Weihe.**
Im ö. Gr.: Mehrerau und Riedenburg auf Lein (Bruhin).

66. Fam. **Boraginaceae Desv.**

Lappula Rupp.

- L. Myosotis Mnch.**
Im ö. Gr. Hofen (Graf Sarnthein).

Cynoglossum Tourn.

- C. officinale L.** v²z²
Hbu: Am Bettbauer Weiher (B.), am Bahnhof Mitten z¹ (1899).

Omphalodes Tourn.

- h u. sp **O. verna Mnch.**
sp in Hbo: Am Abhang neben der Strafsenkreuzung in Stocken-
weiler. z²

Borago Tourn.

- c u. sp **B. officinalis L.**
sp Hbo: Am Bahnhof Schlachters, Waldrand zwischen Möllen und
Reutte; bei Station Röthenbach.

Anchusa L.

- A. officinalis L.**
Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Symphytum Tourn.

- S. officinale L.** Gräben, feuchte Wiesen. v⁴z³
Hbu gemein; ebenso in Hbo bis Schwarzensee verbreitet; fehlt
sicher um Weiler (H.).

Pulmonaria Tourn.

- P. officinalis L.** Gebüsche, Auen. v³z³
Hbu: Leiblachauen in der Hangnach, im Zechwald.
Hbo: Im ganzen Leiblachthal, bei Bösenreutin, Wald zwischen
Hummertsweiler und Muttelsee, im Argenthal bei Handwerks;
Hausbachanlagen bei Weiler (H.).
- P. angustifolia L.**
Im w. Gr. sonnige Gehölze bei Isny, auch var. *B. oblongata* Schrader
(Martens).

Echium Tourn.

- E. vulgare L.** Auen, Triften. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

Lithospermum Tourn.

- L. officinale L.** Gebüſche, Auen. v²z³
 In Hbu häufig: Leiblachthal, Zechwald, Bodenseeufer.
 In Hbo nicht beobachtet; fehlt um Weiler (H.).
- L. arvense L.** v²z²
 In Hbu: Am Rangierbahnhof.
 In Hbo: Schutt zwischen Lindenberg und Ratzenberg; ö. Gr. Meh-
 rerau (Bruhin).

Myosotis Dillen.

- M. palustris Rth.** Gräben, Sumpfwiesen. v⁵z⁴
 " " var. **Rehsteineri Wartm.** In Hbu am Bodenseeufer verbreitet v³z⁵
 (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig).
 " " f. **flor. roseis et alb.** Galgeninseln bei Lindau.
 " " var. **strigulosa Rchb.** Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg.
 Im ö. Gr. Sumpfwiesen bei Bregenz gemein (Custor, Sauter).
- M. silvatica Hoffm.** v²z²
 Hbu: Bodenseeufer bei Wasserburg, bei der Eichenplantage am
 Rangierbahnhof.
- M. intermedia L.** Felder. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.

67. Fam. **Hydrophyllaeae R. Br.**

Phacelia Benth.

- Ph. tanacetifolia Benth.**
 qsp Hbu: An Bahndämmen von Wasserburg bis Nonnenhorn (A., B.),
 soll 1898 von einem Bienenzüchter ausgesät worden sein. v²z³

68. Fam. **Solanaceae Juss.**

Lycium L.

- L. barbarum L.**
 sp Hbu: Ufer beim Seewirt in Nonnenhorn (Sch., A.), am Garten-
 zaun bei den Lagerhäusern Lindau.

Solanum L.

- S. nigrum L.** Schutt, Wege. v⁸z³
 Hbu: Um Lindau verbreitet (Dobel), z. B. Bleiche in Reutin,
 Schutt in Lindau, Enzisweiler.
 Hbo: Auf Schutt in Oberreitnau; auf Gartenland in Weiler sehr
 selten (H.).
- S. Dulcamara L.** Hecken, Auen. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- S. tuberosum L.**
- S. Lycopersicum L.**
 sp. auf Schutt in Hbu: In Lindau am kl. See; bei Unterhochsteg.

Physalis L.

- h u. sp Ph. Alkekengi L.**
 sp Hbu: Um Lindau an Häusern, in Äschach und am Wasser-
 burger Büchel (Dobel); an letzterem Ort neben dem Gasthause. z²
 (A.). Im ö. Gr. bei der Ruggburg am Wege nach Lochau (H.).

Atropa L.

- A. Belladonna L.** Waldschläge. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.

Hyoscyamus Tourn.

- H. niger L.** Schutt. v¹z¹
 Hbu: Auf Schutt in Nonnenhorn; an Wegen (Dobel).
 Hbo: Vor einem Haus an der StraÙe in Oberstauen (H.). Im
 ö. Gr. Bregenz (Mz.).

Datura L.

- D. Stramonium L.** Neubrüche, Schutt. v²z²
 Hbo: Auf Beeten in Thumen, vor dem Hause des Fechtig in Thumen (1899), auf einer Brandstätte in Sulzemoos bei Oberreitnau; vor einem Haus in Weiler (H.).

68. Fam. **Scrophulariaceae R. Br.**

Verbascum L.

- V. Thapsus L.** Felder, Sandgruben. v⁴z²
 Hbu z. B. Bleiche, Wasserburg, HochsträÙs etc.
 Hbo z. B. Biesings, Schwarzensee, Zwirkenberg bei Gestraz.
- V. thapsiforme Schrad.** z²
 Im ö. Gr. bei Bregenz (Milz, Sauter).
- V. phlomoides L.** Brachen, Abhänge. v³z²
 Hbo: Leiblachthal zwischen Kleyen- und Immenmühle, Abhänge bei Biesings, Hegnau, Oberrengersweiler, Zwirkenberg bei Gestraz.
- V. Lychnitis L.**
 sp. in Hbo: Bahndamm zwischen Hergaz und Oberrinzenbruck.
- V. nigrum L.** Wiesen, Wegränder. v⁴z³
 In Hbu gemein, Hbo verbreitet bis Handwerks an der Argen; um Weiler fehlend (H.).
- ” ” var. *a. lanatum* **Schrader.** Hbo: Kiesplatz am Schwarzensee z²; im ö. Gr. Mohrenau (Bruhin).
- V. Blattaria L.** z¹
 sp. Hbu: Am Seeufer in Nonnenhorn beim Seewirt.

Scrophularia Tourn.

- Sc. nodosa L.** Auen, Wälder, Gräben. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- Sc. Erharti Stev. var. Neesi Wirtg.** Gräben. v²z³
 Hbu: Gärten in Äschach, Gräben in Reutin, bei Villa Amsee, beim Rangierbahnhof, in Ziegelhaus, an der Bleiche (Sch.), am Köchlinweiher (Sch.); fehlt Hbo.

Antirrhinum L.

- A. majus L.** z¹
 sp. Hbu: † Stadtmauern in Lindau (Dobel); Ufer beim Seewirt in Nonnenhorn. z¹
 Hbo: Friedhofsmauern in Unterreitnau; ö. Gr. Bregenz (Bruhin). z²
- A. Orontium L.** z²
 sp. Hbu: Lindau (Dobel) †.
 Hbo: Auf Schutt zwischen Lindenberg und Ratzenberg. z²

Linaria Tourn.

- L. Cymbalaria Mill.** Mauern. v²z³
 Hbu: An alten Mauern des Hafens und der Stadt Lindau (Dobel), Ufermauern in Äschach, Mauern des Schlosses Moos in Äschach, an der Steinbrücke in Heimesreutin, Mauern des Schlosses Wasserburg.

- L. minor Desf.** Bahndämme, Kiesplätze, Seeufer. v⁴z³
 Hbu: Bodenseeufer, Rangierbahnhof, Bahndämme.
 Hbo: Bahndämme bis Hergaz verbreitet; auf Kies bei Mariathann,
 um die Station Röthenbach, Bachbett der Rothach bei Siebers (H.).
- L. Elatine Mill.** Äcker. v²z²
 Hbu: Bei Schachen unweit Lindau (Dobel) †?, Brachäcker zwischen
 Heimertsweiler und Dentenweiler. z³
- L. spuria Mill.**
 Im ö. Gr. westl. Pfänderabhänge (Dobel).
- L. alpina Mill.**
 Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache. z³
- L. vulgaris Mill.** Bahndämme, Acker. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- ” ” **var. oder sp.?** Pflanze bläulich bereift, Stamm aufrecht, oberwärts
 ästig, Blätter wechselnd, lanzett-linienförmig; Sporn kürzer als die
 Blumen (alles wie *L. vulg.*); jedoch Blüten gelblichweifs, kleiner
 als bei *L. vulg.*, Oberlippe weifs-gelb mit feinen, violetten Streifen,
 Gaumen hellorange. Hbu: Am Rangierbahnhof Lindau nächst
 dem Bahnwärterhäuschen bei Villa Amsee. v¹z²

Gratiola L.

- Gr. officinalis L.** Bodenseeufer. v¹z³
 Hbu: Zwischen Lindau und Bregenz auf Sumpfwiesen vereinzelt
 (Dobel), an den Ufern des Bodensees (Schonger), bei Unterhochsteg
 an zwei Stellen z³ im Schilfsumpf und am Ufer (A.).

Mimulus L.

- M. luteus L.** Gräben. v²z²
 Hbu: Am kleinen See in Aschach.
 Hbo: Strafsengraben in Grünenbach.

Limosella Lindern.

- L. aquatica L.**
 Im ö. Gr. Seeufer bei Bregenz (Custer, Sauter).

Digitalis Tourn.

- D. lutea L.**
 Im ö. Gr. Nadelwald am Eichberg ca. 1 km über der Grenze (Sch.). z³
- D. purpurea L.**
 ö. Gr. bei Bregenz (Dobel).

Veronica Tourn.

- V. scutellata L.** Moore.
 Hbu: Sumpfwiesen am Seegelände (Dobel).
 Hbo: Gräben im Ratzenberger Moos ∞; ö. Gr. Bregenz (Bruhin). z²
- V. Anagallis L.** Gräben, Bäche. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet.
- V. Beccabunga L.** Bäche, Gräben. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- V. urticifolia Jacq.** Waldschluchten. v³z³
 Hbu z. B. Hangnach, Rickenbacher Tobel.
 Hbo: Sigmarszell, Laubenberg, Ellhofer Tobel, Eistobel, Argenthal
 bei Gestraz, Rohrach, Wälder um Oberstein; bei Weiler nicht
 häufig (H.): Gerbertobel, Oberberg (H.).
- V. chamaedrys L.** Wiesen, Wälder. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.

- V. montana L.** Moosige Wälder. v²z²
Hbo: An der Ruine Ellhofen (A.), am Oberberg bei Weiler (H.).
- V. officinalis L.** Wälder, Heiden. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- V. prostrata L.**
ö. Gr. westl. Pfänderabhänge (Sauter).
- V. longifolia L.**
Hbu: Auf einer Wiese zwischen Schlachters und Thumen neben der Strafe v¹z² (flor. albis).
- V. spicata L.**
Im ö. Gr. westliche Pfänderabhänge (Sauter).
- V. fruticulosa L.**
Im ö. Gr. Rickenbachertobel am Pfänder (Sauter).
- V. serpyllifolia L.** Wiesen, Äcker. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- V. arvensis L.** Felder, Brachen. v³z³
Hbu: Rangierbahnhof, Schachen, Nonnenhorn.
Hbo: Steckenweiler, Sigmarszell, Engelitz, um Weiler verbreitet (H.).¹⁾
- V. Tournefortii Gmel.** Äcker. v⁴z³
Hbu verbreitet.
Hbo nicht selten; auch um Weiler häufig (H.).
- V. agrestis L.** Acker. v³z³
Hbu: Am Marktplatz Lindau, Böschung an der Lerche in Äschach u. a. O.
Hbo: Bahndamm zwischen Oberreitnau und Höhenreute; Umgebung von Weiler nicht selten (H.); Oberhäuser bei Heimenkirch.
- V. polita Fr.** Sandige Stellen. v²z²
Hbu: Auf Sand am Bodenseeufer bei Unterhochsteg, am Rangierbahnhof; ö. Gr. in Hörbranz.
- V. hederifolia L.** Auen, Felder. v³z³
Hbu und unterer Teil von Hbo verbreitet; fehlt jedoch im oberen Teil um Weiler, Lindenberg, Scheidegg, Simmerberg und Ellhofen (H.).
- Melampyrum Tourn.**
- M. arvense L.** Felder. v³z³
Hbu: Im w. Gr. Auen an der Argenmündung (Fronmiller).
Hbo: Egghalden zwischen Unter- und Oberreitnau, bei Hummertsweiler, bei Biesings, bei Bruggach; fehlt Weiler (H.).
- M. pratense L. (paludosum Gaud.).** Moore. v²z²
Hbo: Ratzenberger Moos, Rötenbacher Filz, Trogener Moor (H.).
- M. commutatum Tausch = pratense Aut.** Wälder. v⁴z⁴
Hbu z. B. Hangnach, Schönbühel.
Hbo z. B. Dunkelbuch, Ringoldsberg, Wigrazbad, Wald zwischen Scheidegg und Möggers (H.).
- M. silvaticum L.** Schattige Wälder. v²z³
Hbo: Schinderloch im Dunkelbuch, am Ringoldsberg, bei Hegnau, bei Opfenbach, in einem Wäldchen an der Strafe Oberstauen—Simmerberg nahe dem Orte Gennhofen bei 800 m (H.). z⁴
- Pedicularis Tourn.**
- P. silvatica L.** Feuchte Wiesen. v³z⁴
Hbu: Klosterteiche.

1) Ist demnach Seite 7, Zeile 11 von oben zu streichen!

Hbo: Zwischen Hergensweiler und Wolfgangberg, im Ratzenberger Moos, zwischen Manzen und Hammermühle, bei der Kapfmühle (H.), auch sonst um Weiler (H.).

- P. palustris L.** Nasse Wiesen. v^4z^4
Hbu und Hbo verbreitet.

Alectorolophus Hall.

- A. minor W. et Grab.** Wiesen. v^4z^3
Hbu und Hbo verbreitet.

A. major Rchb.

α . **glaber Rolh.** Im ö. Gr. gemein um Bregenz (Sauter) ?

β . **hirsutus All.** Wiesen. v^6z^4 . Hbu und Hbo gemein.

f. mit lineallanzettl., sitzend. Blättern in Hbu: Rand des Zechwaldes. z^2

- A. angustifolius Heynhold.** Steinige Plätze. v^3z^3

Hbo: Kiesplatz am Schwarzensee, bei Ratzenberg, am Laubenberg bei Harbatzhofen, bei Oberschwende (Gmde. Scheidegg), an der Bahn zwischen Röthenbach und Auers. Im ö. Gr. Heidewiesen um Möggers.

A. aristatus Celak.

ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache.

Euphrasia Tourn.

- E. officinalis L.** (Rostkoviana Heynh.). Wiesen, Auen. v^5z^4
Hbu und Hbo gemein.

E. nemorosa Pers.

β . **gracilis Fries.** Hbo an Holzschlägen im Osterwald bei Hochgeländ (Gmde. Gestraz) z^3 ; Triften bei Egg unweit Röthenbach z^1 , am Laubenberg bei Harbatzhofen.

E. salisburgensis Funk.

Hbo: Im Weifsachtobel bei Oberstaufen ca. 750 m (H.). v^1z^3

Odontites L.

- O. rubra L.** Felder, Wiesen. v^5z^4

Hbu und Hbo verbreitet.

- „ „ var. **serotina Lam.** Hbu am Bodenseeufer bei Villa Amsee. z^3

Lathraea L.

- L. squamaria L.** Laubwälder. v^8z^2

Hbo: Bösenreutiner Tobel, an der Leiblach oberhalb Hubers, im Rohrchtobel, bei der Ruine Altenburg (H.), Hausbachanlagen bei Weiler häufig (H.), Wald bei Rothach (H.), Gebüsch bei Auers (H.), um Weiler nicht selten (H.).

Orobanche L.

O. gracilis Sm.

Hbu: Am Grenzflüsschen Leiblach zwischen Lindau und Bregenz (Sauter, Rh. Fl. bei Höfle). Im ö. Gr. westl. Pfänderabhänge (Sauter, Custer).

O. caryophyllacea Sm.

Im w. Gr. Argenauen nahe der Mündung (Familler).

O. Epithimum DC.

soll Hbo im Gerbertobel vorkommen (H.); wird untersucht!

ö. Gr. Bregenz (Dobel).

- O. minor Sutt.** Kleefelder. v^3z^3

Hbu verbreitet: Bahndämme bei Hoyern (hier auch auf Pastinaca sativa), bei Schachen, Degelstein.

Hbo: Zwischen Riggatshofen und Hegnau; auf Klee bei Station Röthenbach.

- O. coerulescens Steph.** Auf *Achillea millef.* v²z²
 Hbu: In Hochbuch neben der Strafe (A.), in der Senftenau (Sch.), am Schönbüchel (Sch.), Wegränder an Wiesen um Reutin, Heimesreutin (Sch.).
- O. ramosa L.** Auf *Cannabis*.
 †? Hbu: In Wäldern bei Lindau (Dobel); ö. Gr. um Lauterach zahlreich (Sauter).

69. Fam. **Labiatae Juss.**

Lavandula L.

c **L. officinalis Chaix.**

Hyssopus T.

qsp **H. officinalis L.**

Hbu: Um Wasserburg ziemlich verbreitet, scheint mit *Phacelia* verschleppt zu sein (Brüller 1901).

Mentha Tourn.

- M. silvestris L.** Feuchte Plätze, Ufer, Gräben. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- " " var. **nemorosa Willd.** In Hbu auf Schutt zwischen dem „Engel“ in Äschach und der Senftenau. z² ∞
- M. aquatica L.** Gräben, Ufer. v⁵z⁴
 " " var. **hirsuta Koch.** Z. B. Gmündmühle.
 " " var. **glabrata Koch.** Z. B. Klosterteiche.
- M. gentilis L.**
 †? Hbu: Oberhof bei Weissenberg (Dobel), im Gebiete häufig kultiviert.
- M. hirta Willd. = nepetoides Lej. = silvestris × aquatica.** Waldschläge, Auen. v²z²
 Hbo: Abhang an der Strafe bei Gmündmühle, Abhang bei der Station Röthenbach im Walde neben dem Quellenhaus, Argenthal bei Malaichen an der w. Gr., Rothachauen bei Siebers.
- M. paludosa Sole = aquatica × arvensis.** v²z²
 Hbu: Klosterteiche, an einem Zaun in der Senftenau.
 Hbo: Strafsengraben bei Station Hergensweiler, Gräben bei Hagspiel (Gmde. Scheidegg), Rothachauen bei Siebers (H.).
 " " var.? (**paludosa Sole × silvestris L.?**) Blütenstand eine kopfig gedrängte Reihe von Scheinquirlen, außerdem noch 4—6 Wirtel in den Blattwinkeln, reich und großblütig, Stengel dicht rauhaarig, ziemlich starkästig, untere Blätter gestielt, eilanzettlich, obere Blätter fast sitzend, lanzettlich, beiderseits stark rauhaarig, grob und scharf gesägt-gezähnt; Kelch glockenförmig, spitz dreieckig gezähnt, inwendig behaart, Blumenkrone innen behaart.
 Hbo: An einem Strafsengraben bei Kremlen.
- M. verticillata L. = arvensis × aquatica.** v⁴z³
 Hbu z. B. Klosterteiche zwischen Sphagnum am Wasserburger Büchel, an Gräben bei Ziegelhaus.
 Hbo: An Gräben in Egghalden, bei Oberrengrersweiler, Thumen, Neuweiher bei Metzlers, zwischen Hergensweiler und Rupolz, an der Gmündmühle, bei Oberholz, bei Ruhlands, am Nadenberg, bei Hagspiel im Röthenbacher Filz, Waldsümpfe im Rohrach, bei Riedholz, Rothachauen, Laimtobel u. s. w.
 " " var.? (**verticillata × aquatica?**) Scheinquirle langgestielt, in der Achsel von Laubblättern, Stengel durch Blätter abgeschlossen;

Blätter fast herzförmig und langgestielt, beiderseits schwach anliegend behaart, in der oberen Hälfte grob und spitz sägezählig; Krone groß, hellrötlich, innen kahl; Kelch trichterförmig, innen behaart mit pfriemlichen Zähnen.

Hbo: Gräben in Ruhlands bei Opfenbach.

v¹z³

M. arvensis L. Brachen, Felder.

v⁵z⁵

M. piperita L. Häufig in Gärten.

Lycopus L.

L. europaeus L. An Gräben, Gebüsch.

v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Salvia L.

S. glutinosa L. Waldschluchten, Auen.

v⁴z³

Hbu selten: Leiblachthal bei Oberhochsteg.

Im oberen Teil von Hbo gemein an allen Wasserläufen.

S. pratensis L. Wiesen, Heiden.

v³z³

Hbu verbreitet z. B. am Seeufer bei Wasserburg.

Hbo im unteren Teile nicht selten: Bahndämme bei Schönau, Oberreitnau, Altrählings, Station Schlachters etc.; um Weiler und Oberstaufen nur stellenweise, so bei Ellhofen (H.), Wegraine bei Weiher (H.).

S. silvestris L.

Hbu: sp am Rangierbahnhof bei Lindau (Dollhof).

S. verticillata L. Trockene Abhänge.

v²z²

Hbo: Bahndamm zwischen Schönau und Oberreitnau z²; Abhang bei Schreckenmanklitz z² (H.); bei Rupenmanklitz (A.), Waldrand neben der Kiesgrube zwischen Möllen und Mariathann. z³

w. Gr. Argenabhänge bei Waltershofen und Eglofs (Martens).
ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Origanum Tourn.

O. vulgare L. Hecken, Triften, Wege.

v⁵z³

Hbu und Hbo verbreitet.

O. Majorana L.

Thymus Tourn.

Th. Serpyllum L.

” ” var. **Chamaedrys L.** Grasplätze, Hügel.

v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

” ” var. **humifusus Bernh.** Raine, Wege etc.

v⁵z³

Hbu und Hbo sehr verbreitet.

Satureja Tourn.

S. hortensis L.

Hbu: sp: am Rangierbahnhof zwischen Geleisen.

z³

Calamintha Mnch.

C. Acinos Clairv. Bahndämme.

v²z¹

Hbu: Aluvium des Seeufers (Dobel).

Hbo: Am Bahndamm unterhalb Station Schlachters, Bahndamm Röthenbach (H.); ö. Gr. Bäumle (Zimmerl), Bregenz (Sauter), Mehrerau (Bruhin).

C. alpina Lmk.

Im ö. Gr.: Kies der Bregenzer Ache.

z³

C. officinalis Mnch.

Im ö. Gr.: Bregenz (Custer, Sauter), Weg vom Gebhardsberg über die Kornhalde (H.).

Clinopodium Tourn.

Cl. vulgare L. Waldsäume etc.

v⁵z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Melissa Tourn.

h **M. officinalis L.** Z. B. in Schachen.

Glechoma L.

Gl. hederacea L. Felder, Hecken.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

Lamium Tourn.

L. amplexicaule L. Felder.

v²z²

Hbu: Am Bodenseeufer zwischen Reutenen und Wasserburg, an Ackerrändern in Wasserburg.

L. purpureum L. Äcker, Zäune, Schutt.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

L. maculatum L. Waldränder, Gebüsche.

v⁴z⁴

Hbu und unterer Teil von Hbo verbreitet; in Hbo um Weiler fehlend (H.), nur am Kreuz zwischen Scheidegg und Börserscheidegg (H., A.), und außerhalb Scheidegg an der Strafe nach Weyenried (H.).

L. album L. Wege, Schutt.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

Galeobdolon Huds.

G. luteum Huds. Waldränder, Gebüsche.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

Galeopsis L.

G. Ladanum L. Steinige Plätze.

v²z⁴

" " var. **angustifolia Ehrh.** Hbu: Bahndämme in Äschach, am Bodenseeufer um Wasserburg und Nonnenhorn (Sch., A.); Hbo: Bahndamm Schönau—Oberreitnau.

G. Tetrahit L. Acker, Gebüsche.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

G. speciosa Mill. Waldschläge, Felder, Brachen.

v³z⁴

Hbu und unterer Teil von Hbo fehlend; im oberen Teil häufig, z. B. Heimhofen, Geislehen, Halteplatz Opfenbach, Bahnhof Herzgaz etc.

G. pubescens Bess.

Im ö. Gr. gemein um Bregenz (Sauter).

Stachys Tourn.

St. silvatica L. Wälder, Hecken etc.

v⁵z³

Hbu und Hbo verbreitet.

St. palustris L. Felder, Gärten.

v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

St. arvensis L.

Hbu: Bei Lindau (Weifs, Excursionsflora von Bayern, S. 368; Sauter gibt 1837 und 1841 an „bei Lindau“, siehe auch Höfle).

†? **St. recta.** Im ö. Gr. Bregenz? (Richen).

St. annua L.

Hbu: Um Lindau (Dobel); am Bahndamm bei Station Enzisweiler. $z^1 \infty$ ö. Gr. Bregenz v^1z^1 (Milz).

St. alpina L.

w. Gr. an der Argen bei Isny und Neutrauchburg (Martens).

Betonica Tourn.

B. officinalis L. Waldränder, Triften.

v^4z^3

Hbu und Hbo verbreitet; bei Weiler fehlend (H.); auf einer Moorziese bei Mellatz (H.).

Ballota L.

B. nigra L.

Hbu: An der Giovannolimühle in Oberreuttin.

$z^3 \infty$

Leonurus L.

L. Cardiaca L.

† Hbu; Lindau (Dobel).

Scutellaria L.

Sc. galericulata L. Gräben, Sümpfe.

v^3z^3

Hbu: Unterhochsteg, Ziegelhaus, Klosterteiche, Wasserburger Bühel. Hbo: Waldteich bei Schlachters, Neuweiher bei Metzlers, Aschbachweiher bei Oberreitnau, am Schwarzensee, auf Schutt oberhalb Lindenberg; Gräben an der Bahn Röthenbach-Weiler häufig (H.).

Brunella L.

Br. vulgaris L. Wiesen, Moore.

v^5z^4

Hbu und Hbo gemein.

Br. grandiflora Jacq. Nach Richen in Vorarlberg gemein; scheint im Gebiet zu fehlen! (Nach Dobel im nördl. Teile des Bezirkes.)

Ajuga L.

A. reptans L. Wiesen, Moore.

v^5z^4

Hbu und Hbo gemein.

Teucrium L.

T. Botrys L. Dämme, Felder, Ufer.

v^2z^3

Hbu: Bodenseeufer Nonnenhorn—Wasserburg, Eisenbahndämme Nonnenhorn-Enzisweiler (Sch., A.), Weinberge um Nonnenhorn und Mitten; ö. Gr. Bregenz am See (Custer, Sauter); w. Gr. Schaulings bei Eglofs (Herter).

T. Scordium L.

Im ö. Gr: Bregenz an der Riedtriangel (Höfle).

T. Chamaedrys L. Trockene Plätze, Mauern.

v^2z^3

Hbu: Seedämme bei Äschach, Seeufer bei Reutenen und an der Wasserburger Bucht.

Hbo: Argenabhang bei Malaichen; Triften zwischen Zwirkenberg und Gestraz.

T. montanum L.

Im w. Gr. ein kleiner Busch im Kiese der oberen Argen unweit Eyb bei Eglofs (Herter).

70. Fam. **Verbenaceae** Juss.

Verbena Tourn.

- V. officinalis** L. Wege, Schutt. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

71. Fam. **Lentibulariaceae** Richard.

Pinguicula Tourn.

- P. vulgaris** L. Feuchte Wiesen, Moore. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

- P. alpina** L.
Im w. Gr. bei Isny selten (Kolb).

Utricularia L.

- U. vulgaris** L. Sümpfe. v³z³
Hbu: Wasserburger Bühel, Klosterteiche, Ziegelhaus.
Hbo: Waldteich bei Schlachters, Aschbachweiher bei Oberreitnau,
bei Sauters, Schwarzensee, Ratzenbergermoos, Wolfertshofen bei
Heimenkirch, im Feuerteich, ebenso bei Möllen.

- U. intermedia** Hayne. Gräben. v²z²
Hbu: Wasserburger Bühel (Hepp, A.).
Hbo: Ratzenberger Moos. ∞

- U. minor** L. Gräben, Sümpfe. v²z²
Hbu: Wasserburger Bühel, Klosterteiche (Sch.).
Hbo: Ratzenberger Moos, Schwarzensee.

72. Fam. **Primulaceae** Vent.

Lysimachia Tourn.

- L. thyrsoiflora** L. Gräben, Sümpfe. v³z³
Hbu: Klosterteiche, Heuried, Wasserburger Bühel.
Hbo: Stockenweiher (Sch.), Teich bei Schlachters, Rotkreuz, Moor
bei der Bleichen (Gmde. Wohmbrechts) bei Itzlings, am Schwarzen-
see, im Röttenbacher Filz.

- L. vulgaris** L. Ufer, Gebüsch. v⁴z⁴
Hbu und Hbo gemein.

- L. nummularia** L. Gebüsch, Wege. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

- L. nemorum** L. Schattige Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

Anagallis Tourn.

- A. arvensis** L. Felder, Brachen etc. v⁴z³
Hbu und unterer Teil von Hbo verbreitet, um Weiler im oberen
Teil zerstreut, im unteren Teil häufig (H.).¹⁾

- A. coerulea** Schreb.
Hbu: bei Schachen (B.).

Centunculus Dillen.

- C. minimus** L. Brachen. v²z³
Hbo: Zwischen Hummertsweller und Dentenweiler nahe der w. Gr.;
auf einem Brachacker zwischen Thumen und Sigmarszell.

1) Ist demnach auf Seite 7, Zeile 12 zu streichen!

Primula L.

- P. farinosa L.** Moore, Auen. v⁴z⁵
Hbu und Hbo verbreitet.
- P. acaulis L.**
Im w. Gr. am Prafenberg bei Wangen (Alt, Pharmazeut in Wangen, Eth, Herter); im ö. Gr. Pfänder bei Bregenz. z⁴
- P. elatior Jacq.** Wiesen, Wälder. v⁵z⁵
" " var. **uniflora acaulis.** Hbu: Wiese in Alwind z², Hbo: Abhang bei der Kirche in Sigmarszell. z¹
- P. officinalis Jacq.** Wiesen. v³z²
Hbu: in und um Nonnenhorn an einigen Stellen (Ruefs, Sch., B., A.), beim Buchenwäldchen am Wasserburger Bühel, am Rangierbahnhof Lindau (B., A.), Seeufer bei Unterhochsteg (Sch.), am Zechwald (Kellermann); an zwei Stellen zwischen Nonnenhorn und Wasserburg (B.).
Hbo: Bahnüberfahrt in Rehlings, Bahndamm unterhalb Station Schlachters, an der Landstrasse zwischen Niederstaufer und Dornach, am Bahndamm zwischen Unterninzenbruck und Hergaz mehrfach, Böschung am Waldweg Weiler—Auers (H.).
- P. acaulis** × **elatior** = **caulescens Koch.**
Im ö. Gr. am Pfänder. z³
- P. elatior** × **officinalis.**
Im w. Gr. auf einer Waldwiese zwischen Thunau und Langengargen z² (B.).

Hottonia Boerh.

- H. palustris L.**
w. Gr. stehendes Wasser bei Altmannshofen (Herter).

73. Fam. **Globulariaceae DC.**

Globularia Tourn.

- G. vulgaris L.** z²
Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache.

74. Fam. **Plantaginaceae Juss.**

Litorella Berg.

- L. juncea Berg.** Seeufer. v²z⁴
Hbu: Am Bodenseeufer Villa Leuchtenberg bis Unterhochsteg; im kleinen See beim Landthor Lindau; Galgeninseln beim Rangierbahnhof, Ufer von Alwind bis Wasserburg.

Plantago L.

- P. major L.** Felder, Schutt. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- P. media L.** Felder, Wiesen. v⁵z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- P. lanceolata L.** Wiesen, Moore. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- P. montana Lam.**
Steigt in Hbo bei Oberstaufer bis 1000 m herab (Britzelmayr).

IV. Unter-Kl.: **Monochlamydeae.**

76. Fam. **Amarantaceae.**

Albersia Kth.

A. Blitum Kth.

Hbu: Am Rangierbahnhof z², zwischen Pflaster der Schlofsökonomie Alwind. Im ö. Gr. Bregenz (Höfle).

Amarantus Tourn.

A. retroflexus L. Schutt, Mauern. v²z²

Hbu: Rangierbahnhof, im Bahnhofrayon Lindau, bei der städt. Männerbadeanstalt.

Hbo: Station Schlachters, am Haus Nr. 25 in Scheidegg; ö. Gr. Bregenz (Milz).

Polycnemum L.

P. arvense L. Felder, Triften. v³z⁴

Hbu nicht gefunden.

Hbo: Äcker bei Schwarzensee, zwischen Böersscheidegg und Ruppenmanklitz, Abhang des Laubenbergs gegen Harbatzhofen bei ca. 780 m, auf Feldern bei Mywiler.

76. Fam. **Chenopodiaceae Vent.**

Kochia Rth.

K. scoparia Schr.

Hbu: Am Zollamtsgebäude im Rangierbahnhof z³. Im ö. Gr. Bregenz (Döll nach Sauter).

Chenopodium Tourn.

Ch. hybridum L.

Hbu bei Lindau (Dobel).

Ch. album L. Acker, Schutt. v⁵z⁴

Hbu und Hbo gemein.

Ch. polyspermum L. Schutt, Wegränder. v⁵z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Ch. vulvaria L.

Hbu: Zollamtsgebäude am Rangierbahnhof. z³

Ch. Bonus Henricus L. Schutt, Wegränder. v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Ch. rubrum L. Seeufer, Schutt. v²z²

Hbu: Bodenseeufer bei Unterhochsteg, Schutt in Lindau, am Rangierbahnhof, Bahnhofrayon in Lindau.

Hbo: Station Schlachters.

Ch. glaucum L.

Hbu: Selten am Bodenseeufer (Custer, Sauter).

Blitum Tourn.

Bl. virgatum L. An Häusern. v²z²

Hbo: In Egghalden am Hause des Marte, in Egg bei Rötenbach am Hause des Martin Schneider seit drei Jahren spontan aufgetreten, vor einem Hause in Simmerberg (H.). Im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter).

Beta Tourn.

c **B. vulgaris L.**

Spinacia L.

c **Sp. oleracea L.**

Atriplex Tourn.

c **A. hortense L.**

A. patulum L. Schutt, Wegränder.

v⁴z³

Hbu gemein, ebenso unterer Teil von Hbo; im oberen Gebiet etwas seltener, z. B. Bahndämme um Heimenkirch, am Halteplatz Biesenberg.

77. Fam. **Polygonaceae Juss.**

Rumex L.

R. conglomeratus Murr. Ufer, Gräben.

v³z³

Hbu z. B. Klosterteiche, Heuried, zwischen Hangnach und Rickenbachertobel.

Hbo z. B. Diepolzberg, Dunkelbuch, Mapprechts bei Heimenkirch

R. paluster Sm.

Im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter).

R. obtusifolius L. Gräben, Wiesen etc.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo gemein („Fleckblatt“).

R. crispus L. Wege, Schutt.

v³z³

Nicht häufig, doch allenthalben zerstreut, z. B. Hbu am Bahnhof Lindau; Hbo Halteplatz Opfenbach, Weiler, Ellhofen etc.

R. Hydrolapathum Huds. Ufer, Gräben.

v²z²

Hbu: Seeufer in Nonnenhorn, Klosterteiche (Sch.).

Hbo: Im Ratzenberger Moos; ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter).

R. aquaticus L.

w. Gr. bei Langenargen (Martens).

R. sanguineus L. = nemorosus Schrad.

v²z²

Hbu: Wälder am Nadenberg, am Kienberg, im Rohrach.

R. crispus × obtusifolius = pratensis M. et K.

Hbo: An der Strafe zwischen Ellhofen und Oberhäuser z¹. Im ö. Gr. Bregenz (Caffisch nach Graf Sarntheim).

R. alpinus L.

Hbo: Im Schüttentobel auf Wiesen (Gmde. Ebratzhofen) bei ca. 760 m Höhe.

z³

R. scutatus L. Mauern.

v¹z²

Hbo: An der Friedhofsmauer in Unterreitnau; ö. Gr. Bregenz (Bruhin).

R. Acetosella L. Waldschläge, Felder.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

R. Acetosa L. Felder, Wiesen.

v⁵z⁴

Hbu und Hbo gemein.

Polygonum L.

P. Bistorta L. Feuchte Wiesen, Moore.

v⁴z⁴

Hbu fehlend, jedoch nach Dobel in Sumpfwiesen am Seegelände.

Hbo von Hergensweiler aufwärts im oberen Teil sehr verbreitet.

P. viviparum L.

†? Hbu: Um Lindau auf Torfwiesen (Sendtner), im oberen Teile des Bezirkes nach Dobel; nur fraglich: Moor bei Sauters z² im nichtblühenden Zustande beobachtet; Oberstaufer Berg von 1000 m aufwärts (H.); w. Gr. Bergwiesen bei Isny (Kolb), Breitmoos bei Wolfegg z² (Herter).

- P. amphibium L.** Teiche, Gräben. v⁴z⁴
Als var. **natans** in Hbu und Hbo verbreitet.
- ” ” f. **terrestre**. Hbu: Leiblachufer bei Unterhochsteg, Gebüsch bei der Bleiche in Reutin (blühend!), Seeufer in Äschach; Hbo: Gebüsch bei Station Schlachters, in Weiher.
- P. lapathifolium L.** Bahndämme, Gräben etc. v³z³
Hbu und unterer Teil von Hbo verbreitet, z. B. Bahndämme Enzisweiler—Nonnenhorn, am Rangierbahnhof; im oberen Teil nicht gefunden.
- P. Persicaria L.** Äcker, Gräben. Wege. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- P. Hydropiper L.** Gräben, Äcker. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
- P. mite Schrank.** Gräben. v⁴z⁴
Hbu und Hbo; häufiger als vorige.
Übergänge von Hydropiper zu mite finden sich in Hbu: Gräben am Exerzierplatz in Äschach.
Übergänge von P. mite zu Persicaria (*P. condensatum* F. Schultz) sind nicht selten, z. B. Gräben zwischen Oberreutin und Mozach.
- P. minus Huds.** Moore, Felder, Waldschläge. v³z³
Hbu: Enzisweiler, Bahnhof Nonnenhorn.
Hbo: Brachfeld zwischen Thumen und Sigmarszell, bei Oberengersweiler, beim Schloß Syrgenstein, im Wald zwischen Haus und dem Lindenberger Teich.
- P. aviculare L.** Überall. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- P. Convolvulus L.** Felder, Dämme, Gebüsch. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- P. dumetorum L.**
Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Fagopyrum Tourn.

- c **F. esculentum Mnch.**
Hbo: in Scheidegg c.

78. Fam. **Thymelaeaceae Juss.**

Passerina Wickstr.

- P. annua Wickstr.**
Im w. Gr. Obertheuringen (O.-Amt Tettnang), im Getreide einige Exemplare (Herter).

Daphne L.

- D. Mezereum L.** Wälder. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.

79. Fam. **Santalaceae R. Br.**

Thesium L.

- Th. pratense Ehrh.**
Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache (Dobel); w. Gr. Argenmündung (Höfle).
- Th. alpinum L.**
Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache.

Th. intermedium Schrad. dürfte = **Th. linophyllum** L. p. p. nach Custer (1821) und nach Richen mit **Th. pratense** Ehrh. verwechselt sein.
Im ö. Gr. bei Bregenz (Dobel).

80. Fam. **Elaeagnaceae** R. Br.

Hippophaë L.

- H. rhamnoides** L. Sandige Plätze. v²z²
Hbu: Bodenseufer zwischen Villa Leuchtenberg und Unterhochsteg (A., Sch.) z¹
Hbo: Auf einer Heidewiese unterhalb Station Schlachters ca. 20 Stöcke.

81. Fam. **Aristolochiaceae** Juss.

Aristolochia L.

- A. Clematis** L.
Hbu: An einem Hause in Schönau bei Lindau (Dobel bei Sendtner).

Asarum Tourn.

- A. europaeum** L. Wälder, Auen. v³z³
Hbu z. B. Hangnach, Zechwald.
Hbo: Dunkelbuch, Sigmarszell, Hochglend bei Gestraz, Hausbachanlagen (H.), Rothachauen bei der grossen Fabrik u. s. w.

82. Fam. **Euphorbiaceae** Juss.

Tithymalus Tourn.

- T. helioscopius** Scop. Gärten, Schutt. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
- T. strictus** Kl. et Grcke. Wiesen, Abhänge.
Hbu: Zwischen Unter- und Oberhochsteg, am Seeufer bei Unterhochsteg.
Hbo: Zeisertsweiler, Hubers, Metzlers, Station Schlachters, zwischen Mollenberg und Hergensweiler an der Bahn, Mekatz, Ratzenberg, Heimenkirch, um Weiler (A., H.), Station Opfenbach, um Scheidegg, Mapprechts, Hochglend bei Gestraz, Oberschwende bei 950 m etc.
- T. platyphyllos** Scop. Sandige Plätze. v¹z²
Hbu: Lindau (Dobel), am Seeufer bei Unterhochsteg einige Exemplare.
- T. dulcis** Scop.
Im ö. Gr. Klausberg bei Bregenz (Milz).
[Hbu im Zechwald (Kellermann) ist fraglich.]
- T. verrucosus** Scop.
Hbu: Rand des Zechwaldes bei Unterhochsteg (A., B.) v¹z³,
Leiblachufer (Custer), bei Lindau (Sendtner). Im w. Gr. bei Eisenharz v¹z² (Herter) und Wolfegg (Martens); im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter, Custer).
- T. amygdaloides** Kl. et Gcke.
Hbu: Bodenseufer zwischen Lindau und Wasserburg (Madlener).
- T. Cyparissias** Scop. Wiesen, Felder etc. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- T. Esula** Scop. Ufer, Dämme. v²z²
Hbu: Bodenseufer beim Rangierbahnhof.
Hbo: Bahndamm bei Höhenreutin.

- T. Peplus Gaertn.** Äcker, Kulturland. $\sqrt[5]{2^4}$
Hbu und Hbo gemein; soll jedoch bei Weiler ziemlich selten sein (H.).
T. exiguus Mnch. Brachäcker. $\sqrt[2]{2^2}$
Hbu: Am Rangierbahnhof. z^3
Hbo: bei Oberreitnau und Humertsweiler ∞ , fehlt um Weiler (H.). $\sqrt[3]{2^2}$
T. Lathyris Scop. Gartenunkraut. $\sqrt[3]{2^2}$
Hbu: Streitelsingen, Reutin, Mozach, Mitten, Nonnenhorn.
Hbo: In Scheffau und Scheidegg (804 m) Gartenunkraut.

83. Fam. **Acalyphaceae Kl. et Greke.**

Mercurialis Tourn.

- M. perennis L.** Wälder. $\sqrt[4]{2^4}$
Hbu und Hbo verbreitet.
M. annua L. Schutt. $\sqrt[2]{2^2}$
Hbu: In Lindau auf Schutt und zwischen Geleisen, in Äschach als
Gartenunkraut.

84. Fam. **Buxaceae Kl. et Greke.**

Buxus Tourn.

- h **B. sempervirens L.** In Gärten, auch als Baum.

85. Fam. **Urticaceae Endl.**

Urtica Tourn.

- U. urens L.** Wege, Mauern. $\sqrt[2]{2^2}$
Hbu: In Lindau sehr selten (B.).
Hbo: An zwei Häusern in Weiler (H.). ∞ (In Vorarlberg sehr
selten, Prof. Richen.)
U. dioica L. Wege, Gebüsch. $\sqrt[5]{2^4}$
Hbu und Hbo gemein.

86. Fam. **Cannabaceae Endl.**

Cannabis Tourn.

- C. sativa L.** Hie und da auf Schutt verwildert.

Humulus L.

- H. Lupulus L.** Gebüsch, Auen, Ufer. $\sqrt[4]{2^3}$
Hbu und Hbo verbreitet. Im unteren Teil von Hbo oft angebaut.

87. Fam. **Moraceae Endl.**

Morus Tourn.

- M. alba L. und nigra L.** In Hbu hie und da gepflanzt, z. B. am Exerzier-
platz in Äschach.

88. Fam. **Ulmaceae Mirbel.**

Ulmus L.

- U. campestris L.** Wälder, Schluchten. $\sqrt[3]{2^2}$
Einzeln und zerstreut, besonders in Waldschluchten, z. B. Hbo:
Dunkelbuch, Westkienberg, zwischen Sigmarszell und Dornach,
Eistobel bei Riedholz, Argenthal bei Malaichen.

U. effusa Willd. nicht beobachtet.

U. suberosa Ehrh.

Im ö. Gr. am Hacken (Sauter 1846).

89. Fam. **Platanaceae Lestib.**

Platanus Tourn.

h **P. occidentalis L. und orientalis L.**

In Hbu oft in Gärten und Alleen.

90. Fam. **Juglandaceae DC.**

Juglans L.

c **J. regia L.** In Obstgärten.

91. Fam. **Cupuliferae Rich.**

Fagus Tourn.

F. silvatica L. Wälder.

v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet; grössere Bestände fehlen; in Hbu ein Buchenwäldchen am Wasserburger Bühel; in Hbo ein Buchenwald im Rohrachobel oberhalb Gmüdmühle, jedoch auf österreichischer Seite.

Castanea Tourn.

C. vesca Gaertner.

sp Hbo: Im Walde zwischen Station Schlachters und Zeisertsweiler ein ca. 15 m hoher Baum; auf dem 907 m hohen Oberberg bei Weiler gedeiht ein ca. 6 m hoher Kastanienbaum, dicht am Wald, sehr gut (H.). ö. Gr. um Bregenz häufig.

Quercus L.

Qu. Robur L. Wälder.

v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Qu. sessiliflora Sm. nicht beobachtet.

92. Fam. **Betulaceae Rich.**

Betula Tourn.

B. alba aut. Wälder, Auen.

v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

B. pubescens Ehrh. Wälder, Moore.

v²z⁴

Hbu und Hbo verbreitet; z. B. Hbu: Wasserburger Bühel; Hbo: Degermoos, bei Sauters, Ratzenbergermoos, Röthenbacherfilz, Moos bei Isenbretzhofen etc.

Alnus Tourn.

A. viridis DC. Triften.

v³z³

Hbo: Um Harbatzhofen, Holzleute, Stiefenhofen, Isenbretzhofen, Oberreutin, Oberstein, bei Ratzenberg, Nadenberg, am Laubenberg, hohe Kugel, bei Bramatsreute, bei Oberschwende; ö. Gr. Pfänderücken v³; w. Gr. Hummertsried, Eisenharz, Eglofs (Herter).

A. incana DC. Flusauen, Bachufer.

v⁴z⁴

Hbu: Leiblachauen bis zur Mündung.

Hbo: Leiblachauen verbreitet; Durrachauen, Malaichen a. d. Argen, Rohrach, bei Gestraz a. d. Argen, Scheidegg, Oberstein, Hämmerle etc.

- A. glutinosa Gaertn.** Sümpfe, Bachufer. v⁶z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- Corylus Tourn.**
- C. Avellana L.** Wälder, Gebüsche. v⁶z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- Carpinus Tourn.**
- C. Betulus L.** Wälder. v⁸z⁸
Vereinzelt in Wäldern von Hbu und im unteren Teil von Hbo, z. B. zwischen Dornach und Sigmarszell; im oberen Teil wohl fehlend.

93. Fam. **Salicaceae Rich.**

Salix Tourn.

- S. pentandra L.**
c z. B. in Hbu: Park der Villa Amsee; im ö. Gr. bei Bregenz (Döll).
- S. fragilis L.** Ufer. v²z²
Hbu: Leiblachufer bei Unterhochsteg, Bodenseeufer beim Rangierbahnhof.
- ” ” **β) decipiens.** Um Lindau mit der Stammart (Sendtner).
- S. alba L.** Ufer, Auen. v⁴z⁴
Hbu verbreitet, z. B. Leiblachufer, Achufer.
Hbo ebenfalls verbreitet, z. B. Oberreitnau, Argenthal, Kiesplätze bei Röthenbach etc.
- ” ” var. **vitellina L.** Hbu: Am Bodensee (Sendtner); Hbo: Waldrand zwischen Dürren und Unterrengersweiler; ö. Gr. Mehrerau (Bruhin).
- (**S. amygdalina L.**) Ufer, Gebüsche.
Hbu: Leiblachufer bei Unterhochsteg.
Hbo: Degermoos, an der Strafe zwischen Unterninzenbruck und Stockenweiler, Argenthal bei Gestraz.
- ” ” **α. concolor Koch.** w. Gr. an der Argenmündung (Kirchner und Eichler).¹⁾
- S. amygdalina × fragilis Wimmer.**
Im ö. Gr. Auen der Bregenzer Ache.
- S. daphnoides Vill.** Kiesplätze, Auen. v³z³
Hbu: Seeufer bei Schloß Alwind und bei Wasserburg.
Hbo: Zwischen Egghalden und Thumen unweit Leiblachsberg an einer Kiesgrube, Rohrachtobel, Kiesplätze bei Station Röthenbach, an der Argen, Gerbertobel (H.). Im ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache. z³
- ” ” **α. acutifolia Willd.** Hbo im Degermoos.
- S. daphnoides × purpurea (= calliantha Kerner).**
Hbo: Im Rohrachtobel oberhalb Gmündmühle z¹ (♀).
- S. daphnoides × incana (S. Reuteri Moritzi).**
w. Gr. Prassberg (Kirchner und Eichler).
- S. purpurea L.** Auen, Wälder. v⁶z⁶
Hbu und Hbo gemein.
- S. purpurea × nigricans.**
Hbu: Am Bodenseeufer beim Rangierbahnhof 1 ♂ Baum.
Hbo: Argenauen bei Handwerks 1 ♂ Baum.

1) Kirchner und Eichler, Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern, Stuttgart 1900.

- S. viminalis** L. Auen, Ufer. v³z³
 Hbu und Hbo: Leiblachauen von Wigrazbad bis zur Mündung zerstreut; am Bodensee und an der Leiblach (Dobel).
 Hbo: Degermoos, im Rohrachtobel.
- S. viminalis** × **purpurea** = **rubra** Huds. z¹
 Hbo: Kiesplatz bei Station Röthenbach.
- S. purpurea** × **Caprea** = **Wimmeriana** Gr. z¹
 Hbo: Kiesplatz bei Station Röthenbach.
- S. viminalis** × **Caprea** = **stipularis** Smith.
 Hbo: Leiblachufer bei Unterhochsteg.
- S. incana** Schrank. Kiesplätze. v³z³
 Hbu: Bodenseeufer zwischen Nonnenhorn und Wasserburg; Leiblachauen zwischen Unter- und Oberhochsteg.
 Hbo: Kiesgrube zwischen Egghalten und Thumen; Tobel zwischen Sigmarszell und Dornach, bei Ruhlands auf Kies bei Mariathann; Kies bei Station Röthenbach; Argenauen bei Malaichen, Gerbertobel und Rottachauen (H.). Im ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter).
- S. grandifolia** Ser. Auen, Abhänge. v³z³
 Hbo: An der Strafe zwischen Biesings und Dornach, Rohrachtobel, Iberg bei Riedholz, Eistobel bei Riedholz, Gerbertobel (H.).
- S. Caprea** L. Auen, Wälder. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- S. Caprea** × **aurita** ♀. z²
 Hbo im Degermoos.
- S. Caprea** × **cinerea**.
 Hbo: Rothachauen bei Weiler (H.).
- S. cinerea** L. Gebüsche, Moore. v³z³
 Hbu: Bodenseeufer bei Unterhochsteg, Klosterteiche, Wasserburger Bühel.
 Hbo: Degermoos, Heidewiese bei Station Schlachters, Sauters, am Schwarzensee, Kiesplatz bei Station Röthenbach.
- S. aurita** L. Moore, Heiden, Waldränder. v³z³
 Hbu: Leiblachufer bei Unterhochsteg.
 Hbo: Leiblach bei Sigmarszell, Degermoos, Moore um Volkklings, Station Schlachters, Leiblachsberg, am Schwarzensee, Ratzenberger Moos, Röthenbacher Filz, Rohrachtobel, Abhang bei der Bleichen.
 " " **f. autumnalis** (im Herbst blühend, ♀ Blüten und Blätter zugleich).
 Hbo: Am Kienberg bei Letz z²; zwischen Hartnegg und Stiefenhofen auf Viehweiden. (Durch Abmähen entstehend?)
- S. aurita** × **cinerea** Wimm. (**multinervis** Döll).
 Hbo im Degermoos.
- S. cinerea** × **nigricans** Wimm. (**vaudensis** Forbes).
 Hbo im Degermoos.
- S. nigricans** Smith. Büsche, Auen, Moore. v⁴z⁴
 Hbu: Leiblachmündung, Rickenbacher Tobel, am Rangierbahnhof u. s. w.
 Hbo verbreitet, z. B. Degermoos, Rothachauen, Argenthal bei Handwerks etc.
- S. repens** L. Moorwiesen. v⁴z³
 Hbo: Degermoos, Sauters, Schwarzensee, Ratzenbergermoos, Röthenbacherfilz, bei Hartnegg, um Scheidegg etc.; w. Gr. Isny; ö. Gr. Bregenz.
- S. aurita** × **repens** Wimm. = **ambigua** Ehrh. Moore. v²z²
 Hbo: Degermoos, am Schwarzensee, Ratzenbergermoos; w. Gr. Isny (Kirchner und Eichler).

Populus Tourn.

- P. alba L.** In Hbo auf dem Staufenberg bei Niederstaufer ein ♀ Baum.
P. tremula L. Auen, Wälder. v⁵z³
Hbu und Hbo verbreitet.
P. nigra L. Ufer. v²z²
Hbu: Am Bodenseeufer zwischen Reutenern und Wasserburg; am Ufer bei Nonnenhorn.

II. Kl. Monocotyledoneae.

94. Fam. **Hydrocharitaceae DC.**

Elodea Rich. et Mchx.

- E. canadensis Rich. et Mchx.** Gräben, im Bodensee. v²z²
Hbu: Ehemals im kleinen See z⁵ (B., Kellermann), jetzt noch beim Männerbad z²; Gräben in der Senftenau. z³

Stratiotes L.

- S. aloides L.**
Im w. Gr. Kifslegg (Kirchner und Eichler).

Hydrocharis L.

- H. Morsus ranae L.** Nach Prof. Richen in Bayern nahe der Grenze; w. Gr. Moos bei Eriskirch (Martens um 1830).

95. Fam. **Alismaceae Juss.**

Alisma L.

- A. Plantago L.** Stehende Wässer, Gräben. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
" " var. **graminifolium Ehrh.** ö. Gr. Bodenseeriede (Custer).

Sagittaria L.

- S. sagittifolia L.** Gräben, stehende Wässer. v²z²
Hbu: Gräben beim Rangierbahnhof 1899; linealblättrige, nichtblühende Wasserform im kl. See nahe dem Anfang des Eisenbahnseedamms in Äschach. Im ö. Gr. Bregenz, Bäumlle (Sauter).

96. Fam. **Juncaginaceae Rich.**

Scheuchzeria L.

- Sch. palustris L.** Hochmoore. v¹z³
Hbu: Im Ratzenberger Moos an nassen Stellen zwischen Sphagnum (A., H.), Degermoos (Dobel), Trogener Moos (H.), Röthenbacher Filz (H.); w. Gr. Isny (Martens).

Triglochin L.

- T. palustris L.** Gräben. v³z³
Hbu: Quellhaus im Heuried beim Rickenbachersteig.
Hbo: Strafsengraben zwischen Scheffau und Biel, zwischen Mekatz und Mapprechts, Grünenbach.

97. Fam. **Potameae** Juss.

Potamogeton Tourn.

- P. natans** L. Gewässer, Teiche. v⁴z³
 Hbu z. B. Klosterteiche, im kl. See bei Unterhochsteg, Wasser-
 burger Bühel, Bach in Wasserburg, Leiblachmündung.
 Hbo z. B. Waldteich bei Station Schlachters; Feuerteich in Möllen.
- P. fluitans** Rth.
 Im w. Gr. Argenaltwasser bei Langenargen (Höfle).
- P. alpinus** Balb. = **rufescens** Schrad.
 Im ö. Gr. Lauterach; bei Bregenz (Sauter).
- P. plantagineus** Du Croz.
 Im ö. Gr. bei Bregenz (Glanz).
- P. gramineus** L. Altwasser, Teiche. v³z³
 Hbu: Leiblachaltwasser bei Unterhochsteg, Klosterteiche, Wasser-
 burger Bühel.
 Hbo: Aschbachweiher bei Oberreitnau, Waldteich bei Schlachters,
 Neuweiher bei Metzlers.
- P. lucens** L. Gräben, Teiche. v³z³
 Hbu: Kl. See bei Lindau, bei der Militärschwimmschule in Lindau,
 Ländeplatz Wasserburg, Wasserburger Bühel.
 Hbo: Schwarzensee.
- ” ” var. **kleinblättrige Form** = **acuminatus** Schum. In Gräben am
 Wasserburger Bühel.
- P. perfoliatus** L. Teiche. v³z³
 Hbu: Kl. See bei Lindau, Militärschwimmschule Lindau, Kloster-
 teiche, Wasserburger Bühel, Ländeplatz in Wasserburg, Bettnauer
 Weiher.
 Hbo: Fehlt um Weiler (H.); ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- P. crispus** L. Gräben, Teiche. v⁴z³
 Hbu z. B. Klosterteiche, Wasserburger Bühel, Bach in Reutin,
 Bettnauer Weiher.
 Hbo z. B. Feuerteich in Hegnau.
- P. acutifolius** Lk. Teiche. v¹z³
 Hbo: Im Feuerteich in Mollenberg (Gmde. Hergensweiler).
 w. Gr. Hammerweiher bei Wangen (Kirchner und Eichler).
- P. obtusifolius** M. et K. Teiche. v²z³
 Hbu: Im Wasserburger Bühel.
 Hbo: Neuweiher bei Metzlers.
- P. pusillus** L. Gräben. v³z³
 Hbu: Gräben an der Bahn in Unterhochsteg, Wasserburger Bühel,
 Heuried bei Ziegelhaus.
 Hbo: Feuerteich in Ruhpolz, Bach in Weiher.
- P. trichoides** Cham. et Schldl.
 Im ö. Gr. Bregenz (Sauter bei Reichenbach).
- P. pectinatus** L. Gewässer. v²z⁴
 Hbu: Kleiner See bei Lindau, Klosterteiche, Altwasser bei Unter-
 hochsteg.
 Hbo: Fehlt um Weiler (H.); ö. Gr. Mehrerau (Sauter).
- P. densus** L. Bäche, Gräben. v³z⁴
 Hbu: Quellbäche an der Klostermühle in Reutin; Bach in Reutin;
 Leiblachmündung.
 Hbo: Um Weiler in der Rothach und bei Hammermühle, Quell-
 bach in Weiher.

P. densus var. **oppositifolius** DC.

Hbo: Quellbäche und Zuflüsse der Rothach bei Weiler.

v¹z⁴

98. Fam. **Najadaceae** Lk.

Najas L.

N. minor All.

Im ö. Gr. Exerzierplatz bei Bregenz (Sauter); Lochsee im Füssacher Ried (A.).

99. Fam. **Lemnaceae** Lk.

Lemna L.

L. trisulca L.

Hbu: Teiche bei Lindau (Dobel). Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).

L. polyrrhiza L.

Hbo: Im Feuerteich in Ruhlands b. Opfenbach z⁸; ö. Gr. Meh-
rerau (Sauter).

L. minor L. Gräben, Pfützen, Teiche.

Hbu und Hbo gemein.

v⁵z⁵

100. Fam. **Typhaceae** Juss.

Typha Tourn.

T. latifolia L. Gräben, Moore, Teiche.

Hbu und Hbo verbreitet; z. B. Hbu: Zech, Heuried; Hbo: Deger-
moos, Scheidegg, Moor bei Biehl, Sumpflachen um Weiler nicht
häufig (H.) u. s. w.

v⁴z⁸

T. angustifolia L. Teichränder.

Hbu: Ziegelhaus (Dobel), Eisweiher der Inselbrauerei am Fusse
des Hoyerberges mit *Cyperus longus*; am Wasserburger Bühel.
Hbo: im Degermoos.

v²z⁸

T. minima Funk.

ö. Gr. am unteren Rhein bei Höchst (Sauter).

Sparganium Tourn.

S. ramosum Huds. Teiche, Gräben.

Hbu und Hbo verbreitet.

v⁴z⁸

S. simplex Huds.

Im ö. Gr. Bregenz--Höchst (Custer, Glanz, Sauter).

S. minimum Fries. Teiche.

Hbu: Wasserburger Bühel, Klosterteiche.

Hbo: Schwarzensee, Röthenbacher Filz, Ratzenbergermoos.

v²z⁸

101. Fam. **Aroideae** Juss.

Arum L.

A. maculatum L. Gebüsche.

Hbu: An Wegen und Gebüschchen im Eichbühel, an Gartenzäunen
in Äschach, an Zäunen bei Lindenhof, im Zechwald, ehemals
Strafengräben am Friedhof Äschach (B.) †.

Hbo: Dunkelbuch, Leiblachauen oberhalb Hubers, Abhang bei
der Kirche in Sigmarszell; fehlt um Weiler (H.).

v⁸z³

Acorus L.

- A. Calamus L.** Teichränder. v²z⁸
Hbu: Klosterteiche, Wasserburger Bühel.

Calla L.

- C. palustris L.**
Im w. Gr. Horgenweiher und Muttmannswald bei Kifslegg, im kl. Moos zwischen Waltershofen und Gebratzhofen (Pfanner), in einem Torfsumpf des Eisenharzer Waldes (Herter), Gründels, Neutrauchburg (Kirchner und Eichler).

102. Fam. **Orchidaceae Juss.**

Orchis L.

- O. purpurea Huds.** Gebüsche. v¹z¹
Hbo: Buschiger Abhang neben der Strafe bei Gmündmühle (A., Sch.). ∞ w. Gr. im Argenthal (Kirchner und Eichler).
- O. Rivini Gouan.** Triften, Waldwiesen. v⁴z⁸
Hbu und Hbo verbreitet. Hbu z. B. Heuried; Hbo z. B. Bahndamm bei Altrehlings, Rohrachtobel etc.
- ” ” f. **albiflora.** Hbo: Waldwiese bei Station Schlachters.
- O. ustulata L.** Heidewiesen. v³z²
Hbu: Bei der Badeanstalt Wasserburg, Leiblachauen zwischen Unter- und Oberhochsteg, Bodenseeufer bei Unterhochsteg, Hangnach am Leiblachufer.
Hbo: Rohrachtobel (A., Sch., H.), Rothachauen bei Siebers häufig, sonst vereinzelt in der Umgegend von Weiler (H.).
- O. coriophora L.**
Im w. Gr. Argenauen nahe der Mündung z² (Fronmiller), Isny (Martens).
- O. Morio L.** Wiesen, Heiden, Moore. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- O. mascula L.** Wiesen. v³z⁸
Hbu z. B. Heuried.
Hbo z. B. Eggertsweiler, Oberreitau, Rohrach, bei Station Röthenbach, Rothachauen bei Siebersbad (H.), Waldwiese bei Ellhofen (H.).
- O. maculata L.** Gebüsche. v⁴z⁸
Hbu z. B. Zechwald; Hbo z. B. Leiblachauen, Station Schlachters, Wigratzbad, Schwarzensee, Eistobel, um Weiler verbreitet (H.) etc.
- O. latifolia L.** Moore, Wiesen. v³z⁸
Hbu: Heuried bei Rickenbach u. a. O.
Hbo: Bei Wigratzbad, am Schwarzensee; um Weiler stellenweise auf Sumpfwiesen (H.).
- O. incarnata L.** Moore, feuchte Wiesen. v⁴z⁸
Hbu z. B. Heuried, Klosterteiche, Seeufer bei Unterhochsteg, am Wasserburger Bühel.
Hbo: Schönau, bei Riggatshofen, Schwarzensee, Ellhofer Tobel, Ratzenbergermoos; um Weiler häufig (H.).
- ” ” var. **α. Traunsteineri Saut.** Hochmoore. v²z² Hbu: Heuried gegen Rickenbach, am Wasserburger Bühel zwischen Sphagnum. Hbo: In Sphagnumpolstern am Schwarzensee.
- ” ” var. **ochroleuca Wüstnei.** Hbo: Im Ratzenbergermoos (A., H.) z²

Gymnadenia R. Br.

- G. conopea R. Br.** Heiden, Moorwiesen v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- G. odoratissima Rich.** Heide- und Sumpfwiesen. v³v⁸
 Hbu: Bei Lindau in Sumpfwiesen (Dobel), im Heuried z⁴, Moor zwischen Enzisweiler und Schachen, an den Klosterteichen.
 Hbo: Leiblachauen bei Sigmarszell; bei Oberhof, zwischen Zeisertsweiler und Thumen, bei Lattenweiler, am Waldrand bei Altrehlings neben der Bahn; in einem Quellsumpf bei Harbatzhofen, Abhang bei Schreckenmanklitz gegen Weiler (A., H.).
- G. conopea** × **odoratissima** = **intermedia Peterm.**
 Hbu: Moorwiesen am oberen Klosterteich z² und im Heuried bei Rickenbach unter den Eltern.
- G. albida Rich.**
 Im w. Gr. eine mässige Kolonie am schwarzen Grat in ca. 1080 bis 1100 m (Herter).

Platanthera Rich.

- P. bifolia Rch.** Heiden, Wiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- P. montana Rchb. fil.** = **chlorantha Cust.** Waldschluchten. v³z²
 Hbo: Bei Station Schlachters, Leiblachthal bei Stockenweiler, im Rohrachtobel, Gerbertobel, oberhalb Adelholz am Kienberg; w. Gr. Schwarzer Grat (Herter).
- P. viridis Lindl.**
 Im w. Gr. sparsam am schwarzen Grat in ca. 1100 m (Herter), bei Wangen (Etti).

Ophrys L.

- O. muscifera Huds.** Abhänge.
 Hbu im Heuried z¹ (Fronmiller).
 Hbo: Im Rohrachtobel bei Kienberg z²; im Gerbertobel häufig (H.).
- O. arachnites Murr.** Auen. v²z²
 Hbu: Unter Weidengebüsch zwischen Unter- und Oberhochsteg an der Leiblach (Dobel); auf einer Sumpfwiese bei der Bahnüberfahrt zwischen Ziegelhaus und Zech (B.).
 Hbo: An der Leiblach beim Steg nach Diezlings (B.), an der Leiblach oberhalb Hubers (A.); ö. Gr. um Bregenz (Sauter); w. Gr. Laimnau (Kirchner und Eichler), Langenargen an der Argenmündung (Martens).
- O. apifera Huds.**
 Hbu: Lindau (Prantl) ? Im w. Gr. an der Argen ausserhalb Bayern (Dobel).

Herminium R. Br.

- H. Monorchis R. Br.** Triften, Moore. v³z⁴
 Hbu: Wasserburger Bühel, Heuried, Klosterteiche, „Sumpf bei Lindau“ (Sauter), Sumpfwiesen bei Enzisweiler zwischen Unter- und Oberhochsteg.
 Hbo: Streuwiesen zwischen Schlachters und dem Bahndamm; Waldwiese bei Station Schlachters, bei Lattenweiler, Leiblachauen unterhalb Sigmarszell; Bahndämme bei Hergensweiler, bei Thumen, Unterreitnau, Oberhof; bei Schreckenmanklitz, Harbatzhofen, Ellhofer Tobel, Eistobel bei Riedholz, Rohrach; um Weiler häufig (H.).

Anacamptis Rich.

†?

A. pyramidalis Rich.

Hbu: Am Ziegelhaus bei Lindau (Dobel).

Cephalanthera Rich.

C. grandiflora Babingt. Wälder. v²z²

Hbu: Im Zechwald z², Waldrand zwischen Hegnau und Hege z².
Hbo: Bei Hubers, Wald zwischen Oberreitnau und Oberrengrersweiler; oberhalb Adelholz am Kienberg; w. Gr. Eisenharz, Isny, Adelegg (Herter).

C. Xyphophyllum Rchb. fil. Gebüsch, Abhänge. v³z³

Hbu: Unterhochsteg (Dobel), Waldrand zwischen Hege und Hegnau.
Hbo: Johannishügel bei Zeisertsweiler, Rohrachtobel, Gerbertobel häufig (H.), Durrachauen bei Mapprechts; w. Gr. Eisenharz, Rohrdorf, Adelegg (Herter).

C. rubra Rich. Abhänge. v²z³

Hbo: Rohrachtobel, an der Strafe im Rohrach, im Eistobel bei Riedholz, Gerbertobel, Kiesgrube beim Bahnhof Röttenbach (H.), in Wäldern um Weiler einzeln (H.); w. Gr. unt. Argen, Eisenharz (Herter).

Epipactis Rich.

E. latifolia All. Wälder, Abhänge. v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet; z. B. Hbo: Biesings, Ruine in Schreckenmanklitz, Wigrazbad, Laubenberg, Ratzenberg, Rothachauen, Isenbretzhofen, Rohrachtobel.

var. **viridans Crtz.** Hbo im Rohrach.

E. rubiginosa Gaud. Abhänge. v³z³

Hbu: Hangnach.
Hbo: Johannishügel bei Zeisertsweiler, Leiblachthal bei Hergensweiler, am Neuweiher bei Metzlers, im Rohrachtobel, zwischen Weiher und Hammermühle, im Ofenbach, Kiesplatz bei Station Röttenbach, Ruine Ellhofen, Durrachauen bei Mapprechts, Rothachauen bei Siebers (H.), Gerbertobel häufig (H.); w. Gr. Laimnau, Eisenharz, Adelegg (Herter).

E. palustris Crtz. Wiesen, Moore. v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

Listera R. Br.

L. ovata R. Br. Laubwälder, Auen, Gebüsch. v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

L. cordata R. Br. Hochwälder. v²z³

Hbo: Wald zwischen Burkartshofen und Kremlin; in Wäldern zwischen Scheidegg-Oberstein-Möggers.

Neottia L.

N. Nidus avis Rich. Wälder. v⁴z³

Hbu und Hbo verbreitet.

Goodyera R. Br.

G. repens R. Br. Moosige Wälder im ö. Gr. bei Möggers (Milz); w. Gr. an der Adelegg, Eriskirch (Kirchner und Eichler).

Spiranthes Rich.

S. autumnalis Rich. Abhänge.

Hbo: Auf Thonboden unter Egghalden an der Leiblach (Dobel); im w. Gr. auf einer Weide am Berghang bei Schaulings unweit

- Eglofs im Argenthal (Herter), Wangen (Martens um 1880); im ö. Gr. Mehrerau (Zimmerl im Herbar Bregenz), Weifsenreute (Miltz).
S. aestivalis Rich. Sumpfwiesen. v^2z^2
Hbu: Am Bodensee bei Wasserburg selten (Dobel); im Heuried am Quellenhäuslein bei der Rickenbacher StraÙe; auf moorigen Abhängen am oberen Klosterweiher (Sch., A.); ö. Gr. Riede um Bregenz (Bruhin, Glanz).

Coralliorrhiza Hall.

- C. innata R. Br.** Hochwälder. v^2z^2
Hbo: Im Wald nächst dem Gerbertobel (H.), im Walde bei Steibis auf dem Wege zur Kojen (H.) hier zahlreiche Exemplare; w. Gr. Eisenharzer Wald (Herter), am schwarzen Grat nach Eisenbach z^1 (Herter 1888).

Liparis Rich.

- L. Loesellii Rich.** Moore, Sumpfwiesen. v^3z^3
Hbu: Zingelhaus (Dobel, Kellermann); an den Klosterteichen (A., Sch.), zwischen Sphagnum am Wasserburger Bühel und gegen Degelstein; zwischen Schachen und Enzisweiler.
Hbo: Streuwiesen zwischen Schlachters und dem Bahndamm; bei Thumen gegen die „Scheibe“, quellige Wiesen an der Leiblach unterhalb Sigmarszell mit *Pirola media*, *Gymnadenia odorat.*; in Sphagnum am Schwarzensee; w. Gr. Eriskirch (Kirchner u. Eichler).

Malaxis Sw.

- M. paludosa Sw.**
w. Gr. bei Eriskirch (Hupfer de l'Orme, Apotheker in Hanau, um 1830), bei Isny (Kirchner und Eichler).

Cypripedium L.

- C. Calceolus L.** Abhänge, Auen. v^3z^3
Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg. z^1
Hbo: Leiblachabhänge zwischen Hubers und Sigmarszell; bei Stockenweiler an der Leiblach; Wald zwischen Biesings und Altis, im Rohrachtobel, am Nadenberg einzeln in allen Schluchten, im Laimtobel bei Buchenbühl, am Westkienberg, im Gerbertobel ziemlich häufig (H.), im Tobel am Mönchenstein (H.), im Hausbachtobel an mehreren Stellen (H.), im Wald bei Stockerbühl z^1 ; w. Gr. Eisenharz, Isny, Adelegg (Herter); ö. Gr. Abhänge am Pfänder verbreitet.

103. Fam. **Iridaceae Juss.**

Crocus Tourn.

- C. banaticus Heuff. = sativus var. vernus L.** Wiesen. v^2z^4
Nur Hbo um Ellhofen, Weiler und Oberstaufen verbreitet, stellenweise massenhaft (H.); auch in der Umgegend von Scheidegg vorkommend (H.), im Constanzer und Weissachthal bei Staufen (Dobel); [in Hbu bei Lindau (Prantl, Exkursionsflora für Bayern) ?]; in Hbo noch zahlreich auf Wiesen der Schweineburg bei Gestraz (Herter).

Gladiolus Tourn.

- G. paluster Gaud.** Sumpfwiesen. v^1z^3
Hbu: Im Heuried bei Rickenbach (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig, Kellermann, A.).

Iris Tourn.

- I. Pseud-Acorus L.** Gräben, Teichränder. v³z³
Hbu verbreitet; z. B. Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Ziegelhaus; bei Wasserburg, am Wasserburger Bühel, am Bettbauer Weiher, im Heuried, an den Klosterteichen.
In Hbo an einem Waldbach bei Oberhof und an allen Weihern bis zum Schwarzensee; im oberen Teil nicht beobachtet.
- I. sibirica L.** Sumpfwiesen. v²z⁴
Hbu sehr verbreitet, z. B. Wasserburg bei Lindau (Dobel), im Heuried z⁴, bei Unterhochsteg am Bodenseeufer, zwischen Bettbau und Hegnau am Rangierbahnhof etc.; w. Gr. Langenargen, Krefsbrenn (Kirchner und Eichler).
- I. graminea L.**
Im w. Gr. am Praftsberg bei Wangen (Etti um 1830).

104. Fam. **Amaryllidaceae R. Br.**

Narcissus L.

- N. Pseudo-Narcissus L.** Wiesen, Obstgärten. v³z³
Hbu: Lindau (Dobel), an einem Bache unweit des Hoyerberges, wo die Strasse nach Friedrichshafen abzweigt (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig), Letz bei Enzisweiler, Finegg, Schachen, Nonnenhorn, am Eichbühel, in Schöngarten (Sch., A.), in Enzisweiler und am Hoyerberg.
Hbo: Niederstauen (Dobel), Adelholz bei Niederstauen, Bodolz, Streitelsfingen, Hergaz, Obstgärten in Schwarzensee bei Hergaz; bei Oberhäuser (Gmde. Röthenbach) (H.), bei Rieden, Gmde. Simmerberg (H.), Altenburg nächst Weiler (H.) etc.; w. Gr. Praftsberg (Etti); ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- N. poeticus L.** Wiesen. v²z²
Hbu: Auf einer Wiese bei Ziegelhaus; in einem Sumpf bei Lindau ein Exemplar gesehen (Sauter), in der Senftenau (Sch.), bei Schöngarten (Sch.), Lindau, (Dobel).
Hbo: Geislohe und Dornach bei Niederstauen; bei Niederstauen (Dobel), bei Hergaz gegen Oberninnenbruck; auf einer Waldwiese zwischen Rupolz und Volkings nahe der Grenze; ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Leucojum L.

- L. vernalis L.** Wälder, Obstgärten, Wiesen. v⁴z⁴
Hbu: Bei Lindau in Menge (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig), z. B. Äschach, Nonnenhorn, Rickenbach, Heimesreutin.
Hbo verbreitet, z. B. Zeisertweiler, Höhenreutin, Sigmarszell, Biesenberg, Mywiler, Heimenkirch.

Galanthus L.

- G. nivalis L.** Obstgärten. v³z⁴
Hbu: Bei Lindau massenhaft (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig), z. B. Schachen, Reutin, Äschach, Streitelsfingen, Enzisweiler, Degelstein.
Hbo: Tobel (Gmde. Bösenreutin); w. Gr. Wangen, Kifslegg, Isny, am Bodensee im Oberamt Tettang (Kirchner und Eichler); ö. Gr. Lochau, Weifsenreute (Sauter).

105. Fam. **Dioscoreaceae R. Br.**

Tamus L.

T. communis L. Wälder.

v²z²

Hbu: Ein einzigesmal bei Unterhochsteg an der Leiblach gefunden (Dobel); im Rickenbachertobel bei Lindau noch vorhanden (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig); — im Zechwald bei Unterhochsteg v¹z² (♀); im Rickenbachertobel, 300 m hinter der Milchfabrik am abgeholzten östlichen Hange sowie am Gebüsch des östlichen Hanges z³ (♀ u. ♂); w. Gr. „im Argenthal“ (Kirchner und Eichler).

106. Fam. **Liliaceae DC.**

Gagea Salisb.

G. lutea Schult. Wiesen.

v³z³

Hbu: Auf einer Obstwiese im Schöngarten;
In Hbu im unteren Teile: Bruggach, Dentenweiler, bei Wolfgangsb-
berg (B.), in Sigmarszell, Taubenberg, Riggatshofen, Weifsensberg
(H.), in Obstgärten; w. Gr. Leupolz, Epplingen (Kirchner u. Eichler).

Lilium Tourn.

L. Martagon L. Waldschluchten.

v³z³

Hbu: Zechwald, Hangnach.
Hbo: Leiblachabhänge bei Hergensweiler, Rohrachtobel und in
den meisten Waldschluchten, Gerbertobel (H.).

Ornithogalum Tourn.

O. umbellatum L. Obstgärten.

v²z³

In Hbu: Aschach, Heimesreutin, Letz bei Enzisweiler, Rickenbach
(Rektor Kellermann), Hoyern. Hbo: Fehlt um Weiler (H.).

Scilla L.

h u. sp **S. amoena L.** Obstgärten.

v¹z²

Hbu: sp. in Nonnenhorn in Obstgärten und Wiesen neben der
Kressbronnerstrafse an einigen Stellen, sonst häufig in Gärten.

† **S. bifolia L.**

Hbu: Lindau (Dobel).

Allium L.

A. ursinum L. Auen.

v²z²

Hbu: Leiblachauen zwischen Unter- und Oberhochsteg im Gebüsch.
— Lindau (Dobel).
Hbo: Rothachauen bei der kleinen Fabrik an einer Stelle (H.);
w. Gr. in einem Tobel am schwarzen Grat gegen Eisenbach auf
sumpfigem Boden v¹z⁴ (Herter).

A. acutangulum Schrad. Sumpfwiesen.

v²z⁴

Nur Hbu: Sumpfwiesen um Lindau an der Bregenzerstrafse gemein
(Dobel), am Ziegelhaus, bei Hege, Mitten, im Heuried, Seeufer
Nonnenhorn bis Unterhochsteg, um Wasserburg, Nonnenhorn, Enzis-
weiler bis Bodolz, am Wasserburger Bühel, bei Holdereggen etc.

c **A. sativum L.** In Hbu meist in Weingärten angebaut.

A. suaveolens Jacq.

Hbu: Sumpfwiesen bei Wasserburg (Kellermann), ist zweifelhaft.

A. vineale L. Weinberge.

v²z³

Hbu: Am Hoyernberg z⁴, bei Enzisweiler, am Bahndamm Wasser-

burg bis Nonnenhorn, Gebüsch am Wege von Enzisweiler nach Bodolz; Weinberge und Obstwiesen zwischen Betttau und Bodolz. z^5

A. oleraceum L. Hecken, Gebüsch. v^2z^3

Hbu: Hecken auf der „Insel“ in Lindau; Streuwiesen zwischen Hegnau und Hege, am Wasserburgerbühel, in Äschach, Streuwiesen zwischen Bodolz und Enzisweiler, Seeufer Schachen bis Wasserburg, Seeufer bei Nonnenhorn.

A. Schoenoprasum L. Nasse Plätze, wild nur var. β . **sibiricum Willd.** v^2z^4

Hbu: Am ganzen Bodenseeufer, auf Streuwiesen um Reutin, Rickenbach, Bodolz, Hege, Wasserburg; w. Gr. Seeufer im Oberamt Tettwang (Schreck von Schreckenstein).

Asparagus Tourn.

A. officinalis L. Ufer.

Hbu: An der Leiblachmündung am Seeufer auf Sand z^2 , bei Alwind am Seeufer, sonst c.

Streptopus Rich.

S. amplexifolius DC. Hochwälder. v^2z^3

Hbo: Hochwald zwischen Scheidegg, Gaisgau und Oberstein; Wälder zwischen Weiler und Bahnhof Röthenbach verbreitet (H.); w. Gr. Eisenharzer Wald (Fleischer), Eglofs, Osterwald (Herter).

Paris L.

P. quadrifolia L. Gebüsch, Wälder. v^4z^3

Hbu und Hbo verbreitet.

„ „ f. **quinquefolia.** Um Weiler nicht selten (H.).

Polygonatum Tourn.

P. verticillatum All. Bergwälder. v^3z^3

Hbo: Bei Unterninzenbruck, im Rohrachtobel, Ellhofer Tobel, Eis-tobel, Laimtobel, Argenthal bei Untersteig, Wald zwischen Scheidegg und Börserscheidegg, bei Stiefenhofen, Burkartshofen, am Laubenberg, Rothachauen, Hausbanchanlagen (H.); w. Gr. Isny, Adelegg (Kirchner und Eichler).

P. officinale All. Hecken, Wälder. v^3z^3

Hbu: Zechwald, Mozach, Hangnach.

Hbo: Zwischen Dürren und Hummertsweiler, Leiblachhänge unterhalb Sigmarszell, zwischen Heimholz und Mollenberg, im Dunkelbuch, zwischen Schlachters und Wildberg, Neuweiher bei Metzlers, Neuhaus bei Scheffau; w. Gr. Wangen (Kirchner und Eichler); ö. Gr. Bregenz selten (Sauter).

P. multiflorum All. Wälder, Heiden. v^4z^3

Hbu und Hbo verbreitet, im Gebiet häufiger als vorige; jedoch bei Weiler vereinzelt: Rothachauen bei Bremenried (H.).

Convallaria L.

C. majalis L. Wälder. v^2z^4

Hbu: Zechwald bei Unterhochsteg.

Hbo: Rohrachtobel, Gerbertobel (H.); w. Gr. fehlt um Eglofs und Eisenharz (Herter).

Majanthemum Web.

M. bifolium Schmidt. Wälder. v^5z^4

Hbu und Hbo gemein.

„ „ f. **trifolium.** In Hbo: Nordabhang des Moränenhügels bei Station Schlachters. z^2

Muscari Tourn.

- M. racemosum Mill.** Weinberge. v⁸z³
 Hbu: Weinberge bei Alwind, Mitten, Nonnenhorn; am Bodensee-
 ufer bei Reutenen (Dobel) und bei Nonnenhorn; Bahndamm Mitten-
 Nonnenhorn; Weinberge bei Wasserburg (Dobel), Weinberge an
 der „Lerche“ in Äschach; w. Gr. Krefsbronn (Kirchner u. Eichler).

Hemerocallis L.

- H. fulva L.** Ufer. v²z⁴
 Hbu: Seeufer bei Unterhochsteg z⁴, Strafsenböschung des Wein-
 berges zur „Lerche“ in Äschach, am Seeufer bei Wasserburg und
 gegen Reutenen; neben der Strafe im oberen Nonnenhorn; w. Gr.
 Siggen (Herter).
- †? **H. flava L.**
 Hbu: Am Bodenseeufer bei Wasserburg (Dobel); ö. Gr. in einem
 Graben bei Bregenz (Sauter 1837).

107. Fam. **Colchicaceae DC.**

Colchicum Tourn.

- C. autumnale L.** Wiesen. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein (bei Wasserburg 1874 im März in Blüte;
 I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig von Bayern).

Veratrum Tourn.

- V. album L.** Triften, Sumpfwiesen. Als var. **Lobelianum Bernh.** v⁸z⁸
 Hbo: Zwischen Tobel und Oberhof z⁴; bei Schlachters z³ (Sch.),
 Wäldchen am Schwarzensee neben der Bahn, Ratzenberger Moos,
 Wald zwischen Station Röthenbach und Riedhirsch, um Weiler
 verbreitet (H.), so: Sumpf bei Trogen und Moor bei Stockerbühl (H.);
 w. Gr. Wangen (Etti), Eisenharzer Wald (Fleischer), Eriskirch,
 Langenargen, Immenreute, Emmelhofen, Eggenreute, Isny (Kirchner
 und Eichler).

Tofieldia Huds.

- T. calyculata Whlbg.** Wiesen, Heiden, Moore. v⁴z³
 Hbu vom Bodensee an und Hbo verbreitet.

108. Fam. **Juncaceae Bartl.**

Juncus Tourn.

- J. Leersii Marsson.** Waldblößen, Holzschläge, lehmige Wiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- J. effusus L.** Gräben, feuchte Wiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- J. diffusus Hoppe.**
 Im ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- J. glaucus Ehrh.** Moore, Gräben. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
- J. filiformis L.** Hochmoore.
 Hbo: Im Moor zwischen Isenbretzhofen und Balshofen z³; ö. Gr.
 gemein in den Bodenseerieden (Sauter).
- J. articulatus L. = lamprocarpus Ehrh.** v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.

- J. silvaticus Reich.** Sumpfwiesen. ν^3z^5
 Hbu gemein auf allen Streuwiesen, ebenso in Hbo um Oberreitnau, Schlachters und Hergensweiler; — Hochmoor bei Biehl (Gmde. Scheffau) ca. 750 m.
- J. obtusiflorus Ehrh.** Sumpfwiesen. ν^3z^8
 Hbu: Am Wasserburger Bühel, Lindau (Prantl).
 Hbo: Oberreitnau, bei Schlachters, Wigrazbad, Röttenbacher Filz.
- (J. squarrosus L. bei Immenstadt !)**
- J. alpinus Vill.** Sumpfwiesen. ν^3z^4
 " " f. a. mit 2—4 Knäueln: Hbu: Am Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Rangierbahnhof; auf den Galgeninseln; Seeufer Alwind—Wasserburg; Hbo: Kiesplatz am Schwarzensee, tuffreiches Wiesemoor bei Harbatzhofen.
- " " β . Form mit vielen Knäueln: Hbu: Streuwiesen am Wasserburger Bühel; Hbo: Bei Hegnau, Mollenberg, bei Schalkenried.
- J. supinus Mnch.** Überschwemmte Plätze.
 Hbo: Sumpfwiesen am Schwarzensee z^2 ; w. Gr. Osterwald bei Eglöfs z^1 (Herter).
- " " var. **fluitans Link**: Hbo: Am Aschbachweiher bei Oberreitnau. z^2
 ö. Gr. Gräben des Bodenseeriedes (Custer, Bruhin).
- J. tenuis Willd.** Waldränder, Waldwege etc. ν^4z^3
 Hbu und Hbo verbreitet bis ca. 1000 m um Oberstein; im oberen Gebiet z. B. um Syrgenstein, Röttenbach, Siebers, Laimtobel etc.
- J. compressus Jacq.** Wege, Triften. ν^4z^4
 Hbu und Hbo verbreitet.
- J. Gerardi Lois.** Im ö. Gr. Bregenz (Gremli, Sauter).
- J. bufonius L.** An Wegen etc. ν^5z^4
 Hbu und Hbo gemein.

Luzula Desv.

- L. flavescens Gaud.** Hochwälder. ν^2z^3
 Hbo: Oberhalb Oberstein gegen St. Ulrich; Wald zwischen Burkartshofen und Kremlin. Im ö. Gr. Pfänder (Sauter).
- L. pilosa Willd.** Gebüsche, Wälder. ν^4z^4
 Hbu und Hbo verbreitet.
- L. angustifolia Gcke.** Waldschläge. ν^3z^3
 Hbu: Reutinsteig, Rickenbacher Tobel (Sch.).
 Hbo: Dunkelbuch, am Aschbachweiher bei Oberreitnau. ∞
- L. silvatica Gaud.** Hochwälder. ν^2z^3
 Hbo: Laubenberg bei Harbatzhofen; hohe Kugel bei Mayerhöfen, Hochwälder oberhalb Oberstein; zwischen Ellhofer Tobel und Harbatzhofen, Bramatsrette, Eistobel bei Riedholz; w. Gr. Wangen (Kirchner und Eichler).
- L. campestris DC.** Wälder, Heiden, Wiesen. ν^6z^5
 Hbu und Hbo gemein.
- L. multiflora Lej.** Holzschläge, Sumpfwiesen. ν^8z^8
 Hbu: Im Heuried, Rickenbacher Tobel, Reutin.
 Hbo: Aschbachweiher bei Oberreitnau, am Giebelweiher bei Oberrengrersweiler, zwischen Hege und Hegnau, Rohrach, Ratzenbergermoos etc.

109. Fam. **Cyperaceae Juss.**

Cyperus Tourn.

- C. flavescens L.** Wege, sumpfige Plätze. ν^3z^3
 Hbu: Klosterteiche, Heuried.

Hbo z. B. Oberreitnau (I. Kgl. H. Prinzessin Ludwig), Egghalden, Unterreitnau, Neuweiher bei Metzlers, Lampertsweller, Eggenwath, Argenthal bei Untersteig; Hochglend bei Gestraz, stellenweise an nassen Wegen um Weiler (H.); ö. Gr. Bregenz (Bruhin).

C. fuscus L.

Hbu: In einer Lehmgrube im Heuried bei Ziegelhaus. z³

Hbo: An nassen Waldwegen bei Weiler stellenweise (H.); ö. Gr. bei Bregenz (Bruhin); w. Gr. an der Argen bei Wangen (Martens).

C. longus L.

Hbu: Am südwestlichen Fufse des Heuerberges bei Lindau im Schilf von Custer 1822, Sauter 1837 gefunden (Flora, Beyblatt 1837 S. 12). — Am Rande der beiden Eisweiher der Inselbrauerei beim Bahndamme unweit des Hoyerberges zwischen Schilf. z⁴

Schoenus L.

Sch. nigricans L. Sumpfwiesen. v²z³

Hbu: Bodenseeufer zwischen Wasserburg und Reutenen (Dobel, A.), am Wasserburger Bühel, an den Klosterteichen.

Sch. ferrugineus L. Sumpfwiesen. v³z⁵

Hbu z. B. Wasserburger Bühel, Heuried, Seeufer zwischen Reutenen und Wasserburg.

Hbo: bei Hattnau, Hegnau, Riggatshofen, Thumen, Schlachters, Lattenweiler, am Schwarzensee, im Ratzenbergermoos.

Cladium Patr. Br.

C. Mariscus R. Br.

Hbu: Am Wasserburger Bühel (Rektor Kellermann). Im w. Gr. am Schleinsee bei Gattnau (Herter); ö. Gr. selten bei Bregenz (Bruhin u. a.).

Rhynchospora Vahl.

R. alba Vahl. Moore, Sumpfwiesen. v⁴z⁵

Hbu und Hbo verbreitet, besonders Hochmoore; Hbu z. B. Klosterteiche, Wasserburgerbühel; Hbo: Schlachters, Sauters, Hummertsweiler, Unterreitnau, Thumen, Degermoos, Schwarzensee, Ratzenbergermoos, zwischen Sigmanns und Engelitz, Röthenbacherföhl, Hagspiel, Isenbretzhofen etc.

R. fusca R. et Sch. Moore. v³z⁴

Hbu: Moor bei Enzisweiler gegen Schachen, am Wasserburger Bühel. Hbo: bei Sauters (Sch.), Sumpf zwischen Schlachters und dem Bahndamm, bei Schwarzensee, beim Halteplatz Opfenbach; ö. Gr. Ried bei Bregenz (Custer, Sauter); w. Gr. Kolbnasen bei Wangen (Kirchner und Eichler).

Heleocharis R. Br.

H. palustris R. Br. Nasse Stellen. v⁵z⁴

Hbu und Hbo verbreitet.

H. uniglumis Lk. Nasse Plätze. v⁴z⁴

Hbu und Hbo verbreitet, Hbu z. B. an der Bahn bei Unterhochsteg, im Heuried; Hbo z. B. bei Unterreitnau.

H. ovata R. Br. Nasse Stellen. v²z⁴

Im w. Gr. sehr selten auf Moorschlamm im Gründelseer Moor bei Eisenharz (Herter).

H. acicularis R. Br. Morastige Plätze. v²z⁴

Hbu: Schilfsümpfe beim Rangierbahnhof gegen die Galgeninseln; an

trocken gewordenen Stellen des kl. Sees in Äschach, am Seeufer bei Unterhochsteg.

Hbo: Am Weifensberger Weiher, am Waldteich bei Schlachters. w. Gr. am Rande eines Weihers bei Eglofs (Herter), bei Wangen (Kirchner und Eichler).

Scirpus Tourn.

- S. caespitosus L.** Hochmoore. v³z⁴
 Hbu: Am Heuerberg (Sauter) †?, am Wasserburger Bühel.
 Hbo: im Degermoos (Dobel, A.), im Ratzenbergermoos, im Röthenbacherfilz, im Moor bei Hagspiel.
- S. pauciflorus Lightf.** Nasse Stellen in Mooren. v²z⁴
 Hbu: Am Quellenhäuschen im Heuried neben der Rickenbacherstrafse z⁴, am Wasserburger Bühel.
 Hbo: Sumpfwiesen zwischen Schlachters und Zeisertsweiler, am Schwarzensee; ö. Gr. zwischen Lochau und Unterhochsteg. Im w. Gr. bei Wangen und spärlich auf Sumpfboden bei Eglofs (Herter).
- S. setaceus L.**
 Hbu: Heimesreutin (Rektor Hook).
 Hbo: an der Quelle in Weihers auf Lehmboden. v¹z³. w. Gr. Wangen (Kirchner und Eichler); ö. Gr. am Bodensee bei Bregenz (Dobel).
- [**S. mucronatus L.** Im ö. Gr. Bodenseeriede (Sauter, Custer, Rehsteiner).]
- S. lacustris L.** Teiche, Tümpel etc. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
- S. Tabernaemontani Gmel.**
 Im ö. Gr. Riede um Bregenz (Custer, Sauter, Rehsteiner).
- S. Duvalii Hoppe.**
 Im ö. Gr. Bodenseeriede. z⁴
- S. triquetus L. = Pollichii Godr. et Gren.**
 Im ö. Gr. Seeried bei Lauterach (Sauter).
- S. pungens Vahl.**
- S. maritimus L.**
 Im ö. Gr. Rhein bei Höchst (Sauter); w. Gr. bei Wangen (Martens), am Bodensee im O.-Amt Tettnang (Kirchner und Eichler).
- S. silvaticus L.** Auen etc. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet, auch um Weiler häufig (H.).
- S. radicans Schk.**
 Im ö. Gr. gemein bei Bregenz (Sauter).
- S. compressus Pers.** Waldwege, Sumpfwiesen. v³z³
 Hbu: Heuried bei Mozach (Sch.), Hangnach.
 Hbo: Leiblachabhänge bei Stockenweiler, Unterreitnau, Litzis bei Opfenbach, Wald zwischen Weihers und Ellgassen; ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter); w. Gr. Eisenharz, Eglofs (Herter).

Eriophorum L.

- E. alpinum L.** Moore. v⁴z⁵
 Hbu und Hbo sehr häufig auf allen Streuwiesen und Mooren.
- E. vaginatum L.** Hochmoore. v³z⁴
 Hbo: Degermoos, Moos bei Sigmanns, Röthenbacherfilz, Ratzenbergermoos, bei Hagspiel, bei Isenbretzhofen etc.
- E. angustifolium Roth.** Sumpfwiesen. v⁴z³
 Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Hbu: Heuried; Hbo: Weihers, Degermoos, Schwarzensee etc.

- E. latifolium Hoppe.** Sumpfwiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Station Schlachters, Gmündmühle, Hattnau, Rohrach, Weiher.
- E. gracile Koch.** Sümpfe. v²z³
 Hbu: Im Heuried bei Ziegelhaus in einer alten Lehmgrube. z⁴
 Hbo: Im Sumpf zwischen Schlachters und Zeisertsweiler, Degermoos (Dobel). Im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter).
- Carex Mich.**
- C. dioica L.¹⁾** Sümpfe. v²z³
 Hbo: Im Ratzenbergermoos gegen Lindenberg, bei Itzlings, am Schwarzensee, bei Scheidegg, gegen Börserscheidegg; w. Gr. Isny, Eisenharz (Herter).
 var. **Metteniana Lehm.** ö. Gr. Bregenz (Sauter 1837).
- C. Davalliana Sm.** Feuchte Wiesen. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
 var. **Sieberiana Opiz (f. androgyna).** Hbo: An der Quelle in Weiher. z³
- C. pulicaris L.** Quellige Wiesen. v²z³
 Hbo: Abhang von Manzen gegen die Hammermühle, feuchte Wiesen oberhalb Biesenberg bei der Station Harbatzhofen in einem Wiesenmoor; w. Gr. Harprechtser Moor im Eisenharzer Wald (Herter).
- C. pauciflora Lightf.**
 Hbo: Zwischen Sphagnum im Ratzenbergermoos, Degermoos (Dobel) z²
 w. Gr. Rotes Moos bei Isny (Fleischer).
- C. microglochin Wahnbg.**
 Im w. Gr. bei Isny (Garcke).
- C. cyperoides L.**
 Hbo: Wolfgangswaiher bei Wangen (Etti).
 Im w. Gr. Eglofs neben einem Weiher 1883—1885 (Herter), bei Wangen (Klein bei Sendtner).
- C. disticha Huds.** Moore, feuchte Wiesen. v³z⁴
 Hbu: Am Bodensee bei Villa Leuchtenberg z⁶, im Heuried, am Wasserburger Bühel.
 Hbo: Im Dunkelbuch, bei Hattnau, an der Strasse zwischen Schinau und Harbatzhofen, Straßengraben bei Hagspiel; ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- C. vulpina L.** Feuchte Wälder.
 Hbu: Oberhalb Mozach, um Rickenbach.
 var. **nemorosa Rebentisch.** Hbu: Am Waldrand zwischen Rickenbacher Tobel und Hangnach in einem Graben z²; im ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- C. muricata L.** Wiesen, Abhänge. v³z³
 Hbu verbreitet: Schachen, Äschach, Reutin.
 Hbo: Taubenberg.
- C. virens Lmk. = divulsa Good.** Wege. v²z³
 Hbu: An den Lagerhäusern in Lindau 2 Stöcke; in Äschach am Abhang an der „Lerche“; in Schachen bei Villa Sautter kurz vor der Kapelle am Straßengraben (bestätigt durch Prof. Dr. Vollmann).
- C. teretiuscula Good.** Moore. v²z⁴
 Hbu: Im Wasserburger Bühel.

1) *Carex Gaudiniana* Guthn. im ö. Gr. auf Sumpfwiesen am Siechensteig ist nur eine Monstrosität nach Prof. Gottfr. Richen l. c. (cfr. Hausmann p. 1500 und Sendtner, Vegetationsverhältnisse Südbayerns 1851 p. 237); hieher auch *Vignea grypus* von Sauter in Rehb. Flora Germ. excursor. ausgegeben (cfr. Exemplare im Herbar Schnabl) und wohl auch *C. microstachya* Ehrh. „bei Bregenz“ (Hallier-Schlechtendal, Deutschlands Flora, 5. Aufl. Bd. 6 S. 36).

- Hbo: Am Schwarzensee z⁴, auf einer Sumpfwiese zwischen Wigraz und Hergaz; bei Scheidegg gegen Börserscheidegg.
- C. paniculata** L. Gräben, Moore. v⁴z³
Hbu z. B. Klosterteiche.
Hbo z. B. Weifensberger Weiher, bei Zeisertsweiler, Ratzenbergermoos, Ellhofer Tobel, bei Scheidegg gegen Börserscheidegg; in einer Schlucht am Laubenberg, Iberg bei Riedholz.
- C. paradoxa** Willd. Moore, feuchte Wiesen. v³z³
Hbu verbreitet: Ziegelhaus (Dobel), Heuried, Klosterteiche, Wasserburger Bühel.
Hbo: Schwarzensee.
- C. brizoides** Lang. Wälder, Abhänge. v⁴z⁵
Hbu und Hbo in Wäldern verbreitet; an trockenen Abhängen und Wegrändern, in Hbu: Äschach; im ö. Gr. bei Bregenz selten! (Bruhin).
- C. remota** L. Nasse Stellen in Wäldern. v⁴z⁴
In Hbu und Hbo ebenso häufig als vorige.
- C. axillaris** Good.
ö. Gr. rechte Au oberhalb Kennelbach (Sauter 1837).
- C. echinata** Murr. Moore, Gräben. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Zeisertsweiler, Degermoos, Ratzenbergermoos, Röthenbacherfilz u. s. w.
- C. leporina** L. Sumpfwiesen und Wälder. v³z³
Hbu: Zwischen Hegnau und Hochsträfs.
Hbo: Bei Hergensweiler, Degermoos (Sch.), Wigrazbad, Wald zwischen Weiher und Ellgassen, Litzis bei Opfenbach.
- C. elongata** L. Moore. v²z²
Hbo: Neuweiher bei Schwätzen (an der w. Gr.), Degermoos Ratzenberger Moos. Im ö. Gr. Bregenz.
- C. heleonastes** Ehrh. Hochmoore. v³z²
Hbo: Im Ratzenbergermoos zwischen Sphagnum; im Degermoos auf Sphagnum (Sch.).
- C. canescens** L. Moore, Sumpfwiesen. v³z³
Hbo: Degermoos, Wigrazbad, Schwarzensee, Ratzenbergermoos.
" " var. **vitifis** Fr. ö. Gr. Bregenz selten (Sauter).
- C. stricta** Good. Sümpfe, Teichränder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Heuried, Sümpfe am Rangierbahnhof, Wasserburger Bühel, bei Weiler (H.).
- C. Goodenoughii** Gay. Sümpfe, Holzschläge, Triften. v⁵z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- C. acuta** L. Ufer, Gräben, Sümpfe. v⁴z⁴
Hbu z. B. Heuried, Sümpfe an der Bahn in Unterhochsteg, am kl. See in Äschach.
Hbu z. B. am Schwarzensee.
" " var. **amblylepis** Peterm. Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg.
- C. limosa** L. Hochmoore. v²z³
Hbo: Streuwiesen zwischen Schlachters und der Bahn; am Schwarzensee, im Ratzenbergermoos. Im w. Gr. Kammerweiher bei Hiltensweiler, Eisenharzer Wald (Fleischer).
- C. pilulifera** L. Waldschläge. v³z³
Hbu: Oberhalb Rickenbach, zwischen Hege und Hegnau.
Hbo: Bei Station Schlachters, bei Oberreitnau, im Ratzenbergermoos. ö. Gr. Bregenz.

- C. tomentosa L.** Waldränder, Sumpfwiesen. v^2z^4
Hbu: Zechwald, Ziegelhaus bei Lindau (Dobel), im Heuried häufig, bei Villa Leuchtenberg gegen den Bodensee, um Wasserburg häufig (Sch.); ö. Gr. Bregenz-Mehrerau (Bruhin).
- C. montana L.** Bergwiesen, Abhänge. v^3z^3
Hbu: Rickenbacher Tobel.
Hbo: Leiblachabhänge bei Steckenweiler, im Rohrachtobel z^4 ; im oberen Gebiet an sonnigen Abhängen verbreitet.
- C. ericetorum Poll.** Heiden. v^2z^2
Hbu: Unter Kiefern im Zechwald.
Hbo: Am Kiesplatz bei Schwarzensee; um Weiler häufig (H.).
- C. verna Vill.** Trockene Plätze. v^6z^4
In Hbu und Hbo verbreitet.
- C. humilis Leyss.** Im ö. Gr. Bregenz (Döll bei Höfle).
- C. digitata L.** Wälder. v^4z^4
Hbu und Hbo verbreitet.
- C. ornithopoda Willd.** An Mauern, Waldblößen. v^4z^3
Hbu z. B. Schloßmauern von Alwind, oberhalb des Rickenbacher Tobels, Seeufer bei Nonnenhorn etc.
Hbo: Leiblachabhänge bei Stockenweiler, Kiesplatz am Schwarzensee, Eistobel bei Riedholz, bei Weiler (H.).
- C. alba Scop.** Waldschläge, Abhänge etc. v^4z^4
Hbu z. B. Zechwald, Rickenbacher Tobel, Seeufer bei Alwind.
Hbo z. B. Leiblach bei Stockenweiler, Sigmarszell, Rohrach, Argenthal bei Untersteig etc.
- C. pilosa Scop.** Laubwälder. v^2z^4
Hbo: Im Dunkelbuch (Sch., A.), Wald zwischen Schlachters und Eggenwath; im unteren Rohrachtobel, ö. Gr. Bregenz (Sauter).
- C. panicea L.** Auen, Moore etc. v^4z^4
Hbu und Hbo verbreitet.
- ” ” var. **mit pechschwarzen Schläuchen.** Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg.
- C. glauca Scop.** Abhänge, Auen. v^4z^4
” ” f. **androgyna.** Hbu im Rohrachtobel. (Alle Ährchen oben männlich, unten weiblich.)
- C. pendula Huds.** Waldschluchten. v^4z^4
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Hbu: Tobel am Schönbühel, bei Mozach, Hangnach; Hbo: Rickenbacher und Bösenreutiner Tobel, Rohrach, Nadenberg, Laintobel, im Argenthal, Hochglend bei Gestraz, Iberg bei Riedholz, Au bei Grünenbach (Georg Meyer) etc.
- C. pallescens L.** Wälder, Moorränder. v^4z^3
Hbu und Hbo verbreitet; z. B. Hbu: Heuried, Hbo: Quelle in Weiher etc.
- C. flava L.** Moore, Auen etc. v^5z^4
Hbu und Hbo verbreitet.
- ” ” f. **elatioer Anders.** Hbu: Klosterteiche.
- ” ” var. **Oederi Ehrh.** v^2z^4 Hbu: Am Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Wasserburg, Galgeninseln, Klosterteiche z^3 (Sch.), am Wasserburger Bühel. Hbo: Neuweiher bei Metzlers.
- ” ” f. **polystachya.** Hbu: Am Wasserburger Bühel. z^3
- ” ” f. **basigyna** (unteres Ährchen grundständig). Hbu: Am Wasserburger Bühel.
- C. distans L.** Moore, Ufer. v^2z^4
Hbu: Heuried z^4 , am Seeufer bei Alwind.

- C. Hornschuchlana Hoppe. Moore.** v³z³
Hbu: Heuried, an den Klosterteichen.
Hbo: Bei Oberreitnau, zwischen Unterreitnau und Hummertweiler,
bei Wigratzbad, zwischen Manzen und Hammermühle.
" " **f. longebracteata Neilr.** (Fl. v. N.-Ö. 119.) Hbu: Hummertweiler.
- C. Hornschuchiana × flava = fulva Koch.**
ö. Gr. Bregenz, Custer, Sauter); w. Gr. bei Isny (Fleischer).
- C. silvatica Huds.** Wälder. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- C. Pseudo-Cyperus L.**
Im ö. Gr. Bodenseeried bei Bregenz (Sauter).
- C. rostrata With.** Teichränder, Moore etc. v⁴z⁴
Hbu: Seeufer bei Villa Leuchtenberg etc.
Hbo z. B. Weissensberger Weiher, bei Volklings, Zeisertsweiler,
Neuweiher bei Oberholz, Waldteich bei Schlachters, Ratzenberger-
moos.
- C. vesicaria L.** Moore, Ufer. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Moor bei Sauters, Streuwiese bei
Zeisertsweiler, Gräben um Mitten, Waldteich bei Schlachters,
Ratzenbergermoos etc.
- C. acutiformis Ehrh. (paludosa Good).** Waldsümpfe, Teichränder etc. v⁴z³
Hbu z. B. Heuried, Sümpfe an der Bahn in Unterhochsteg, Dunkelbuch.
Hbo z. B. Leiblachauen b. Stockenweiler, Waldsümpfe a. Schwarzensee.
" " var. **Kochiana DC. = spadicea Rth.** Hbu: Neben dem Eisweiher
im Rickenbacher Tobel hinter der Milchfabrik. z²
- C. riparia Curt.** Ufer, Gräben. v²z²
Hbu: Lindau (Dobel), an Gräben und an der Ach in Hundweiler;
Eisweiher am Fusse des Hoyerberges.
- C. filiformis L.** Hochmoore. v²z³
Hbu: Am Wasserburger Bühel.
Hbo: Am Schwarzensee, im Ratzenbergermoos, Moos bei Sigmanns.
- C. hirta L.** An Moorrändern, Wiesen, Wegen. v⁴z³
Hbu und Hbo verbreitet.
" " var. **hirtiformis Pers.** Hbu: Dunkelbuch.

110. Fam. **Gramineae Juss.**

Zea L.

c **Z. Mays.** In Hbu.

Andropogon L.

A. ischaemum L.

w. Gr. bei Wangen (Etti).

Panicum L.

- P. sanguinale L.** Schutt, Bahndämme. v²z⁴
Hbu: Verbreitet an Bahndämmen, in Gärten etc., z. B. in Aschach,
Holdereggen, Reutin, am Rangierbahnhof, am Bahnhof Mitten.
Hbo: Schutt in Oberreitnau; scheint im Amtsbezirke Weiler zu
fehlen (H.).
- P. lineare Krocker.** Bahndämme. v¹z²
Hbu: Lindau (Dobel), am Rangierbahnhof.
Hbo: Vor der Kronenwirtschaft in Weiler z⁴ (H.), bei Lindenberg
bei 910 m (Zwiesler im 23. J.-B. des naturhist. V. f. Schw. u. N.).

P. miliaceum L. Schutt, Kompost. v²z³
 Hbu: Rangierbahnhof, Bahnhofrayon Lindau, am Bahnhof Enzisweiler.
 Hbo: Auf Schutt zwischen Lindenberg und Ratzenberg.

P. Crus galli L. Äcker, Gärten. v³z⁴
 Hbu und unt. Teil von Hbo verbreitet; im ob. Teil nicht notiert,
 jedoch Oberstaufen (H.).

Setaria P. B.

S. viridis P. B. Felder, Gärten. v⁴z³
 In Hbu und unt. Teil von Hbo verbreitet.

S. glauca P. B. Bahndämme. v⁸z³
 Hbu: Lindau—Hoyern und Lindau—Nonnenhorn, sowie am Rangier-
 bahnhof gemein, auch am Seeufer.
 In Hbo: Station Oberreitnau, Bahndam Hergaz—Wangen.

Phalaris L.

Ph. arundinacea L. Gräben, Ufer. v⁸z³
 Hbu z. B. Reutin, Seeufer bei Unterhochsteg, am Rangierbahnhof,
 Bäche bei Ziegelhaus, bei Wasserburg etc.
 In Hbo am Weifensberger Weiher, Teich bei Schlachters,
 Schwarzensee, Feuerteich in Wohmbrechts etc.

Ph. canariensis L. Schutt, Kompost.
 Hbu: Lindau, Wasserburg, Reutin, Bahnhof Nonnenhorn, Hund-
 weiler (Sch.), Mitten.
 Hbo: Bodolz, zwischen Opfenbach und Litzis, Schutt zwischen
 Lindenberg und Ratzenberg.

Anthoxanthum L.

A. odoratum L. Wiesen. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo gemein.

Alopecurus L.

A. pratensis L. Wiesen, Ufer. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo gemein; ö. Gr. bei Bregenz selten! (Sauter).

A. agrestis L. v²z²
 Hbu: Auf Ackern um Lindau (Dobel); auf Schutt im Bahnhof-
 rayon Lindau; am Bahnhof Nonnenhorn; ö. Gr. selten bei Bre-
 genz (Sauter).

A. geniculatus L. Gräben.
 Hbo: Strafe von Weifensberg nach Schlachters links am Strafsen-
 graben (Sch.); ö. Gr. Bregenz (Dobel).

A. fulvus Sm. Gräben, Teiche. v²z³
 Hbu: Im Bach beim Köchlin, Sümpfe an der Bahn in Unterhoch-
 steg, Bäche bei Ziegelhaus, Seeufer bei Villa Leuchtenberg, am
 kl. See in Aschach; ö. Gr. Bregenz (Sauter nach Dobel).

Phleum L.

Phl. pratense L. Wiesen, Acker, Raine. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.

„ „ **f. viviparum.** Hbo auf einer Wiese zwischen Heimholz und Wildberg.

Oryza Tourn.

O. clandestina A. Br. Ufer, Gräben, Moore v³z³ in der f. milusa.
 Hbu: Klosterteiche (Sch.), Bach in Reutin, bei der Lorenzmühle.
 Hbo: Gräben in Witzigmänn, zwischen Bruggach und Unterreitnau,
 Weissensberger Weiher, Giebelweiher (Sch.), Feuerteich in Mollen-

berg, zwischen Mapprechts und Mekatz, Moos bei Bleichen unweit Wohmbrechts, Degelmoos (Kirchner und Eichler); w. Gr. Niederwangen, Hammerweiher (Kirchner und Eichler); ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Agrostis L.

- A. vulgaris With.** Grasplätze. v^8z^8
 Hbu: Holdereggen am Bahndamm, Klosterteiche, Heuried. ∞
 Hbo: Mollenberg, Waldwiesen bei Mothen, im Rohrach.
- A. alba L.** Wiesen, Raine, Wälder. v^6z^5
 Hbu und Hbo gemein.
 " " var. **coarctata Hoffm.** Rispe schmal, lineallänglich, Stengelblätter schmal. Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg.
 " " var. **gigantea Gaud.** Hbu: Streuwiesen am Schwesternberg bei Villa Ehrlich. z^8
 " " var. **stolonifera E. Meyer.** v^4z^4 Hbu und Hbo verbreitet.
 " " f. **vivipara.** Im w. Gr. am Bodenseeufer bei Langenargen (Kirchner und Eichler).
- A. canina L.**
 In Hbo: An der Bahn Auers—Röthenbach im Walde z^8 ; um Weiler nicht selten, z. B. häufig am sumpfigen Waldweg Weiler—Manzen (H.); ö. Gr. Bodenseeried (Custer); w. Gr. Hirschlatt bei Tettngang (Kirchner).

Apera Adans.

- A. Spica venti P. B.** Getreidefelder etc. v^2z^8
 Hbu: Getreidefelder in Nonnenhorn, am Bahndamm Nonnenhorn-Wasserburg, am Bahnhof Nonnenhorn, am Ländeplatz Wasserburg, am Bahnhof Mitten.
 Hbo: Am Bahndamm bei Oberreitnau (B.); ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter).

Calamagrostis Adans.

- C. lanceolata Roth.** Hbo: Ratzenberger Moos. z^2
- C. epigejos Rth.** Kiesplätze, Wälder. v^8z^8
 Hbu: Leiblach bei Unterhochsteg.
 Hbo: Zwischen Bodolz und Hoyerberg, an der Ach oberhalb Oberreitnau, im Dunkelbuch, bei Oberrengrersweiler, Neuweiher bei Metzlers, am Nadenberg, Kiesplatz am Schwarzensee.
 " " var. **glauca Rchb.** Hbo: Rohrachtobel.
- C. litorea DC.** Ufer, Kiesplätze. v^2z^8
 Hbu: Leiblachufer bei Unterhochsteg.
 Hbo: Leiblachauen bei Hubers, Natterersäge an der Leiblach, Abhänge bei Gmüdmühle, Kiesplätze bei Station Röthenbach; w. Gr. Bregenzer Ach (Sauter).
 " " var. **pallida = C. Gaudiniana Rchb.** Hbu: Im Zechwald bei Unterhochsteg.
- C. varia Lk.** Bergabhänge. v^2z^8
 Hbo: Rohrachtobel, an der Strafe im Rohrach, am Nadenberg, Sandsteinwände bei Neuhaus, Eistobel bei Ebratzhofen, Börserscheidegg, Laubenberg bei Harbatzhofen, Iberg bei Riedholz.
 " " var. **acutiflora DC.** Im ö. Gr. bei Bregenz nicht selten (Sauter).
- C. arundinacea Roth.**
 Hbo: Nagelfluhwände im Schüttentobel bei Hoheneck (Gmde. Ebratzhofen). z^8

Millium L.

- M. effusum L.** Wälder. v⁴z⁸
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. an Zäunen in Ziegelhaus, im Buchenwald, am Wasserburger Bühel etc.

Lasiagrostis Lk.

- L. Calamagrostis Lk.** Kiesige Plätze. v⁴z¹
Hbu: Am Kiesplatz bei Station Röthenbach rechts neben der Strafse von Oberhäuser nach Ellhofen.

Phragmites Trin.

- Ph. communis Trin.** Sümpfe, Altwasser. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.

Sesleria Scop.

- S. coerulea Ard.**
Hbo: Abhänge im Rohrachetobel z²; im ö. Gr. an der Ruggburg und Kies der Bregenzer Ache; im Gerbertobel bei Weiler.

Koeleria Pers.

- K. cristata Pers.**
Im ö. Gr. an der Bregenzer Ache.

Aira L.

- A. caespitosa L.** Wiesen, Wälder, Ufer. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
A. (Deschampina) littoralis Reut. (cat. gener. 236).¹⁾ Hbu: Am Bodenseeufer zwischen Unterhochsteg und Ziegelhaus; auf den Galgeninseln beim Rangierbahnhof; bei Wasserburg am Ufer. v²z³, auch als f. vivipara.
A. flexuosus L.
ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Holcus L.

- H. lanatus L.** Wiesen, Moore. v⁵z⁵
Hbu und Hbo verbreitet.
H. mollis L. Waldschläge, Heiden. v³z³
Hbu: Lindau (Dobel).

Arrhenaterum P. B.

- A. elatius M. et K.** Wiesen. v⁵z⁵
Hbu und Hbo verbreitet.
" " var. **bulbosum Schldl.** Im ö. Gr. Mehrerau (Bruhin).

Avena Tourn.

- A. fatua L.** Schutt. v²z²
Hbu: Im Bahnhofrayon Lindau (A., Sch.).
Hbo: Zwischen Lindenberg und Ratzenberg auf Schutt.
A. pubescens Huds. Wiesen. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.

Sieglingia Bernh.

- S. decumbens Bernh.** Heiden, Waldwiesen. v³z³
Hbo: Waldschläge bei Sigmarszell, Bahndamm in Hergensweiler,

1) Cf. Haufsknecht, Mitteilungen des Thüringischen botanischen Vereins, Neue Folge, VI. Heft 1894: „am sandigen Bodenseeufer bei Lindau; durch die steifen, gedrungenen, kurzen Halme, gröfsere Blüten, sowie durch die kurzen, steifen, zusammengerollten, fast stehenden Blätter sehr auffallende Pflanze. Meist vivipar!“

bei Station Schlachters, am Neuweiher bei Metzlers, auf einer Moorwiese bei Mywiler, am Laubenberg, Wald zwischen Weiher und Ellgassen; ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter); w. Gr. Eisenharz, Kifslegg (Herter).

Melica L.

- M. nutans L.** Gebüsch, Wälder. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- M. uniflora Retz.**
Hbu: Lindau (Dobel); im ö. Gr. selten bei Bregenz (Sauter), fehlt im Vorarlberg sonst!

Briza L.

- B. media L.** Wiesen, Heiden. v⁵z⁴
Hbu und Hbo verbreitet.
- sp **B. maxima L.**
Hbu: Auf dem Dache eines Waschhauses in der Burggasse in Lindau z² (A., B.).

Eragrostis Host.

- E. minor Host.** Bahndämme. v²z⁴
Hbu: An den Bahndämmen Lindau bis Hoyern, in Äschach und am Rangierbahnhof.

Poa L.

- P. annua L.** Überall. v⁵z⁵
- P. bulbosa L.** Kiesige Plätze. v¹z²
Hbu: Auf Kies am Rangierbahnhof Lindau; ö. Gr. bei Bregenz.
- P. alpina L.** Steinige Plätze. v²z²
Hbu: Am Bodenseeufer von Unterhochsteg bis Lindau; Galgeninseln beim Rangierbahnhof, Bodenseeufer bei Wasserburg; hier überall meist form. vivipara.
Hbo: Auf tertiärer Nagelfluh im Eistobel bei Riedholz; w. Gr. als f. vivipara an der Argen bei Wangen (Kirchner).
" " var. **minor Koch.** ö. Gr. Bregenzer Achgries (Sauter).
" " var. **brevifolia Gaud.** Bei Bregenz (Custer, Sauter).
- P. nemoralis L.** Büsche, Abhänge. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet. Hbu z. B. am Eisenbahnseedamm; am Bahnhof Mitten etc.; Hbo: am Ringoldsberg, am Eistobel bei Riedholz, auf Nagelfluh an der Argen bei Malaichen, Weiler (H.) etc.
- P. serotina Ehrh.** Sumpfwiesen. v²z³
Hbu: Bei Villa Ehrlich am Schwesternberg, im Heuried, Schilfsümpfe am Rangierbahnhof.
- P. trivialis L.** Feuchte Wiesen, Wälder etc. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
- P. pratensis L.** Wiesen, Wälder. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.
" " var. **spiculis albis** (Ährchenstiele, Deckblätter und Spelzen schneeweiss) in Hbu: Zaun der Villa Ehrlich am Schwesternberg. z²
- P. cenisia All.**
ö. Gr. Kies der Bregenzer Ache (Sauter).
- P. compressa L.** Trockene Plätze. v³z³
Hbu: Bodenseeufer bei Nonnenhorn, Wasserburg, Unterhochsteg; bei Schloß Alwind, am Rangierbahnhof, am Bahnhof Lindau.

Glyceria R. Br.

- G. aquatica** Whlbg. = **spectabilis** M. et K. Gräben. v²z⁴
 Hbu: An allen Gräben um Äschach, Reutin, Ziegelhaus, Wasserburg und am Rangierbahnhof.
G. fluitans R. Br. Gräben, Tümpel. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
G. plicata Fries. Gräben. v⁸z³
 Zusammen mit *G. fluitans* und in Übergängen zu derselben, z. B. Hbu in Reutin; Hbo Oberrenegersweiler, Quelle in Weiher, Gräben in Hagspiel bei Scheidegg etc. Im ö. Gr. Bregenz (Löwenberg).

Catabrosa P. B.

- C. aquatica** P. B. Ufer, Gräben. v²z⁴
 Hbu: Nasse Stellen am kl. See in Äschach, am Rangierbahnhof und bei Villa Amsee.
 Hbo: Gräben in Grünenbach.
 „ „ var. **minima** Custer. Bregenz (nicht fingerlang, Ahrchen einblütig).

Molinia Mnch.

- M. coerulea** Mnch. Moore, Wiesen. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
 „ „ var. **arundinacea** Schrk. v⁸z⁴ Z. B. in Hbu: Streuwiesen um Wasserburg und am Wasserburger Bühel etc., in Hbo auch in feuchten Wäldern.

Dactylis L.

- D. glomerata** L. Wiesen. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein. f. *vivipara* in Hbu bei Lindau 1mal gefunden („Bollenschmehele“).

Cynosurus L.

- C. cristatus** L. Wiesen, Waldränder. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet. f. *vivipara* in Hbu bei Nonnenhorn (B.).

Festuca L.

- F. ovina** L. Wiesen, Moore etc. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo gemein.
F. sulcata var. **valesiaca** Schleich.
 Im ö. Gr. Achufer bei Bregenz (Sauter).
F. heterophylla Lam. Wiesen, Wälder, Auen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Zechwald, an Zäunen, in Rickenbach, in Äschach, am Rangierbahnhof etc.
F. rubra L. Wälder, Heiden.
 Verbreitung unbekannt. Hbo: Waldwiesen bei Station Schlachters; bei Weiler (H.). Im ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter).
F. silvatica Vill. Bergwälder. v¹z²
 Hbo: In Buchenwäldern am Iberg bei Riedholz in ca. 900 m. Im ö. Gr. Waldschluchten am Pfänder.
F. gigantea Vill. Wälder, Hecken. v¹z⁴
 Meist als var. *triflora* Flor. Danic. in Hbu und Hbo verbreitet.
F. arundinacea Schreb. Auen, Ufer. v³z³
 Hbu: Leiblachauen Hangnach bis zur Mündung, Seeufer bei Unterhochsteg, Sumpfwiesen am Klosterteich, am Ufer des Kuehlinweiher (Sch.), Gräben an der Bleiche (Sch.), am Achufer in Hundweiler (Sch.).
 Hbo: Leiblachauen von Stockenweiler bis zur Hangnach; Argenuen bei Staudach, bei Weiler (H.).

- F. elatior L.** Wiesen. v⁵z⁵
 Hbu und Hbo verbreitet.
F. pseudololiacea Fr.
 Hbu im Heuried einzeln; Hbo bei Weiler einzeln. Bregenz—Lindau
 (Bruhin im Herbar Bregenz, Sauter).

Brachypodium P. B.

- B. silvaticum R. et Schult.** Wälder, Auen, Wiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
B. pinnatum P. B. Trockene Wiesen. v⁴z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
 „ „ var. **caespitosum R. et Sch.** ö. Gr. am Hacken bei Bregenz (Sauter).

Bromus L.

- B. secalinus L.** Felder. v⁴z⁴
 Stammform z. B. Wegränder bei Bahnhof Enzisweiler, am Bahnhof Nonnenhorn.
 „ „ var. **velutinus Schrad.** Hbu. Am „toten Weg“ in Äschach, in Oberreutin im Getreide, ebenso zwischen Hangnach und Rickenbach, bei Mozach. Hbo: Oberhalb Lindenbergl bei Schreckenmanklitz.
B. racemosus L. Wegränder. v³z²
 Hbu: Lindau (Dobel), am Wasserburger Bühel.
 sp. in Hbo: am Bahnhof Harbatzhofen. Im ö. Gr. bei Bregenz nicht selten (Sauter, Custer).
B. commutatus Schrader. v³z³
 Hbu: Bahndämme bei Holdereggen und am Wasserburger Bühel, Bahnhof Lindau, Rangierbahnhof.
 Hbo: Bahnhof Schlachters; ö. Gr. Bregenz (Milz).
B. mollis L. Wiesen, Felder, Wege. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
 „ „ var. **glabratus Döll.** (Spelzen kahl). Hbu: Dach des Waschhauses in der Burggasse, H.-Nr. 85 A, zu Lindau. z²
B. arvensis L. Bahndämme. v²z³
 Hbu: Am Rangierbahnhof, am Bahndamm in Holdereggen in Reutin.
 Hbo: Am Bahndamm bei Schlachters.
B. asper Murr. Wälder. v²z³
 Hbu: Im Rickenbachertobel hinter der Milchfabrik.
 Hbo: Im Rohrachtobel.
B. erectus² Huds. Trockene Wiesen. v³z³
 Hbu: Am Seeufer verbreitet, z. B. Unterhochsteg, bei Wasserburg; im Heuried, Leiblachauen in der Hangnach und bei Oberhochsteg; Seedämme in Äschach, bei Villa Lindenhof.
 Hbo: Bei Eggetsweiler und Dürren.
B. sterilis L. Wegränder, Gebüsche etc. v²z⁴
 Hbu: An Zäunen, in Äschach, Reutin, Wasserburg, Eisenbahndämme Lindau—Rangierbahnhof; ö. Gr. Bregenz gemein (Sauter).
B. tectorum L. Bahndämme. v²z⁴
 Hbu: Am Rangierbahnhof Lindau und an den Bahndämmen Lindau—Äschach—Hoyern und in Reutin; ö. Gr. Bregenz (Sauter).

Triticum Tourn.

- T. vulgare Vill. und T. Spelta L.** —
T. repens L. Felder, Wege. v⁵z⁴
 „ „ var. **Leersianum Schreb.** Hbo: Bei Station Schlachters. z²
 „ „ var. **glaucum Host.** Hbu: An Mauern in Mitten. z³
 „ „ var. **Vaillantianum Schreb.** Hbo: Bei Weiler (H.).

- T. glaucum Desf.** Bodenseeufer. v⁴z⁴
Hbu: Zwischen Reutenen und Wasserburg, Seeufer bei Wasserburg an trockenen Stellen (Dobel).
- T. caninum L.** Gebüsche, Auen. v³z³
Hbu und Hbo: Leiblachauen von Sigmarszell bis zur Mündung.
Hbo: An der oberen Argen bei Ebratzhofen.

Elymus L.

- E. europaeus L.** Hochwälder. v¹z²
Hbo: An der hohen Kugel oberhalb Riedholz bei ca. 900 m mit *Festuca silvatica*. Im w. Gr. Osterwald bei Eglofs (Herter).

Secale Tourn.

- c **S. cereale L.** —

Hordeum Tourn.

- c **H. vulgare L.** —

- H. murinum L.** Wege, Mauern. v²z³
Hbu: An den Lagerhäusern in Lindau, an Mauern in Wasserburg, [Lindau: (Sauter)], an den Bahngeleisen in Lindau (Sch.). (Im Vorarlberg nur bei Feldkirch!).

Lolium L.

- L. perenne L.** Wiesen, Heiden, Wege. v⁵z⁵
" " var. **ramosum M. et K.** Hbo: Bei Weiler gegen Bremenried. z¹
- L. multiflorum Lmk.** Wiesen. v⁴z⁴
Hbu sehr verbreitet, auch Hbo auf Grasplätzen, meist kultiviert.
- L. temulentum L.**
sp Hbu: Eisenbahnseedamm Lindau, auch im Bahnhofrayon Lindau. z¹
ö. Gr. Bregenz (Sauter) in den var. β . *speciosum* und γ . *robustum* (Dobel).
- L. linicolum A. Br.**
Im ö. Gr. Bregenz (Custer).

Nardus L.

- N. stricta L.** Triften, Abhänge. v³z⁴
Hbo: Station Schlachters; im oberen Teil ziemlich verbreitet, z. B. Argenabhänge bei Handwerks, am Nadenberg, bei Oberstein, im Ratzenbergermoos, Ellhofer Tobel, bei Scheidegg, am Laubenberg; ö. Gr. Schluchten am Pfänder; w. Gr. Adelegg (Kirchner).

Gymnospermae.

111. Fam. Coniferae Juss.

Taxus Tourn.

- T. baccata L.** Waldschluchten. v³z²
Hbo: Rohrachtobel, Gerbertobel (H.), Eistobel bei Riedholz, am Nadenberg, in Waldschluchten einzeln, Grenztobel bei Scheffau (H.), Tobel am Mönchenstein (H.); w. Gr. Adelegg (Kirchner).

Juniperus Tourn.

- J. communis L.** Triften, Auen, Abhänge. v⁴z³
In Hbo von Niederstauferen aufwärts verbreitet.

Sabina Gcke.

S. officinalis Gcke.

Pinus Tourn.

- P. silvestris L.** Wälder, Moore, Heiden. v⁵z⁴
Hbu und Hbo meist verbreitet, um Weiler jedoch nicht häufig (H.).
" " var. **Pumilio Willk.** Hochmoore. v³z⁴ Hbo: Ratzenbergermoor,
Röthenbacherfilz, Moor zwischen Hagspiel und Unterstein, Hoch-
moor bei Burkartshofen, Moor zwischen Sigmanns und Engellitz,
am zahlreichsten im Trogener Moor (H.), im Degermoos (Kellermann)

Abies Tourn.

- A. alba Mill.** Wälder. v⁵z⁶
Hbu und Hbo verbreitet.

Picea Lk.

- P. excelsa Lk.** Wälder. v⁵z⁵
Hbu und Hbo gemein.

Larix Tourn.

- L. decidua Mill.** Meist kultiviert.
Hbo: In Wäldern um Weiler nicht selten (H.).

Cryptogamae.

A. Goniopterides Willd.

112. Fam. Equisetaceae DC.

Equisetum L.

- E. arvense L.** Acker, Wiesen. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
" " f. **campestre Milde.** Hbu: Zwischen den Geleisen am Rangier-
bahnhof. z¹
E. maximum Lk. Quellige Abhänge, Waldschluchten. v⁴z⁴
Hbu und Hbo verbreitet, z. B. Entenberg bei Schönau, um Reh-
lings, Schönbühel, Hangnach, Sigmarszell, Gitzenweiler, Ober-
reitnau etc., auch um Weiler verbreitet (H.).
" " var. **serotinum A. Br.** Hbo: Am Nadenberg. z²
" " f. **comosum Milde.** In Wäldern verbreitet.
E. silvaticum L. Feuchte Nadelwälder. v⁴z³
Hbu: Schönbühel oberhalb Mozach.
Hbo: Meist verbreitet, z. B. Mywiler, Litzis, Weihers, Stocken-
bühl (H.), Trogener Wald (H.), Bramatsreitte.
E. pratense Ehrh.
Im ö. Gr. am Pfänder (leg. Milz).
E. palustre L. Sumpfige Plätze. v⁵z⁴
Hbu und Hbo gemein.
" " f. **polystachyum Vill.** Hbo: Auf feuchten Waldwiesen am Nadenberg.
E. limosum L. Teiche, Ufer. v⁴z⁴
In den f. **Linnaeanum Döll.** und f. **verticillatum Döll.** in Hbu und
Hbo verbreitet, z. B. Hbu: Bodenseeufer, Klosterteiche, Wasser-

- burger Bühel, an der Bahn in Unterhochsteg, Ziegelhaus etc.; in Hbo: Weifensberger Weiher, Neuweiher bei Metzlers, bei Oberreutte (850 m), am Schwarzensee, Lindenberger Weiher etc.
- E. arvense** × **limosum** = **E. litorale** Kühlewein.
Im ö. Gr. Mehrerau (Bruhin).
- E. hiemale** L. Waldschluchten. v³z³
Nur f. **genuinum** Al. Br. beobachtet. Hbu: Bodenseeufer bei Unterhochsteg ¹⁾ Hbo: Leiblachabhänge bei Sigmarzell, Waldschluchten an der Ach bei Höhenreutin, an der Leiblach zwischen Kleyen- und Immenmühle; Rohrachtobel, Argenthal bei Gestraz, Eistobel bei Riedholz, Rothachauen (H.), Hausbachanlagen häufig (H.).
- E. variegatum** Schleich. Sandige Plätze. v²z³
" " f. **caespitosum** Doell. Hbu: Ufer des Bodensees von der Leiblachmündung bis Wasserburg zerstreut; Galgeninseln beim Rangierbahnhof; Hbo: Leiblachthal bei Stockenweiler, im Rohrachtobel.
" " f. **elatum** Rabenh. In Hbu an einem sandig-lehmigen Abhang an der Straße neben der Bahn von Altrehlings nach Rohlings. z⁴

B. Hydropterides Willd.

113. Fam. Marsiliaceae R. Br.

Pilularia L.

- [! **P. globulifera** L. Im Werdenberger Moor bei Immenstadt in einem Graben.]

C. Selagines Endl.

114. Fam. Lycopodiaceae DC.

Lycopodium L.

- L. Selago** L. Moore, Wälder. v³z³
Hbo: Degermoos (A., Sch.), Ratzenbergermoos, Wälder zwischen Oberstein und Scheidegg, Wälder zwischen Manzen und Hammermühle, Laimtobel, Moor bei Biel (Gmde. Scheffau); bei Isenbretzhofen.
- L. annotinum** L. Schattige Wälder. v³z⁴
Hbo: Goldschmidmühle, Degermoos, Leiblachthal bei Stockenweiler, Argenthal bei Syrgenstein, Ratzenbergermoos, bei Scheidegg, Wälder um Oberstein, bei Burkartshofen, Hertnegg, zwischen Schinau und Altenburg, zwischen Manzen und Hammermühle.
- L. inundatum** L. Moore. v³z⁴
Hbu: Am Wasserburger Bühel.
Hbo: Kleines Moor zwischen Rehlings und Weifensberg, Degermoos, Moos bei Sauters, am Schwarzensee, Röthenbacher Filz, Ratzenberger Moos.
- L. clavatum** L. Wälder, Moore. v³z⁴
Hbo: Oberhalb Hubers an der Leiblach, Röthenbacher Filz, zwischen Manzen und Hammermühle, bei Buchenbühl, bei Gschwend, Wald zwischen Weiher und Ellgassen etc.
- " " f. **mit 3 Sporangien**. Hbo: Zwischen Buchenbühl und Forst.

1) Uferform: aufsteigend, nicht aufrecht.

- L. complanatum L.** In f. *a. flabellatum* Döll. im w. Gr. im Eisenharzer Wald an 2 Stellen (Herter).
" " f. **B. Chamaecyparissus A. Braun.** Im w. Gr. am Gipfel des schwarzen Grates (1050 m) z² (Herter).

Selaginella Spring.

S. helvetica Spring.

Im ö. Gr. an der Bregenzer Ache; w. Gr. am schwarzen Grat 1878 (Kirchner und Eichler).

D. Filices L.

115. Fam. **Ophioglossaceae R. Br.**

Botrychium Sw.

B. Lunaria Sw.

Hbu: Am Bodenseeufer bei Unterhochsteg auf Sandboden. z². Im ö. Gr. am Hacken (Sauter); w. Gr. Wangen, Eglofs, Adelegg, schwarzer Grat (Kirchner und Eichler).

Ophioglossum L.

O. vulgatum L. Moore.

v²z⁴

Hbu: Vom Bahnwärterhäuschen aus zum Giebelbach auf Streuwiesen (Kellermann), hinter Villa Lotzbeck (Kellermann, A.), bei Villa Ehrlich z² (A.), zwischen Schachen und Enzisweiler z⁴ (A.). Im ö. Gr. am Pfänder (Zimmerl).

116. Fam. **Polypodiaceae R. Br.**

Ceterach Willd.

C. officinarum Willd.

Im ö. Gr. Bregenz an Mauern sparsam (Bruhin, Sauter) †?

Polypodium L.

P. vulgare L. An Baumstämmen, in Laubwäldern.

v³z³

Hbu: Auf Obstbäumen am Schönbühel (Sch.)

Hbo: Wälder an der Ach oberhalb Oberreitnau, im Wald zwischen Neuweiher und Lampertsweiler, Ach bei Hugelitz, Bösenreutiner Steig, am Nadenberg bei Leitzis, im Eistobel bei Riedholz.

Phegopteris Fée.

Ph. polypodioides Fée. Waldschluchten, Abhänge.

v⁴z⁴

Hbu: Rickenbacher Tobel, im Gebüsch bei Reutinsteing.

Hbo verbreitet.

Ph. Dryopteris Fée. In Waldschluchten, an Mauern.

v⁴z⁴

Hbu: Im Rickenbacher Tobel.

Hbo verbreitet.

Ph. calcarea Fée.

Hbo: Hausbachwald und Hausbachtobel bei Weiler (H.)

Aspidium R. Br.

A. Lonchitis Sw. Schattige Wälder.

v¹z²

Hbo: Einige prächtige Stöcke am Weg von Brugg nach Isnyberg (Gmde. Gestraz) (Herter).

- A. lobatum Sw.** Wälder, Waldschluchten. v⁴z³
 Hbu: Mozacher und Rickenbachertobel.
 Hbo sehr verbreitet.
 " " var. **subtripinnatum Milde.** Hbo: Argenthal bei Grünenbach.
 " " var. **auriculatum Luerssen.** Hbo: Waldschlucht zwischen Heimenkirch und Engenberg.

Polystichum Rth.

- P. Thelypteris Rth.** Moore. v³z³
 Hbu: Im Heuried bei Rickenbach, an den Klosterteichen, am Wasserburger Bühel, am Fuß des Hoierberges (Sauter), zwischen Nonnenhorn und Mitten.
 Hbo: Am Teich bei Schlachters, am Neuweiher bei Metzlers, bei Sauters am Schwarzensee, Streuwiesen bei Wohmbrechts. Im w. Gr. am Muttelsee, Röhsee, Langenargen.
P. Oreopteris DC. Wälder, Abhänge. v³z⁴
 Hbu: In der Hangnach (Sch.).
 Hbo: Wald zwischen Gitzenweiler und Oberrengersweiler; am Laubenberg, zwischen Stiefenhofen und Holzleute, an der hohen Kugel und am Iberg bei Riedholz, Wälder bei Hertnegg, um Oberstein, im Laimtobel; w. Gr. Ratzenried, Isny, schwarzer Grat (Kirchner und Eichler).
P. Filix mas Roth. Wälder. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo verbreitet.
 " " var. **subintegrum.** Z. B. Hbo: Oberstein, Hochglend bei Gestraz.
P. Filix mas × dilatatum Sw. (Asp. remotum Koch p. p.) v¹z¹
 In Hbo: Zwischen den Stammeltern im Hochwald zwischen Oberstein und Eberschwande (eingesetzt im Garten des Herrn Bezirkstierarztes Brüller in Lindau). Wedel ca. 1 m hoch, 3fach gefiedert, Fiederchen 3. Ordnung scharf stachelspitzig gezähnt.
P. cristatum Rth. Feuchte Wälder. v²z²
 Hbu: Am Schönbühel (Sündermann).
 Hbo: Westseite des Ibergs bei Riedholz. ∞ ö. Gr. bei Bregenz und Mehrerau (Luerssen, Milz, Glanz).
P. spinulosum DC. Wälder, Moore. v⁵z⁴
 Hbu und Hbo gemein.
 " " var. **dilatatum DC.** Hbo: Hochwälder bei Oberstein, Wälder zwischen Haus und dem Weiher im Ratzenbergermoos, zwischen Hertnegg und Stiefenhofen.
 " " f. **elevatum Al. Braun.** Hbo: Im Röthenbacherfilz.

Cystopteris Bernh.

- C. fragilis Bernh.** Mauern, Felsen. v³z³
 Hbu: Stadtmauern in Lindau, in Reutin.
 Hbo: Mauern in Ellhofen, an der Kirche in Lindenberg, Kirchhofmauern in Grünenbach und in Röthenbach, an Felsen an der Leiblach bei Sigmarszell, auf Nagelfuh bei Malaichen an der Argen, an der Ruine Ellhofen, bei Oberstein u. s. w.

Asplenium L.

- A. Trichomanes Huds.** Felsen, Mauern. v⁴z³
 Hbu: Stadtmauern Lindau, am Ausfluß des Bettbauer Weiher.
 Hbo verbreitet.
A. viride Huds. Waldschluchten. v³z³
 Hbo: Nagelfuhfelsen an der Leiblach unterhalb Sigmarszell, im

Dunkelbuch; Argenabhänge bei Gestraz, Nagelfluhfelsen bei Lez (Gmde. Scheidegg), an Felsen um Oberstein, im Laimtobel bei Buchenbühl, im Tobel bei Engenberg, im Eistobel und am Iberg bei Riedholz; an der Argen von Staudach bis Egloffstein.

- A. Ruta muraria L.** Mauern, Felsen (fast nur als var. *Brunfelsi* Heuffer). v^4z^3
Hbu: Stadtmauern Lindau, Ausflufs des Bettner Weiher.
Hbo z. B. Niederstaufer, Friedhofmauer in Weiler (H.), Kirchhofmauern in Lindenberg, Röthenbach, Grünenbach und Ellhofen, Eisenbahnbrücke im Ellhofer Tobel, Ruine Ellhofen u. s. w.

- A. Adiantum nigrum L.**
Im ö. Gr. westliche Pfänderabhänge (Dobel, Berchtold), am Gehardsberg (Höfle).

- A. Filix femina Bernh.** Wälder. v^4z^4
Hbu und Hbo gemein.

- „ „ var. *dentatum* Döll. In Hbo an einer Mauer in Niederstaufer. z^1

- A. alpestre Mett.**
In Hbo: Westl. Abhang des Iberges bei Riedholz in ca. 920 m Höhe z^3 ; im w. Gr. am schwarzen Grat nahe dem Gipfel (Herter).

Scolopendrium Sm.

- S. vulgare Sm.** Abhänge, Waldschluchten.
Hbo: An der Iberg-Kugel bei dem Weiler Simmerberg zahlreiche Exemplare an einem Nagelfluhfelsen (Herter). ∞ ö. Gr. in schattigen Waldschluchten auf Nagelfluh am Pfänder häufig.

Blechnum L.

- B. Spicant Roth.** Schattige Nadelwälder. v^4z^3
Hbo z. B. Moränenhügel bei Schlachters, Leiblachabhänge bei Oberrinzenbruck, Ach bei Höhenreutin, Abhänge bei Sigmarszell; bei Mywiler, Hertnegg, am Nadenberg, im Rohrach, Ellhofer Tobel, um Weiler häufig (H.).

Pteridium Gleditsch.

- P. aquilinum Kuhn.** Triften, Wälder. v^5z^4
Hbu und Hbo gemein; an sonnigen Triften, z. B. bei Neuhaus, fruktifizierend; Exempl. bis 3,50 m Höhe in feuchten Gebüsch zwischen Schönbühl und Gitzenweiler.