

Inhaltsverzeichnis

HEUBL, G. R. & G. WANNER: Samenmorphologische Studien in der Gattung <i>Euphorbia</i> L.	7–25
WEBER, H. E.: Neue oder wenig bekannte Brombeerarten (Rosaceae, <i>Rubus</i> L.) in Bayern und darüber hinausgehenden Verbreitungsgebieten	27–45
GERSTBERGER, P., H.-D. HORBACH & W. WURZEL: Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von <i>Poa supina</i> Schrader in Nordost-Bayern	47–54
BARTH, U., A. FRISCH, Th. GREGOR & E. SCHÄFER: Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (<i>Sedum villosum</i> L.) in Hessen und der bayerischen Rhön.	55–68
THIELMANN, G. & J. RÖMBKE: „Ökotechnische“ Maßnahmen zur Unterstützung der Wiederansiedlung von Heidevegetation nördlich von München	69–73
CHANG, T. P.: <i>Draparnaldia glomerata</i> (Vauch.) Agardh, eine pinselartige Grünalge in sauberem Bachwasser	75–77
KIEM, J.: Der Weißensee und das Moor am Gampen im Naturpark Trudner Horn (Südtirol)	79–92
ZERBE, S.: Synanthropes Vorkommen von <i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmelin im Nordspessart	93–96
ARBEITSGEMEINSCHAFT „FLECHTENFLORA AUGSBURG“: Flechtenflora von Augsburg und Umgebung	97–113
EWALD, J.: Graslahner - Rasengesellschaften in der montanen Waldstufe der Tegernerseer Kalkalpen ..	115–133
DÖRR, E.: <i>Geranium purpureum</i> im Allgäuer Untersuchungsgebiet	135–136
SCHUHWERK, F.: Kommentierte Liste der bayerischen <i>Hieracium</i> -Arten. Teil I. Taxonomisches Konzept, Arten des Subgenus <i>Pilosella</i> a - f	137–152
HEUBL, G. R.: Bemerkungen zur Karyologie der <i>Cochlearia pyrenaica</i> -Gruppe unter besonderer Berücksichtigung von <i>C. macrorrhiza</i> (Schur) Pobed	153–156
WEIGEND, M.: Nachträge und Korrekturen zur Flora von Weiden i. d. Opf.	157–159
HÜGIN, G. & H. HÜGIN: Neue Höhenrekorde für Ruderal- und Segetalpflanzen in den Alpen	161–174
WEBER, H. E.: Beitrag zur Brombeerflora von Nordbayern	175–192
HACKEL, H. & I. DANELUK: Die Eufeusommerwurz, <i>Orobancha bederae</i> Duby - neu für Südbayern ..	193–194
ESCHELMÜLLER, A. & H. ESCHELMÜLLER: Verbreitung des <i>Dryopteris-affinis</i> -Komplexes im bayerischen Alpen- und Voralpenraum	195–207
SONNBERGER, B.: <i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC. im Unterallgäu	209–211
DUNK, K. V. & W. V. BRACKEL: Nachweise von Moos- und Flechtenvorkommen im Schwarzachtal, Nürnberger Land	213–218
HIEMEYER, F.: Königsbrunner Heide und Garchingener Heide - ein Vergleich	219–228
SCHOLZ, H.: Nachricht über einen hybriden Unkraut-Hafer aus den Südalpen Oberitaliens	229–231
HEMP, A.: Ökologie, Verbreitung und Gesellschaftsanschluß ausgewählter Eiszeitrelikte (<i>Cardaminopsis petraea</i> , <i>Draba aizoides</i> , <i>Saxifraga decipiens</i> , <i>Arabis alpina</i> und <i>Asplenium viride</i>) in der Pegnitzalb	233–267
HORN, K., O. ELSNER, L. MEIEROTT, M. SCHMID & W. WURZEL: Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung von <i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst. in Bayern	269–288
SPRINGER, S.: Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften in Südbayern	289–299
BAUMANN, H. & W. WAHRENBURG: Ein neues Vorkommen des Pillenfarns (<i>Pilularia globulifera</i> L.) in Mittelfranken.	301–308

Botanische Kurzberichte

EBERLEIN, F.: Der Sadebaum vom Kitzkartauern (Nationalpark Berchtesgaden)	309–310
SCHMID, M.: <i>Trifolium striatum</i> L. neu im Erlanger Gebiet	310–311
ZIESING, O.: <i>Calamagrostis stricta</i> (Timm.) Koeler im Wildmoos (Landkreis Starnberg)	311–312
DUNKEL, F.-G.: <i>Veronica acinifolia</i> L. in Bayern	312–313
EBERLEIN, F.: <i>Thlaspi alliaceum</i> L. am Fuß des Högl's im Landkreis Berchtesgaden	313
PALLAS, J., H. BÜLTMANN und M. SCHEUERER: <i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss und <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar & Vězda in der Oberpfalz	314–315
HEMP, A.: Ein Vorkommen von <i>Saxifraga paniculata</i> Miller in der Nördlichen Frankenalb	316–317
GARVE, E.: Floristische Neufunde in der nördlichen Frankenalb	317–318

Nachrufe

SCHÖTZ, F.: Ingeborg Haeckel 1903-1994	319–326
HERTEL, H. & F. OBERWINKLER: Josef Poelt 1924-1995. Ein Nachruf.	327–348

Buchbesprechungen	349–392
-------------------------	---------