

Ranunculus Subgen. Batrachium in Bayern

Schlüssel für fertile Pflanzen unter Ausschluß von Hybriden

Von C. D. K. Cook, Zürich

- 1a Flächige Blätter (Schwimmblätter) vorhanden
- 2a Umriß des Nektariums kreisförmig; Fruchstiel kürzer als der Stiel des ihm gegenüberliegenden Schwimmblattes
R. aquatilis
- 2b Umriß des Nektariums birnförmig; Fruchstiel oft länger als der Stiel des ihm gegenüberliegenden Schwimmblattes
- 3a Zerschlitzte Blätter kürzer als die Internodien
R. peltatus
- 3b Zerschlitzte Blätter länger als die Internodien
R. penicillatus s. s.
- 1b Flächige Blätter (Schwimmblätter) fehlen
- 4a Blattabschnitte in einer Ebene liegend
R. circinatus
- 4b Blattabschnitte in mehr als einer Ebene liegend
- 5a Kron(Nektar-)blätter selten über 5 mm lang, einander während der Blütezeit nicht berührend; Umriß des Nektariums halbmondförmig
R. trichophyllus
- 6a Pflanze kräftig, aufrecht, nur an den unteren Knoten wurzelnd
ssp. trichophyllus
- 6b Pflanze zart, niederliegend, an den meisten Knoten wurzelnd, alpin
ssp. eradicatus
- 5b Kron(Nektar-)blätter über 5 mm lang, während der Blütezeit am Rande einander überdeckend; Umriß des Nektariums kreis- oder birnförmig
- 7a Ausgewachsene zerschlitzte Blätter so lang oder länger als die Internodien; Blattabschnitte fast parallel
- 8a Blütenboden dicht behaart; jeder Blattabschnitt gewöhnlich mehr als 4fach gegabelt
R. penicillatus var. *calcareus*
- 8b Blütenboden spärlich behaart oder kahl; Blattabschnitte selten mehr als 4fach gegabelt
R. fluitans
- 7b Ausgewachsene zerschlitzte Blätter kürzer als die Internodien; Blattabschnitte divergierend
- 9a Umriß des Nektariums kreisförmig; Fruchstiel selten über 50 mm lang
R. aquatilis
- 9b Umriß des Nektariums birnförmig; Fruchstiel gewöhnlich über 50 mm lang
R. peltatus

